





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
153210





Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1532/D



Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1532/D



Early European Books. Copyright © 2012 by Google LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
123120

1532 2160


DIX

1b/
c

392.

W. P. S.

Page 1, 4/16



EXTERNARVM
ET INTERNARVM PRINCI-
PALIVM HVMANI CORPORIS PARTIVM TABVLÆ,
ATQVE ANATOMICÆ EXERCITATIONES OBSERVATIONESQVE VA-
RIÆ, NOVIS, DIVERSIS, AC ARTIFICIOSISSIMIS FIGVRIS ILLVSTRA-
tæ, Philosophis, Medicis, in primis autem Anatomico stu-
dio addictis summè vtilis.

AVTORE VOLCHERO COITER FRISIO
GROENINGENSI, INCLYTÆ REIPUBLICÆ
NORIBERGENSIS MEDICO PHISICO
ET CHIRVRGO.

AD AMPLISSIMVM ET PRVDENTIS-
SIMVM INCLYTÆ VRBIS NORIBERGENSIS
SENATVM.

TABVLARVM, FIGVRARVM, ET OPVSCVLORVM,
QVÆ IN HVIVS LIBRI COMPAGINEM INCLVSA SVNT,
REPERTVM ET ORDINEM POST PRAEFA-
TIONEM INVENIES.

CVM GRATIA ET PRIVILEGIO CESAREÆ
MAIESTATIS, AD ANNOS SEX.

NORIBERGAE,
IN OFFICINA THEODORICI
GERLATZENI.

M. D. LXXII.

*Eruditione et pietate præstanti viro
D. Georgio Mario Philosophiæ ac Medicinæ
Doctori excellentissimo Landgravi Hassæ
protomedico et in schola Marpurgensi Medi-
cinæ professori primario D. et amico observan-
ter colendo auctor benevolentia exiit D. D.*



29244

AMPLISSIMIS INCLY.

TE VRBIS NORIBERGENSIS SENATORIBVS, VIR-

TVTE, ERVDITIONE, SAPIENTIA, NOBILITATE, AC STEMMA TVM ANTI-
quitate viris præstantissimis, dominis suis perpetua obseruantia co-
lendis, Volcherus Coiter Groeningensis Fri-
sius Medicus S. D.



ILLA VNQVAM ARS COM-

mendatione, patrocinio & instauratione indiguit, Am-
plissime Senatus, Medicina hoc tempore maxime eget.
Præstantissima enim hæc ars, quam primum D. O. M.
(vt Ecclesiasticus inquit) tanti fecit, vt per eam, tanq̃
diuinis miraculis exornatam, gloriam ac honorem adi-
pisci voluerit, quamq̃ præ cæteris omnibus quàm ho-
norificentissimis, vtilissimis atq̃ præclarissimis artibus,
tanq̃ eximiam, excellentem atq̃ summè vtilem generi
hominum ita commendauit, vt honore premioq̃ (quod
de nulla alia arte in sacris legitur literis) afficiendâ præ-
ceperit: ita nunc vilescit, ita sordet, ita abiecta & contempta iacet, ita multis & magnis
corruptionibus, imposturis & fraudibus conspurcata est, vt per eam benignissimi om-
nipotentis Dei incomprehensibile ac stupendum artificium, in Medica facultate expres-
sum, atq̃ adeo non solum immensa eius erga nos mortales beneuolentia, sed etiam nos-
tra erga ipsum reuerentia, ac pietas omnibus modis debita, iam supprimatur obscure-
turq̃. Quomodo enim potest elucere summi creatoris inscrutabilis in creandis ac con-
seruandis rebus prudentia, ars, atq̃ ordo? quomodo inducemur ad gratitudinem et ho-
norem debitum Deo nostro exhibendum? Si illa, per quæ tanq̃ inuisibilia, sanctissimus
Deus suam perpetuam providentiam, sapientiam, omnipotentiam, bonitatem ac *φιλαν-
θρωπία* mentibus nostris patefacere voluit, despiciamus, in malum vsum peruertamus,
falsis imaginarijsq̃ quibusdam inuentis dogmatibusq̃ adulteremus, & plusq̃ diabolicis
artibus atq̃ superstitionibus (vt in arte Medica nunc prohi dolor fit) obscuremus
ac dehonestemus. Quæ ratione cognoscetur immensa ipsius erga nos misericordia? Si
illa, quæ nobis concessa sunt ad salutem & sanitatem, sine qua vniuersas huius seculi vo-
luptates felle amariore merito censemus, & vitam adeo ipsam tanq̃ acerbissimam odio
habemus, integram conservandam, ad dolores, cruciatus ac corporis tormenta compes-
cenda, ad ægritudines tollendas atq̃ vitam prolongandam: deniq̃ si quæ nobis cumu-
latè datæ sunt ad mutuam beneuolentiam amorisq̃ officia inter nos exercenda, con-
uertamus ingrati & impij in humani generis perniciem, detorqueamus ad dolores, ad
morbos, ad mortem deniq̃ ipsam ante diem accersendam, vsurpemus ad omnis gene-
ris sceleratas fraudes, & nefandas cupiditates, Quod nostri seculi teterrima labe, & per-
spicissima calamitas magis conspicua fiat omnibus, paulo latius me explicabo. Si vnus
forte est, qui ex veris fundamentis sacrosancam hanc facultatem hausit, eamq̃ cum ve-
neratione, animi candore, & absq̃ fraude ac fuco, summa cum diligentia exercet: Sunt
vice versa quamplurimi, qui cum Medicinam vix à limine salutarint, illotis manibus pe-
dibusq̃ in eam irrumpunt, secreta siue experimenta hinc inde corrasa ac compilata de-
cantantes, eaq̃ miris modis ac technis ad astra tollentes, vt scilicet noua, quorum nec ra-
tio, nec experientia constat, eaq̃ perniciofa atq̃ pestifera præstantissimis, ijsq̃ diuturno
vfu & vera ratione approbatis, multorum tum valetudinis, tum pecuniarum irrepara-
bili iactura, ne dicam morte, substituunt. Quotus enim quisq̃ quæso est, qui operam iu-
stam vnq̃ nauarit materiæ vniuersæ Medicinæ, vtpote herbarum, fruticum, arborum,
animalium & aliarum rerum, ex quibus tam venena, quàm saluberrima remedia appe-
tuntur? Quis etiam, qui inquirat immensam illam rerum creatoris, quæ in his occultata
est sapientiam, illamq̃ ita, vt sacra scriptura Solomonem fecisse testatur, cui hæc etiam à
Deo infusa fuit, veneretur? legitur de Solomone in istum modum: Et disputauit Solo-
mon su-

EPISTOLA

mon super lignis à cedro, quæ est in libano, vsq; ad hislopum, quæ ex pariete egreditur (id est à maxima arbore, ad minimam herbam) & disseruit de iumentis & volucribus, & reptilibus & piscibus, & veniebant de cunctis populis ad audiendum sapientiam Solomonis, & ab vniuersis regibus terræ, qui audiebant sapientiam eius.

Quor etiam deprehenduntur, qui cum studium Anatomicum medentibus ita necessarium, ut absq; eo vix Medici nomen mereantur, ne aggressi quidem sint, tamen magno fastu, splendore & apparatu Medicinam facere audent: Quot deniq; sunt, qui non scientiam hanc diuinam, quæ totius mundi epitomen summiq; Dei incomparabilè & incomprehensibilem sapientiam, et nostri ipsorum cognitionem complectitur, tanq; crudelem, spem citius plenâ contemnunt aspersionemq; tantum abest, vt vel attingendo, vel inspiciendo illam addiscere cupiant: *Breuitatis gratia lubes hic omitto infinitas artes, quibus Medicus sine conscientie labe ac detrimento Reip: hanc exercitaturus artem, instructus esse debet, nam placuit præcipuorum duntaxat meminisse, Vt turpe, perniciosum est, falso vel emendicato titulo, & non instructum exercitatumq; Medicinam exercere: ita scelestum ac nefarium quemlibet circulatorem, præstigiatores, cerdonem, blasphemum Iudæum, deniq; vnamquamq; sceminam hanc Sacrosanciam, salutiferam ac diuinam facultatem tanta licentia ac dedecore, non paucorum crudelissimo occubitu, exercere. Non opus est nunc, me eorum hominum, qui falso titulo chirurgiæ peritiam sibi ascribunt (exceptos enim hic volo rei ipsius peritos, veritatis studiosos, ac discendi cupidos) impudentiam, arrogantiam, temeritatem & ignorantiam intollerabilem pluribus verbis exaggerare, aut adiungere, quàm isti præpostera imperiti vulgi (quod doctos ab indoctis discernere nequit) veneratione assentationeq; inflati, ac tumidi censuram de omnibus sibi fumant, ac nihil non audeant, verè quod dicitur, *ὅσοι πρὸς λυγρῶν*. cui quidem generi non impar est turba Iudæorū, & garrulorū rumigerulorumq; circumforaneorum, qui nulla scientia atq; vsu instructi, ob scelera nefanda multoties patria exterminati, incerta vagantes sede, naturæ, hominum hostes & expugnatores crudelissimi, nugatissima ostentatione, & extemporali, speciosa ac fraudulenta garrulitate vel impudentia vbiq; in foris publicis, in porticibus, in compitis, in triuijs, in pagis, in tabernis medicamenta plurimum adulterata proponunt, lethalia pro salubribus vendunt, mortem pro vita propinant, multos ad inferos detrudunt: & ita miseram plebeculam tum pecunijs emungunt, tum sanitate ac vita spoliunt, ipsi dignissimi vt ad Sauromatas relegeretur. Prætereo eius farinæ alios complures, non multo certè meliores. Nam omnes abusus omnesq; errores, qui in artē Medicam irrepsērunt, hic perstringere, vt longi temporis, ita mei non instituti foret, cui crassiores saltem detexisse sufficere potest, Quod si enim singula exactè percurrere vellem, oratio facile excreseceret in immensum volumen, nam nemo mortalium non sibi aliquam huius artis partis cognitionem ascribit. Hic enim hæreditariò sibi secreta relicta, ille ex familiæ suæ primis autoribus à multis seculis per manus sibi tradita, alius ab aliquo Medico vel Medicastra, vel Iudæo sibi communicata experimenta gloriatur. Sed vt Syluius recte scribit, an hæc secreta, hoc est, efficaciora ac probatiora sint remedia, an potius cacodæmonum redoleant manus facili est diiudicare: quoniam per se istiusmodi remedia nec salutem efficiunt, nec morbos vllos propulsant, sed cum à Medico naturæ administro, & in rationali methodo præclarè exercitato exhibentur, Deorū manus et salutaria Herophilo Medico, vt vetustissimo, ita celebratissimo, rectè vocabantur. Quàm verò exitiosa & perniciofa Rebus publicis sit hæc temeraria ac impunita imperitorum hominum verius grassandi, quàm medicandi licentia, grauis & iusta pœna ab optimo magistratu Montis Pessulani in empiricos & empiricas constituta, demonstrat. In hac enim præclarissima atq; antiquissima Academia, si quis empiricus, vt testatur Syluius, & vt ipsemet non solum à ciuib; eius Reipublicæ intellexi, atq; etiam semel, cum illic operam Medicinæ darem, vidi, sese Medicum mentiebatur, mox raptus in asinum sublimis tollebatur, auersusq; vrbe tota circumductus, scommatis vndiq; incesabatur, conspuebatur, ac sordibus totus conspurcabitur, ceu olim Malsiliensium victima, postremo expiata vrbe eijciebatur, illuc nunq; rediturus, nisi cum maximo suo malo.*

Hæc amplissimè prudentissimèq; senatus omnium oculis ita subjicere volui, vt deestandis

NVNCVPATORIA.

detestandis abufibus, & fraudulentis erroribus, ijsq; valde noxijs et fecundis turpiffimi
 quæstus gratia ab iniuftis, ac malè feriatis hominibus fufceptis, & introductis, liquidò
 animaduertis, artis noftræ nobilitas, præftantia, atq; incomparabilis vtilitas eftimaretur,
 & valetudinis, absq; qua ad nulla aptiffimum munia, accuratior haberetur diligentia &
 cura. Inde enim futurum exiftimaui, vt Ampliffimus fenatus, qui hanc politica difciplina
 ornatiffimam et floridiffimam Rempublicam tanta prudentia tamq; præclaris institutis
 gubernat & regit, vt in hac etiam parte, ficuti in alijs infinitis, ac laudatiffimis rebus com-
 muni Chriftianorum confenfu, omnibus ferè ciuitatibus præferatur, nec exteris folùm
 admirationi, verùm etiam venerationi fit, hanc facrofanctam Medicinam, vt ante, fic eti-
 am in pofterum affereret ac vindicaret, eamq; ab omnibus impofturarũ, ac preftigiarum
 inquinamentis, atq; corruptelis expurgaret, & vltimò debitum verorum Medicorum
 honorem eftimationemq; defenderet ac tueretur. Ad me quod attinet, etfi ob infig-
 nẽ Ampliffimi fenatus erga me beneuolentiam, amorem, ftudia, ac merita multis in rebus
 abundè perfpecta, non opus eſſe exiſtimo, vt me pluribus ipſi commendem: tamen eo-
 rum gratia, qui ea maleuolentia in omnes bonos fuſſuſi ſunt, vt cum vera virtute & me-
 dijs conceſſis, ſuæq; artis peritia emergere nequeant, obtreccionibus ac calumnijs op-
 timos meos conatus & labores indefeſſos, communis vtilitatis iuuandæ ac promouen-
 dæ gratia fufceptos impetunt, impediunt, perturbantq; occaſionem mihi quàm maxi-
 mam dari confido, ad neceſſarium atq; ſperatum patrociniũ acquirendum. Rogo itaq;
 & obſecro Ampliffime ſenatus, qui me ſub veſtra proteccionẽ aliquot annis ſuſtentatis,
 vt quanto vehementius multorum malignitate premor, tantò me veſtro patrociniũ atq;
 auxilio magis ſubleuandum exiſtimetis, Quanta animi promptitudine, ſtudio, ac labore
 hætenus tum de Ampli: V. tum de vniuerſa Republica, non ſolùm ſectionibus cor-
 porum, ſed etiam curationibus morborum bene mereri ſtuderim, notum ſatis eſſe pu-
 to vniuerſis, vt meis quidem præconijs res planè non indigeat, Nunc verò vt hoc etiam
 Præſt: veſtra intelligat, nullum mihi tempus elabi, quod non in vtilitatem vſumq; tum
 totius Reipub: tum ſingulorum impendam, meq; id vnicè agere, vt pro mea virili ſtu-
 dium Anatomicum, ita Medicis neceſſarium & vtile, vt vlla alia artis Medicæ pars eſſe
 poſſit, hic in Germania exciſetur, augeatur, et exornetur: has tenues meas lucubrationes
 Anatomicas, quas horis ſuccuſiuis, otio, luſibus, animi recreationibus deſtinatis, hic No-
 ribergæ exarauĩ, ſub nomine Amp: veſtræ in publicum emittere, eiq; dedicare volui.
 Quam quidem qualemcunq; mei erga Ampli: veſtram animi voluntatis ſignificatio-
 nem, vt ſinceriffimam ita honeſtiſſimam vt Amp: V. approbet iſtamq; tenuitatem meã
 boni conſulat, ac me ſibi perpetuò commendatum habeat, etiam atq; etiam vehemen-
 ter oro. Id enim ſi fecerit, ſic vt factum non dubito, ad melius de Amp: ſenatu vniuerſa-
 ſaq; hac ſplendida, culta, atq; ornatiffima Repub: merendum, & ad maiora aggredien-
 da calcar addet. Nam ſi quid eſt in me ingenij, quod ſentio quàm ſit exiguum, aut ſi qua
 exercitatio medicationis & anatomie, in qua me non inficior mediocriter eſſe verſatum,
 aut ſi huiuſce rei ratio ab optimarum artium ſtudijs profecta, à quibus ego nullum
 confiteor ætatis meę tempus abhorruiffe, earum rerum omnium Amplitudo veſtra, atq;
 inclyta Noriberga fructum à me ſibi ita decerpẽt, vt plurimum fidei, diligentie, ac promp-
 titudinis meę in ſe iuuando quiſq; ſuo loco, vbi opus fuerit, perfpecturus ſit. Id quod
 ſibi Amp: V. de me ceruiffimè perſuadebit, Noribergæ Tertio Kalendarum Septem-
 bris, Anno M. D. LXXII,

Amp: veſtræ

Deuinctiſſimus & Obſeruantiffimus
 Volcherus Coiter Medicus.

BENEVOLIS LECTORIBVS
VOLCHERVS COITER
MEDICVS S. P. D.



EAS DE HUMANI CORPORIS TVM

externis partibus, tum ossibus tabulas, olim Bononiæ ad conciliandam mihi benevolentiam eorum, quos & Bononiæ & Perusiæ habebam auditores, in lucem emissas benigni φίλων, maturius prodixisse diu intellexi. Deinde eas typographorum incuria non paucis mendis contaminatas, statim animaduerti. Præpropere uero emissioni occasionem dedit studiosorum Italorum importuna, atq; molestissima sollicitatio, qua tanquam ui mihi eas propè nudas, aut uix tenui ueste instructas extorserunt. Inceperam equidem uniuersam Anatomiam, in meum tantum usum, quod nimirum in scholis ad explicandas humani corporis partes expeditior forem, tabularum forma, breuibus, loco epitomes, comprehendere. Verùm nescio, quæ ratione in manus aliquot meorum auditorum uenerunt, qui statim me precibus ac promissionibus de ædificatione adorti sunt, nec ab improbis postulationibus prius, quàm impetrarent, desisterunt. Itaq; ut Scholam (quo quidem more in Italia ulitatum est auditores sibi comparare) consequeretur frequentiore, me uinci passus sum, atq; eas tabulas rudi Minerua concinnatas, in publicum uenire permisi. Cogitavi enim mihi aliquando plus otij concessum iri, ut illas emendatius & auctius in lucem æderem. Quæ quidem in re hæc ætenui æmuli mei hominesq; maleuoli & maligni, qui suppressendis alijs (ut omnibus temporibus inertes, imperiti, & uisulenti homines consueuerunt) se crescere aut emergere posse existimant, omnes meos conatus disturbanunt atq; interruperunt. At postquam fortunæ undis hinc inde iactatus Deo propitio redij, ac me collegi, interruptum negotium in manus sumpsi, ac tabulas recognoui. Ne uerò nudæ & sine auctario prodirent, etiam illis internarum partium & oculorum tabulas adieci. Præterea adiunxi tractatum de auditu, exercitationes obseruationesque aliquot Anatomicas, quas ex uariorum tum humanorum, tum brutorum corporum dissectione maximis molestijs, plurimis inuitis, ac reluctantibus collegi. Ad hunc autem meum laborem libentius & alacrius suscipiendum, Amplissimi nostri senatus, qui ut bonarum artium studiosissimus promotor à multis seculis extitit, ita & nunc optimarum literarum studiosos amat ac promouet, benignitate ac beneuolentia, qua me complectitur singulari, excitatus sum, adeo ut etiam quædam iconibus ad ueras scheletorum effigies sculptis illustrarim, quod fieret, partim ut tabulæ meæ de ossibus melius intelligi possent, tum ut uiam mihi ad reliqua anatomica pararem. Nec uerò nihil me commouit ac impulit occasio, quam reperi in hac florentissima ciuitate, quæ ut omnis generis artium magistros excellentissimos, sic etiam insignem pictorem & sculptores habet, quorum opera quidnam adiumenti hac in re mihi allatum sit, quilibet facile iudicabit. Quare si quispiam usquàm hoc meo labore se profecisse aliquid intellexerit, id totum primùm amplissimi indytx huius ciuitatis senatus benignitati, deinde Reipub: Norinbergenſi laudatissimæ, & infinitis artibus instructissimæ totius Germaniæ emporio præclarissimo, acceptum referet. Rogo autem unum quemcūq; ne, si non in omnibus magnis ac celeberrimis Anatomicis artificibus (quos potius laudandos imitandosq; quàm reprehendendos carpèdostue esse iudico) assensus sum, offendatur; Sed potius cogitet, me hîc simplici ueritati, perspicuitati atq; breuitati studuisse, non uanæ ambitioni inuidiæq; locum dare uoluisse. Anatomicum enim studium prorsus istiusmodi est, ut potius ex dissectione & inspectione, quàm ex libris addiscatur. Tum uerò sunt adhuc in re anatomica nostris sensibus tam multa occultata, & penitus ab acie mentium nostrarum abstrusa, ut quotidie à diligenti rerum perscrutatore plura adinueniantur. Quapropter ea, quæ bene à clarissimis anatomix scriptoribus tradita sunt, huc quidem paucis adduxi, disputationibus tamen inutilibus omisſis: quæ uerò alio modo, quàm in libris comprehenduntur, à me deprehenſa sunt, ea simplicissima, sed uera oratione annotaui. Quod restat, seriò obsecro & obtestor lectores quoslibet candidos, & φίλους, ut meum studium in illustranda hac artis Medicæ parte omnis bus Philosophiæ Medicinæq; addictis æquè iucunda, ac necessaria, quantum possint iuuent mihiq; liberè ac sincerè, in quibus hallucinatus sum, indicent, & quæ forte ipsi in sectionibus uel noua, uel diuersa deprehenderit, uel in lucem edant, uel mecum prolixè communicent. Equidem neminè sciens honore unquam priuauerim, cum me aliarum auium pennis minimè ornandum ducam & erudiri ac proficere potius à quouis, quàm turpiter errare & hallucinari cupiam, nec adeo ignorem dona Dei uaria esse easq; uariè distribui solere. Quare nec mea αἰσεννώπειρα defendenda, sed omnium iudicio ac censuræ subiicienda putauì, cum nihil dubitem alium uidere, quæ ego uidere non potui, ut enim Græcus Poëta sapientissimè inquit
 ἐς αὐτὸν ἔπειρα ὀρεῖ. Quod si uerò sint huius tam præclaræ artis adeo capitales hostes,
 ac contemptores, ut meos conatus iuuare nolint, eos rogatos uelim, ne
 tamen eis communis utilitatis gratia impendant,
 aut inturbent. Valete.

Τῷ περὶ τὰ ἱατρικὰ σπεδάζοντι
ἐνπράττει.

Ὄς πατέρ' ἱπποκράτην κλυτὸν ἰδὲ γάλῃνον ἀγαυὸν
Γνώμῃαι ἐν πθέουσ, ὡς ἀφέλοιο νόσους,
τάσδ' ἀνέλιψε καλὰς πλάκας, ὡς οἰκνύτρος ἀμύμων
τεύξερ, ἐπεὶ μερόπων πῶματ' αἰματ' αἰματ'
οὐ μόνον ἐν νοσητοῖς ὄρεσι γεμνάνειδος αἵνης,
ἀλλὰ καὶ ἐν χλοεροῖς ἀγχοῖσι ἰταλίας.
ὅσα γὰρ ἐμπροσθ' ἰδὲ πατ' ἱατροῖν προφείδοι
φισαλὶς βέλγῳ φαλλοπίσ' ἰτάλλῃ,
καὶ μετέπειτ' ἰδὲ ἐν τῷ ἐνὶ ἐροτοῖς μορίοισιν
ἀκρίβειας, ἃ δὲ πρῶτε μαχαίριδ' ἰδὲ
ταῦτα πρηνόμην' ἐνέλεξε, ἰδὲ προφύσθε
δωκερ ἀπασὶ βροτοῖς, ἀλλὰ μάλιστα νεοῖς,
ὅς πατέρ' ἱπποκράτην κλυτὸν ἰδὲ γάλῃνον ἀγαυὸν
Γνώμῃαι ἐν πθέουσ, ὡς ἀφέλοιο νόσους.
τῶν δ' ἐν τῷ πρῶτῳ μὲν ἀκρίβειας δ' αὖτε
πατρί' θεῷ χόης ἐκκράδ' ἰδὲ χάριν,
ἠδ' ἐν τῷ χέρ' ἐκκράδ' ἰδὲ μακρὸν ὄλυμπον,
τῷ μὲν ἱατρὸς ἐν χθονὶ σωσιβίους,
εἴτα δ' ἐπαινοσεῖται ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸς κούτρον,
ἀσθεσὺν φρουσίῳ κῆδος ἀρημανέων,
καὶ τῶν γε πλάκας ἡμάτιος νύχιος τε δ' ἐλέθους,
κτῆσ' ἀμύμων παύρῳ χερσὶν μέγ' ἀργυρίῳ,
ὅς πατέρ' ἱπποκράτην κλυτὸν ἰδὲ γάλῃνον ἀγαυὸν
Γνώμῃαι ἐν πθέουσ, ὡς ἀφέλοιο νόσους.

Χριστόφορος ὁ Σχίλλγγος
Φεργαδ' ἐναῖος Σελεύσιος.

IN SCELETA DOCT: VOLCHERI
COEYTERI, MEDICI ET ANATOMICI PRAES
tantissimi, Epigramma Scriptum à Davide
Pareo Francoftenensi Silesio.

Sceletum fenum, quicquid superbis
Me contuere sedulus.
Lanificae quando uita mihi flamina Parcae,
Concorde filo neciterent,
Suauiſſimam Vitae, totiusq; orbis Imagem,
Pulchris decorus artibus,
Ingenio et forma cunctisq; mihiq; probabar,
Virtute clarus conscia.
Hec ubi nunc? seu postq; trucidantia Mortis
Me carne uel sola exiit.
Nunc Mors atra uocor, dirum mortalibus omen,
Artificis infelix opus.
Hac etiam macie, et pallentis hiatibus oris
Meq; adeo et omnes territo.
Tu tamen antiquam qui discis Apollinis artem,
Huc ades, et hinc ne diffuge,
Membra sed exanima, et deformes corporis artus
Rimare curiosius.
Tensilibus careo nervis, nec in osse medulla est
Suis reſecto carnibus.
Ordine cuncta tamen solertis ut arte Magistri
Sint colligata perspicis.
Sic equidem doctus Volcheri nosse tabellas
Conaberis feliciter,
Ut labor hinc ueniat, quem ponis in arte medendi
Facilior omnis ad tuos.
Quos animo magnos non tam tibi concipis, Vſus,
Quam ceteris mortalibus.

TABVLARVM, FIGVRARVM, ET OPVSCV-
LORVM, QVAE IN HVIVS LIBRI COMPAGINEM
inclusa sunt, elenchus & ordo.

- Introductio in Anatomiam.
Tabulae externarum humani corporis partium.
Tabulae internarum humani corporis partium.
Tractatus de ouorum gallinaceorum generationis primo exordio
progressuq; & pulli gallinacei creationis ordine.
Tabulae ossium humani corporis.
Figurae quatuor ad adulti hominis ossa pertinentes, cum indice
characterum & numerorum figuris adhibitorum.
Ossium tum humani foetus adhuc in utero existentis, vel imperfe-
cti abortus, tum infantis dimidium annum nati brevis histo-
ria & explicatio.
Figurae quinque infantis scheleta & ossa exprimentes.
Analogia ossium humanorum, simiae & veris, & caudatae, atq; vulpis.
Figura scheleti simiae caudatae, ea, qua est magnitudine.
Tabulae humanorum oculorum.
Tractatus de auditu.
Observationum anatomicarum, medicarum, chirurgarumq; mis-
cellanea varia, ex humanis corporibus, tam sanis, quam male
affectis, & atq; viuis, atq; mortuis deprompta.
Anatomicae observationes ex corporibus variorum brutorum dis-
sectis, hinc inde corrafas.

INTRO.

INTRODVCTIO IN ANATOMIAM,

PROHOEMIUM SIVE PRAEFATIO.



SAPIENTVM SENTENTIA COMMV-
niq; consensu dudum approbatum fuit, Deum per se existere,
hominem propter gloriam Dei: & quo homo esset, et bene esset,
non solum rerum omnium species, sed & coelos esse conditos.
Vnde cum summus ille rerum creator mundi fabricam absoluisset,
colophonem additurus totumq; suum artificium, tanq; in
epitomen (vnde Philosophi hominem omnium rerum compen-
dium appellant) redacturus, hominem creauit eumq; vniuersis
dominatorem praefecit: & quo feliciter tranquilleq; illis ad su-
am utilitatem atq; commodum frui posset, diuinam prudentiam

& naturam homini afflauit, eumq; diuinæ formæ participem reddidit. Homine iam perfecto,
propter quem cuncta erant condita, tanq; rebus ad extremam perfectionem perductus, Deus
quieuit, & Sabbathum instituit. Vnde quid mirum est, si Deus immensam & incomprehensibi-
lem potentiam in humano genere condendo collocarit: et hominem omnibus numeris atq; par-
tibus absolutam perfectionem esse consequutum? taceat igitur Epicurus, Plinius aliq; omnes
aethnici, qui Deum imperfectionis & iniustitiæ accusant ex eo, quod hominem inter creata ani-
malia solum inermem & nudum crearit, quodue homo in lucem statim vagire incipiat. Verum
enimvero hæc minime essentia, sed partim commoditati, partim externarum rerū egestati ascri-
benda erunt, non enim homo, ad hæc potissimum natus, vt in ciuili uita duplicem, quæ in Deo
est intelligendi, & gubernandi vim exprimeret, ac in publicis negotijs se exerceret, clypeum, gla-
dium, haltem, thoracem & id genus alia semper secum circumferre deberet: Siquidem si nunq;
deponi potuissent, molesta illi erant futura. Ideo non vt cæteris animantibus homini certa arma
creauit, quibus aut vim, vel mortem inferat, vel illatam propulset, sed manum illi dedit organum
ante omnia organa, quibus sibi uaria pro necessitate tum instrumenta, tum arma parare eaq; pro
temporis occasione & arripere & deponere posset. Est quidem corpus nostrum velleribus, pi-
lis, plumis, squammis, setis aduersus vel hostium, vel temporum iniuriam minime munitum, sed
nudum in lucem æditum, at enim membris suis commodissimis ex detractis animalium pellibus
ornatissima sibi varijsq; generis vestimenta, quibus se vitamq; suam tueatur, conficit. Deinde ad
sui conseruationem, id est, ad *negotia cito scienda, hæc omnia inutilia forent, vt & dura te-
staceaq; cutis: immo exquisitissimum sensum habere oportuit, ad quem natura tenui exactiq;
sensus cute nostrum inuestiuit ac muniuit corpus.* Non igitur absq; summa utilitate infinitisq;
emolumentis maxima incommoda sunt admixta, quorum princeps est dolor, deinde doloris
quoq; imminētis expectatio non paucos efficit formidolosos, inconstantes ac perfidos. At do-
lor aliquot de causis non solum necessarius, sed etiam utilissimus: nisi enim de vulnere dolore-
mus, segnius medicas manus ad curationem admoueremus, nisi metueremus, temerarijs insulti-
bus pleriq; nostrum, ad cædes & excitaremur & acueremur. Quod homo imperfecto vmbilico
& sine dentibus membranas perrumpat, ac in lucem prodeat, maioris perfectionis causa hoc q;
contigit, nimirū vt medio modo sese cutis corporis haberet. Quod deinde homo natus ploret, &
vagiat, ne hoc imperfectioni attribuendum, immo eo perfectior cæteris a natura creatus, quod
magis ploratu dolorem nutrici significando remedium ab ipsa postulare posset.

Ab his itaq; tanq; iniquis & ingratis erga naturam (appellamus semper eam ordinari-
am Dei potestatem) quam nouercam iniuste appellant, dissentiamus, & potius assentiamur A-
ristoteli alijsq; qui ex artificiosissima absolutissimaq; humani corporis fabrica hominem micro-
cosmum appellarunt, eumq; tanq; regulam & mensuram ad cæterorum animantium cognitio-
nem proponunt.

Quo verò mysterium hoc diuinum in paruo ergastulo reconditum, quatenus per inge-
nij nostri imbecilitatem, & tenuitatem licet, assequamur: quædam magis particulariter accuratius
examinemus. Ante q; negotium aggredimur, nonnulla apud Græcos prolegomena dicta, expli-
cabis.

AA

INTRODVCTIO

cabimus. Sunt autem hæc numero octo, utpote definitio, causa inuentionis, artis inuentores, utilitates, subiectum, scriptores, instrumenta, & ordo, de his iam sigillatim,

CAP. PRIMVM, De definitione.

Definitio duplex est, alia essentialis siue *εὐρισθῆναι*, alia æthimologica. Primò de nominis significatione. Anatomia est vocabulum compositum ab *ἀνα* & *τομή*, quod secare significat, unde *πρὸς τὴν ἀνὰ τομήν* deducta est, *ἀνα* reduplicationem denotat. Ex his igitur duabus uocibus composita est anatomia, quæ vox significat repetitam partium animalium sectionem. Qui latine hanc vocem reddidere, dissectionem, sectionem, & resectionem vocarunt. Celsus vocat incidere, unde poterimus dicere incisionem, at rectius dissectionem, quoniam corpus in multas dissectur partes. Hæc de vocabuli significatione, nunc de definitione essentiali.

Per vocabulum anatomen apud probatissimos auctores intelligimus vel motum actiui, quo secamus partes cuiusdam animalis: vel intelligimus habitum quendam animi nostri, quo agimur ad hanc actionem perficiendam. De motu actiuo non loquimur, quia caducus est, & non permanet: Sed loquimur de habitu, quo agimur ad hoc vel id agendum. Anatomia naturam explicarunt ita, veluti auctor definit: Medic: Anatome est abditarum partium animalium speculatio. Etsi hæc definitio à multis probetur auctoribus recentioribus, tamen mihi non placeat, nam excludit actum incidendi, quod in arte potissimum est: excludit etiam explicationem & partes exteriores, quare dicas Anatomia est ars, qua optima ratione omnes corporis humani, præcipue partes minutissimas secare videamur, ut illarum cuiusque substantia, magnitudo, figura, situs, connexio, usus & quicquid sensu cognosci possit, pateat. Definitur & hoc modo, anatomia est corporis, præcipue humani dissectio, per quam cuiusque partis substantia, magnitudo, figura, situs, connexio siue mutua communio & usus intelligitur. Cum verò artem, dico habere propria theoremata, quibus hæreat, quæ theoremata artificem impellunt ad certum actum perficiendum. Sunt autem plura, & primo quænam partes sint distinctæ & separatæ, quæ separari queant ab artifice. Secundò, quæ partes colligatæ inuicem & difficulter separantur. Tertiò quænam sunt vnica, quænam plurimæ. Quartò quisnam sit ordo in dissecandis, & diuidendis partibus. Quinto à quænam sit incipiendum. Sexto quibus instrumentis hæc vel illa pars sit secanda, Septimo qua parte secandum sit. Hæc sunt præcepta, ob quæ ars esse dicatur, præterea est ars in hunc usum instituta, ut omnia ea pateant, quæ sensu percipi possunt. Primò ut sensu pateat partium motus, & actio. Secundò indicat partium numerum, qui sensu est cognoscendus, addatis magnitudinem, conformationem, quæ pateant tum ratione istius artis, addatis consistentiam, de colore nihil dico, situs autem tanti est momenti, ut nec Philosophus, nec medicus quippiam absque situ perficere queat. Hæc de Anatomia definitione.

CAP. SECVNDVM, De causa inuentionis Anatomia,

Inuentionis causa duplex est, alia ad Philosophum, alia ad Medicum pertinet,

Ad Philosophum quod attinet, eadem est cum Philosophia naturalis inuentione: nimirum admiratio, quæ ex intellectus contemplatione prodit teste Plutarcho in Rhetor: Quod si enim quis conspiciat multos in corpore motus, suspensus admiratione corripitur vnde nam hi motus oriantur, nam necessum est intus quid latere, quod tum animi, tum corporis motus sit causa, ut ex Democriti vita demonstrari potest, siquidem is, quod insaniam siue iram inueniret causam, in animalium dissectione occupatus, ab Hippoc: repertus fuit. Quapropter ex admiratione Philosophi inducti, ut animalium dissecuerint corpora.

Ad Medicos quod attinet, illi postquam ignorarint membrorum interiorum passionum causas, unde maxima curationis pars dependet, inducti sunt, ut humana dissecuerint corpora. Vnde curatio affectarum partium in causa fuit apud Medicos, anatomia inuentionis.

CAP. TERTIVM, De artis inuentoribus.

Hæc ars

IN ANATOMIAM.

Hæc ars inuenta & exculta fuit à præclarissimis viris. Primus enim author fextitit Chalcides, Plato in Tymæo Alcmeonem introducit, qui summus Pythagoricus fuit, deinde hanc artem excoluere Hipp: Plato, Aristoteles & Galenus. Plato in Tymæo demonstrat quantum studij in Anatomia collocarit, Aristoteles in libro de historia animalium. Galeno succedunt quàm plurimi tum Medici, tum Philosophi, quibus cum Medicis magna studiorum intercedit societas.

Præter hos fuere & Reges, & Principes huius artis studiosi, siquidem scriptis traditur Aegyptiorum reges mortuorum corpora, quò abditos morbos scrutarentur, suis dissecuisse manibus. Marcus Antoninus Imperator ex mortuorum dissectione corporis sui constitutionem & temperaturam addidit, Flavius Boethius Romanorum consul (vt Galenus testatur) anatomiae speculationis amore ita flagrauit, vt mortalium nemo, vnde Galeni libros Anatomicos quam diligentissime euoluit. Idem fecit et Paulus Sergius Romanorum præfectus vir, in Philosophia summus, qui Galeni dissectionibus frequenter interfuit.

Græci postq̃ cognorint anatomen ad diuini opificij admirationem, ad morum temperandorum iudicium, ad humanæ naturæ penitiorem contemplationem, ad tuendam valetudinem, ad curanda corporis mala, deniq̃ ad scriptorum exquisitiorem cognitionem vtilem atq̃ necessariam esse, pueros domi apud parentes in cadauerum dissectionibus exercuere.

CAP: TERTIVM, De Anatomiae vtilitatibus.

Anatomiae vtilitates, quia ad variarum disciplinarum artiumq̃ referuntur professores atq̃ cultores, variæ & plurimæ sunt. vtilis est in primis Philosophis, quatenus ipsi hanc per se adament artem tum quoad artificium naturæ in qualibet animalis parte probè esse expressum demonstrare conentur.

Medicis hæc ars ita necessaria existit, vt absq̃ hac nihil boni præstare queant, quemadmodum enim Architectum ædium vitia reparaturum, nouisse oportet ædium particulas omnes, qua substantia consent, qua figura, qua magnitudine, quo numero, atq̃ etiam quam compositionem inuicem habeant: Sic Medicus partium nostri corporis morbos curaturus, illius particulas sigillatim perspectas, & cognitatas habere debet, quali inq̃ substantia, qua magnitudine, quali figura, quo numero præditæ sint quamq̃ inter sese compositionem habeant.

Tertiò vtilis est Theologis, Iurisperitis, historicis, Poetis, deniq̃ omnibus, qui eruditionis ac sapientiæ laudem affectant: nam Anatome scientiæ veræ dux est aditumq̃ ad Dei O. M. omnipotentiam ac iustitiam, quibus in construendis & formandis animantium corporibus vsus est, præbet. Cum nusq̃ certius, quàm in humani corporis structura sese expresserit summi creatoris providentia, hoc nomine potissimum *Anatomes studium nobis commendatum atq̃ gratum esse debet, primo enim aditu, nos in Dei cognitionem adducit rapitq̃.*

Adjiciatis vtilitatem insignem, quam vnusquisq̃ inde percipit, cum hac in suimetipsius cognitionem adducitur. Omitto hic breuitatis gratia vtilitates, quas inde milites, pictores, & sculptores hauriunt, Quare ridendi sunt, qui hanc artem, tanq̃ libero homine indignam, ac inutilem vilipendunt ac aspernantur, inquit fœdum est mortui partes sanguine & spurcitie contaminatas contrectare: ad id ita respondeo, fœditas animo & non corpore metienda est, corporis spurcitias pauca aqua animæ ignorantia ne toto oceano quidem ablui potest.

Rursus inquit crudele est homines carnificum instar dilacerare ac dilaniare: ceterum multo crudelius est, propter imperitiam & ignorantiam viuos excarnificare & occidere.

CAP: QVARTVM, Quonam in loco inter artes sit collocanda Anatomia.

Postq̃ Anatomia sit ars ita insignis, vt meritò inter præclaras artes recenseri earumq̃ albo ascribi debeat. collocanda haud dubie inter Philosophiæ naturalis ancillas, nam per animalium sectionem in cognitionem naturarum Philosophi peruenerunt, erit igitur ars liberalis Philosopho maxime necessaria, Quapropter libri hanc artem docentes immediate libros de historia animalium sequentur.

INTRODVCTIO
CAP: QVINTVM, De Anatomiae subiecto.

Subiectum vniuersale est omnis minima corporis animalis particula, quam Anatomicus tractat. At quia eorum, qui hanc artem tractant, non vnus & idem est scopus, subiectum etiam non erit vnum et idem, alijs enim ad finem proprium assequendum sufficit aliquot partes, et minime totam nouisse Anatomiam, alijs necessaria est totius cognitio, alijs satis est exercitari in corporibus humanis, alijs plurimorum & variorum animalium anatomia uix sufficit, vnde hæc ars late patet magnamq; differentiam obtinet. Primò agemus de totius corporis anatomia. Philosophi debent in omnibus animalibus æq; exercitari, Medici in hominibus tantum. Sed quia difficulter tot humana corpora, atq; ad artem hanc perfecte addiscendam desiderantur, consequi licet, Galenus hortatur, vt in brutis nos exerceamus, & præcipue in ijs, quæ similitudinem cum humanis corporibus habent, vt in simijs, hac enim via, in hominibus dissecandis erimus paratiores, nam tota ars Anatomica in eo consistit, vt facile queamus hominis partes secare. Quòd si desideraueris in animalibus ordinem quendam, primo loco sumas cornuta & ruminantia. Secundò solipeda vt asinos & mulos, quæ ratione viscerum considerantur. Tertiò loco sunt porci & oves. Quartò quæ à ferratis dentibus *usque ad vtra* vocantur, vt sunt si magna velis, Vrsus, Leo: Si pusilla mustela, felis, mus, omnia hæc 4. digitis constant magno abolito, nisi quòd in quibusdam ipsorum veluti delineamentum quoddam in radice habetur, neq; tamen multum ab indice secretum. Quintò sunt illa animantia, quibus artuum extrema in quinque digitos discreta sunt, his & clauiculæ concessæ & pectoris os minime acutum & angustum eoq; bipedes incedunt hominis claudicantis instar, vt sunt cynocephali, satyri, lynces, simiæ, & id genus alia. In his intueri oportet actiones & figurâ, quam singula animalia habent extrinsecus, nam particulae, quæ simili funguntur munere et eandem figurâ obtineant necessum est, reliqua in analogia Scheleti simiæ et hominis. Galenus 6. Anatom. cap. 3. retrogrado ordine procedit & inquit primum ordinem obtinent simiæ, 2. his similia, 3. vrsus, 4. ferratis dentibus prædita, vt fues, 5. solipeda, 6. ruminantia.

Non sufficit cognoscere subiectum ratione specierum, sed & ratione conditionum, quarum prima est, si fuerit humanum, vt sit mortuum, ne impij simus vt Erasistratus, Herophilus & Carpus, qui carnificum more, viuos secasse dicuntur. Secundò vt corpus sit integrum et minime mutilum quodq; perfectam membrorum totiusq; formam, siue figuram obtinet, partibus omnibus absolutum & incorruptum est. Tertiò vt sit recens, non putridum, bona carnis habitudine præditum, minime foetidum & flaccidum. Quartò, morbo diuturno minime absumptum, longo enim tempore exhaustum atq; emortuum marcida ac contracta reddit membra, præcipue si statim cutem abstuleris: vulnere etiam non erit interemptum. hinc Carpus supplicio vitæ afficiendos vel opio, vel aliquo alio liquore interficiebat, vel deligebat suspendio vel strangulatione interfectum corpus. Quintò sit corpus mediocre in macilentia & obesitate, statura mediocri appositq; at enim in sectione venarum, musculorumq; atq; neruorum macilentiora obesis præferenda. Sextò oportet vt corpus sit optime ablutum omniq; sorditie careat & rasum sit. Septimò tale corpus præcelso editiori & volubili in scamno collocetur, in medio theatro eoq; perflabili, confidente spectatorum corona. Huc etiam spectat sectio viuorum, omnia enim quæ ad corporis humani cognitionem pertinent ex mortuis cognosci non queunt, vtpote partium actiones vsusq; ad horum inuentionem viuorum sectio videtur aggrediunda, cum hæc ex brutis æq; atq; ex hominibus addiscuntur, hominibus parcendum, & ad hoc negotium brutis vtendum, vt illud immanum & crudelissimum existit, ita hoc crudelitate non caret, at enim crudelius & inhumanius est exiguo errore multis hominibus obesse, ne dicam plurimos occidere, atq; hac in parte irrationalibus, quæ hominum vsus causa procreata sunt, parcere. Hactenus de vniuersali Anatomiae subiecto, nunc de particulari, siue partium dissectione.

Postq; ars medica diuisa sit in duas partes, nimirum in internarum partium curationem quæ Physicis, & in externarum curam, quæ chirurgis assignatur, & anatomiae subiectum bipartitur, ita vt Physicorum sit internas partes quam exactissime cognoscere, chirurgorum externas, nimirum artus & illa, quæ interna inuestiunt, vtpote musculos, venas, arterias, neruos et ossa.

Galenus de hac re 3. Anatomicar: administrationum ita loquitur, qui in sophistarum cauilis industriam ponunt, minus ijs curæ est, vt artuum naturam accurate pernoscant, neq; enim luxationes cū hulcere & citra sanare aggrediuntur, neq; secare, neq; excindere siderata membra, vel tela, vel spicula eximere possunt, ego malim iuuenes in istius modi primum exercitatos ob vsu necessarium.

IN ANATOMIAM.

necessarium. Artuum natura constat ossibus, musculis, ligamentis, arterijs, nervis, venis, velamento & cute. chirurgus ab ossibus ad musculos progredietur, nam hæ duæ partes reliquis omnibus veluti fundamenta. Deinde licebit quodvis prius discere, siue venas, siue arterias, siue nervos. In his versato innotescet simul natura viscerum, pinguedo, glandulae, quæ rursus per se inspicere oportet.

Ad partes solidas ex carnesq; cognoscendas corpora senio confecta convenientiora sunt, pinguedine enim vacant: recentior nata animalia habent nervos exiles, ligamenta inualida, quare talia vitabis. quæ vero corpora præ senio extenuata sunt, omnium sunt aptissima, etenim carnes his sunt modicæ ac aridæ, longè aridior nervorum substantia, tum magnitudine insignior. pinguedo in his vitanda, quæ nihil magis nervorum dissectionem obumbrat. Inquit Galenus in macilentis & vetustis animalibus musculorum fibræ clarius conspiciuntur, nam iuuenilium pinguiumq; animalium fibræ, tum humiditate, tum carnis copia conteguntur.

CAP: SEXTVM, De Anatomia scriptoribus.

Hanc artem scriptis tradidere Diocles, Polybius, Erasistratus, Calistus, qui Aristotelis fuerant auditores. Hos sequutus Marinus & Galeni præceptor Lycus, hunc Galenus Anatomicorum princeps. Omitto hic Oribasium, Theophrastum, Soranum & Arabes in hac Medicinæ parte ineptissimos. Inter antiquos Galenus principatum obtinet. Nostri temporibus fuit Carpus, qui primo anatomiam in lucem reuocavit, accessere Andernacus, Vasseus, Carolus Stephanus, Sylvius. Hi omnes Galeni scriptis innixi anatomiam illustrarunt. Sequutus est Vesalius, qui incomparabili industria stupendoq; ingenio, hanc artem omnibus quasi suis numeris absolvit. Post Vesalium fuit Columbus, Valuerda & in primis piæ memoriæ præceptor meus Fallopius, qui hanc artem anatomicam clara explicatione, atq; novis inuentis observationibusq; non parum auxit & exornavit. extremam manum imposuit insignis Philosophus & Medicus Bartholomeus Eustachius mihi in Romæ olim coniunctissimus, deinde Vesalius in examine observationum Fallopii.

Si quis itaq; artem Anatomicam recte addiscere cupit, primò legat libros Galeni de vsum part: de anatomic: administrationibus. deinde Vesalii fabricam humani corporis. Tertio adiungat Fallop: Quartò Vesalii examen in observationes Fallopii, ultimo Eustachium, & ita ad perfectam exquisitamq; huius artis cognitionem peruenire poterit.

CAP: SEPTIMVM, De instrumentis ad Anatomiam necessarijs.

Præcipua instrumenta huc necessariò pertinentia, sunt numero quatuor, vt culter, forceps, acus & filum. At vt melius atq; expeditius negotium perficiatur, præter hæc ad manum esse debent scalpella, vinci, styli teretes triangularesq; serræ, terebræ, malleolus, modiolus et spongia, reliqua ex Vesalio & Fernelio.

CAP: OCTAVVM, Et vltimum de ordine.

In diuino hoc animæ non tam diuersorio, quàm omnibus suis viribus exprimendis organo accommodatissimo, cum duo consideranda sint, primò totum, secundò omnes eius partes, & nos prius de toto Platonis exemplo, qui in politicis prius ciuitatem, quàm domus & singulos homines aggreditur, deinde de partibus agemus.

In vniuerso corpore contemplanda, est figura, quam Deus homini dedit ad animæ infinitas, variasq; operationes exprimendas erectam: siquidem cum corpus animæ diuinæ sit instrumentum, et quasi lucerna, quò vt per lucernam lumen, sic per corpus animæ actiones passioneshq; translucerent, ita componi oportuit, vt omnibus animæ actionibus ancillari posset. Hinc factum est quod Deus homini soli inter omnia animalia manus instrumentorum instrumenta concesserit, quibus organa sibi machinatur ad omnes artes exercendas, ad vitam tranquillam, commodam & beatam ducendam, pertinet & huc magna distantia beneficio clauicularum, brachiorum à pectore. Quò verò manus tot adeoq; varias actiones ederent, necessum fuit adiungi corporis formam ad eas operationes exequendas, quàm accommodatissimam. At nulla forma alia aptior

INTRODVCTIO in Anatomiam.

ad hæc est, quam erecta, & ea, quam inter sedendum adipiscitur, in his enim formis Philosophari, scribere, equitare, texere aliasq; infinitas exercere potest artes, & vitam civilem ducere, nemo enim pronus vel supinus quid boni præstat, manuum itaque causa homini soli contigit forma corporis erecta. Quod verò Plato dicat, homo cum Diuinus & cœlestis existit, sursum aspicere debet, & hominem ἀνθρώπου vocatum propterea, quod sursum spectet, non vult intelligi hominem debere seipsum supinum inclinare, ac oscitando cœlos intueri: Sed mentem iubet ad cœlos erigi. Siquidem sunt inter bruta, quæ vel inuitè cœlos aspicere coguntur, vel promptius commodiusq; diuina intuentur, vel æq; bene, ac homo. Est enim piscis, qui eò quod oculos in superiori capitis parte collocatos habet ὑπερόπτιος, id est, cœli spectator appellatus est. adde quod auibus longo collo præditis promptius sit sursum aspicere, et quoquo versus oculos promptè circumferre. Quid etiam obstat boui, equo, asino & similibus, cur non æq; ac nos sursum spectent, at homo nisi collum retrorsum reflexerit, nunq; cœlum viderit.

Ad inutilem prolixitatem euitandam, silentio prætereo opinionem Aristotelis, qui rectæ staturæ causam potius ossis femoris, & coxæ articulationis conformationi ascribendam, caliditati tribuit.

Omitto etiam breuitatis ergò humani corporis pulchritudinem elegantissimamq; structuram, atq; partium concinnam compaginem, quæ omnia suo tempore & loco hic inferi poterunt. Hæc de humano corpore eoq; integro atq; illa sô. Nunc de particulari corporis consideratione, in qua minutissimæ quæq; particula quàm diligentissimè sunt perscrutandæ atq; inspicendæ.


Postq; frequentissimè multis de causis, præcipuè verò situm partium declarandi gratia, tum huius, tum illius particulae incidit mentio, primò docendum, quomodo singulae corporis partes, prout sensibus nostris occurrunt, nominentur, deinde per sectionem aliæ latentes atq; incognitæ aggrediendæ. Ad appellandas externas humani corporis partes spectant tabulae meæ primæ, nunc de internis Notissimum est, vt ad arandum bos, ad indagandum canis, sic ad duas res nempe intelligendum & agendum hominem creatum, corpus verò, vt sit sustentaculum & instrumentum plurimorum motuum diuersarumq; operationum factum, quare componi debuit ex multis varijsq; organis. Verùm quia operatio quælibet absq; multorum adminiculo nec seruatur diu, nec etiam fit, necessum est, vt organa particularia illi concedantur. Vnde Hippoc: sic inquit: In totius corporis compaginem (quam ελομελίου vocat) omnia consentiunt, partis cuiusq; particula ad eius actionem conspirant, eaq; sibi consentiunt, id est, in famulatum vnus operationis conspirant, ad particulas paruas minimæ, ad minimas omnium minimæ.

Anatomici nostri corporis partes duplices constituunt, vtpote instrumentales et similes: instrumentalium natura ex similibus dependet, quare vt organicarum & ex consequenti totius corporis natura nobis innotescat, prius similiarium cognitio, quæ ante Anatomiae administrationem semotis corporibus, ex lectionibus hauriri debet, habenda. deinde ex inspectione dissectorum corporum, dissimiliarium siue instrumentalium essentia addiscenda est. At cum plurima sint instrumenta, quæ vno eodemq; tempore, præcipue vbi in vnus vel duorum triumue corporum (vt in publicis contingit scholis) dissectione vniuersam anatomiam absolueri oportet, dissecari nequeant, ordo erit seruandus, in scholis talis expetitur ordo, vt à partibus, quæ primò corrumuntur, & scetorem iuducunt, exordiat, quare ventrem inferiorem primò secamus, secundo thoracem, vel cerebrum, vltimo musculos, venas, arterias & nervos. Caterum sunt nonnullæ partes communes, absq; quarum dissectione ad intimas ventris partes peruenire non licet, sunt autem hæc cutis, pinguedo, membrana carnosâ & muscoli abdominis, vnde harum historia prius, quàm interiorum aggredieris, percurrentia, atq; in his, quid considerare oporteat, demonstrandum, Hæc de prolegomenis, cum vniuersalia tantum attingere decreuerim, huic loco sufficient, quod si quis exactiorem atq; magis diffusum postularit ordinem, legat

Fernelij Physiologiæ libri primi caput 16. in quo vt eruditè, sic summa elegantia, succincto ac concinno ordine viam, quam Anatomicus quique, in publicis Theatris dum anatomiam administrat, sequi debet, dilucide demonstrat.

EXTERN: HVM: CORPO: PART: TAB:

Generalis externarum humani corporis partium diuisio.



HUMANVM CORPVS VA-
 rij auctores uario modo distinguunt.
 Diocles Caristius in epistola ad Antigonom
 regem in caput, thoracem, uentrem & uesti-
 cam diuidit. Aegyptij, Hippocrat: Aristot:
 de histo: animal: Ruffus alijs; omnes autē
 qui, in caput, collum, thoracem (sub quo &
 abdomen, siue uentrem inferiorem, siue to-
 tum truncum comprehendunt) manus &
 crura distinguunt. Galenus et neoterici uen-
 trem à thorace separant, quapropter corpus
 humanum diuidere licet in

EXTERNARVM HVMANI CORPORIS

De capite & partibus capiti annexis.

Circumferentia uel ambitus extremus, πρὸς τοῦτον & σφαῖρα, id est, corona appellatur, quia coronas ipsi imponere solent. Huius uero

Capillatam, uel orbem, quem imae capillorum radices describunt. Hæc pars uocatur ab Aristote: τριχόωδον, Lat: Calua: huius

Caput, Græ: κεφαλή & κέφαλον, ὀφθαλμοῦ τὸ ἐκ κεφαλῆς λου id est, cerebri uasculum: Poëtis κεφαλή, κεφαλή, Dorienfibus κεφαλή & κεφαλή dicitur. Lat: proprie cranium & cerebri caput uocatur: Nam si alterutrum horum uulneratum sit, uel dolorem sentiat, caput laborare dicitur: Caput uero uocatur, quod sensus ab eo initium capiunt. Imo proprie sumitur pro eo, quod collo super impositum est, distinguatur in partem

Capillis priuatam, de qua legas sequentem tabulam.

Anterior pars à parte capillosa ad suturam coronalem, à lateribus ad tempora usque protensa, à quibusdam ad frontem refertur, à quibusdam ad sinciput, quod ὤψων Græ: dicitur, ὅπερ τὸ βρεχέμεν id est, ab irrigando: nam hæc capitis pars humidissima molissimamque est, in infantibus præsertim. Hæc enim in parte pueri fons pulsans et tinctur, ab Arab: tendih, à recentioribus fontanella dictus. Puriores scriptores, ut Celsus, & Plinius hoc uocabulum sinciput in usu habuere. Poëtæ antiqui uocant sinciput absque ullo discrimine anteriorem & posteriorem capitis partem. Dicit uolunt sinciput, quasi semicaput: at potius, quasi summum caput dicendum. Posterior & auersa pars capitis, ad cervicis musculos, Græ: ὀπίσθεν τῶν ὤμων id est, à nervis qui estimantur inde prodire, Lat: occiput & occiputium utendo uocatur.

Pars inter occiput & sinciput media proprie σφαῖρα, Lat: corona quia ibi capilli corone modo contorquentur, Græ: etiam κορυμμή. A Latinis, quod ibi capilli in gyrum uertantur, uel, ut Quintil: ab ob flexum capillorum, uertex dicitur: Eadem pars Græ: μεσότης τοῦ κεφαλῆς, ἑλκυστός & ὠδῶν, Lat: polus & axis item κεφαλή, κορυφή, & σφαῖρα, ubi in medio quasi deponitur, in quibusdam duplex reperitur, ij macrobij & biuertice quibusdam dicuntur. Laterales utrinque partes planæ, à Russo κεφαλαίαι, κόρυμβοι, Lat: tempora, quia sua macilentia & cunctis ætatis annos produnt, Vnde senes à Poëtis τριχόωδον κεφαλαίαι dicuntur, id est, cani circa tempora.

Tota congeries, Græ: κόμη, καὶ τὰ, & λαχύν: Lat: nis uero in congeries præfata κομὴ, à tendendo.

Viris, à frequenti cessione, cesari appellatur: Vnde cesariatus militis id est, comatus.

Cumulus in fronte à quibusdam κεκομῆτα, quasi capillus in priore capitis parte copiose relictus.

Separatio à uertice ad frontem protensa bregma diuidens, à Gaza discrimen & æquamentum dicitur.

Cumulus occipiti familiaris, Russo καὶ τὰ Lat: iuba, quam constituunt crines à collo animalium dependentes.

Pormissi comam constituentes καὶ τὰ proprie crines uocantur.

In temporibus primus exortus à Russo ὀπίσθεν, à Lat: lanugo: alias χυρὸς uocatur.

Qui iuxta aures demittuntur παραοπίσθεν, Lat: cincinni dicti sunt, præsertim cum contorti sunt.

Prolixi & teneri, σπυρρίαι.

Sordidi & turbati, à Comicis σόφρυες.

Apex in muliebri comptu κόρυμβος, à Martiale cincinnus.

Pili foeminarum contexti in similitudinem caudæ uel calamistrati, cirri dicuntur, ab alijs cincinnati.

PARTIVM TABVLAE.

3

Partem superiorem ortam à superiori capillorū radice, palpebris oculorum terminatam & ad tempora usq; protensam, quæ uocatur μετωπε Græcè: Lat: frons. Alij autem uolunt id spaciū frontem dici, quod inter supercilia & pilos patet, pilis nudum: Alij, quod ab oculis ad coronalem suturam usq; interiacet. Varro frontem uocatam uult, quod ab oculis foretur: alijs à ferendo, quod animi indicia præferat. Attamen si propriè uelimus intelligere frontem, prior etymologia fronti competet. Frontis uerò

Cutis mobilis Græcè: πρῶτον πινδίου & πρῶτον πινδίου à Polluce uocatur.

Rugæ, nempe quæ in frontis cute protensa sunt, dicuntur ὀφθαλμοὶ, ὀφθαλμοὶ, ὀφθαλμοὶ & ὀφθαλμοὶ uocantur.

Extrema ruga, quam oculis inducimus, quoties quid cogitamus attentius, aut erubescimus, à Russo ἐπικύριον uocatur: Lat: supratentorium: nonnulli partem sub supercilijs carnosam ἐπικύριον appellant.

Protuberans siue prominens pars instar imbricamenti, aliorum humores deriuans, γαστήρ & γαστήρ uocatur. Gaza Grunda apud Aristotelem interpretatur.

Pars naribus proxima ὀφθαλμοὶ καὶ φάλα Lat: superciliorum caput appellatur. Pars ad tempora accedens ὀφθαλμοὶ & ὀφθαλμοὶ id est, superciliorum finis seu cauda.

Vtriusq; supercilij intercapedo Græcè μεσοφθονοῦ & μεσοφθονοῦ, à situ quasi mediū inter oculos. Quando uero supercilia

Coeunt, ut hoc interstitium hirtum sit συνόφθονο & μεσοφθονο uocant

Separantur parte glabra, glabella dicitur.

Superioris palpebrae superficies specialiter à Russo κοίλον Lat: cauum, quamuis eo nomine ois cavitatis designari possit. Sunt qui hoc nomine cavitates uocant, quæ sub oculis utraq; nasi parte cernuntur, at canthi melius dicuntur.

Inferioris superficies ὑποκοίλον Lat: subcauum à Russi interpretibus appellatur.

Tota pars κυλινδρική & κυλινδρική uocatur. Extremum antiæ quis ciliū appellatur. Rugæ & lineæ superiori magis familiares, ὀφθαλμοὶ & ὀφθαλμοὶ

Tota pars κυλινδρική & κυλινδρική uocatur. Causa regio sub palpebra inferiori ὀφθαλμοὶ ὀφθαλμοὶ ὀφθαλμοὶ suboculare dicitur.

Congressus utriusq; in sequenti.

Frontis extremitates pilis ornatas, quæ ὀφθαλμοὶ Lat: supercilia appellantur. Has Plinius ambitum genæ superioris uocat. Græcè dicuntur γαστήρ, et γαστήρ ὀφθαλμοῦ. Item ἐπικύριον, πρῶτον πινδίου καὶ ὀφθαλμοῦ. Prisci extremū ambitum, superioris genæ uel palpebrae cilium appellare solebant: Vnde supercilium dicitur, & cilones, qui recisa uel depressa sunt fronte. Cicero de natura Deorum subgrunda uel suggrunda appellat eo tempore, quo oculis superinducantur. Aliàs nullum, quod Gale: uocat Χόρα. Superciliorum autem

Prima oculi orbitam cum palpebris cavitatēq; orbitali circumscribit, quæ cavitatis κόρυς uocatur alijs concha ac comprehendit palpebras & oculos.

Secundæ partes sunt palpebrae duæ, superior & inferior: Græcè: ὀφθαλμοὶ. Lat: à Terentio palpebrae, quod frequenter palpitent: à Plinio & Ennio genæ uocantur. Poëtæ antiqui uocant ὀφθαλμοὶ φύλλα, ac si diceret oculi folia. Græci quod oculos tegunt καλὴ μαστρά: & Cicero 2. de natura Deorum oculorum tegumenta uocat. Aristoteles item ἐλκυστρά. Galenus τρέχον nominat: harum

Tertie continent oculos.

Quartæ nasum.

Quintæ genas.

Sextæ locum sub naribus, ad labrum superius pertingens.

Septimæ labra.

Octauæ partem ab inferiori labro ad gulam usq;.

Nonæ barbam.

Decimæ aures.

Numerus his partibus assignatus tibi singularum partium tabulas demonstrabit.

Partem inferiorem, quæ à supercilijs summoq; nasi incipit, & ad collum terminatur. Hæc à Collis & Polluce facies uocatur. Apud Aristotelem, Russum, & alios faciei pars est, proprio carens nomine. Hæc plurimus habet partes, quarum

Pars capitis capillis destituta, caluæ subest: eaq; in homine uocatur ab Aristotele, lib. 1. de hist. animal: cap: 8. πρῶτον πινδίου, quia, ut idem testatur lib. 3. de partibus, cum erecta sit, πρῶτον πινδίου id est, procul uidet Lat: facies & uultus. Iulio Polluci facies id uocatur, quod fronti sub est, eaq; facies propriæ. Latinis facies totum os dicitur, ut Ouidio uultus, à uoluntatis iudicio, Græcè: πρῶτον πινδίου. Diuidunt autem frontem, in partes tres.

EXTERNARVM HVMANI CORPORIS

Per se Græcè βλεφαρίδες, Latine cilia dicuntur. Hos Nicander οκνυα, Cornelius Celsus pilos palpebrarum, Plinius & Lucret: poeta palpebras uocant. Vocant & χαῖαντες, quod Cicero uallum uertit. Ruffus uocat hos pilos ταρσός.

Pili

Cum inter dormiendum se mutuo contingunt, dicuntur χαῖαι, id est, ungula, & σεφάνα, id est corona.

Congressus utriusque in comiendo, uel inter dormiendum, uel illa pars, qua ueluti tereti fimbriola pili palpebrarum enascuntur, uel extremus palpebrarum ambitus, uocatur ἐλκτρον ἐν τριχομα, δὲ χαῖος, ταρσός, huius ambitus

Laterales extremitates à Ruffo etiam ad ταρσόν referuntur, à Latinis ad oculos. Vocantur autem ἡγυβοί, Latine anguli oculorum, à Seruio hirci, sunt autem in singulis duo, quorum

Naso proximus, Græcè ἐγυγυβίς proprie ἐκ τῆς καὶ πρυβί, canthus maior & angulus internus, huius

Cauitas, ex qua lacryma emanare uidentur, Græcè πρυβί, Lat: fons dicta est. Cauitas hæc ubi lacrymarum conceptacula sunt, sinus dicitur teste Seruio in 4. Aeneid: Virgil.

Caruncula à Fallopio ἐγυγυβίς uel ἐπὶ ἡγυβίς improprie.

Tempori propinquus, Græcè παρὼπία, Lat: canthus minor, & angulus exterior.

Foramina minutissima ad causam maiorem, lacrymarum causa facta, à Fallopio puncta lacrymalia uocantur.

Illud nitidum in medio pupillæ existens, ubi imago cuiusque rei uise, tanquam in speculo relucet, Græcè πεισός, dicitur, estque lux & acies oculorum, nonnullis pupilla dictum.

Simulacrum, quod in acie apparet, ὕλην à Ruffo uocatur. Foramen, quod ab Iride circulo constitui uidetur, Græcè ῥέον, Lat: proprie pupilla, & pupula, uisio à nonnullis, à colore nigro oculi. Pupilla dicitur ab antia quo uocabulo pupæ uel pupi, quod pueros & puellas significabat. Tam absoluta, inquit Plinius, uis speculi oculis inest, ut tam parua illa pupula totius hominis imaginem reddat.

Oculos ipsos, quorum diuersæ sunt partes diuersis nominibus appellatæ: quas enumeraturus à medio siue à centro incipiam

Oculi ab oculendo, quod à palpebris occultantur, dicti sunt, Græcè ὀφθαλμοί, ὀμματα, βούλαβοί, ὀφθαλμοί: poetis ὄρε & ὄρε ex lumina, κύκλοι: Spartanis ὀπίλοι: ὀπες. Ionice ἱμοί: quibusdam δέρυματὰ uocantur: Hesychio ἡλίου πύλαι. Solis portæ, in quibus animus habitat. Cic: uocat animi indices. Hic duo comprehendimus

Circulus pupillam ambiens, inter eam et oculi album medius, Græcè & Latine iris dicitur, eò, quod colore, ut cæli iris, uariatur: quia etiam coronæ modo nigrum cingit, σεφάνα, id est, corona uocatur: à nonnullis σφενδὼν, quia tanquam circulus aureus gemmam, oculi pupillam cingit. Iridis autem

Partes pupillæ proximæ & nigra Græcè: πεισός uocantur.

Album nigrum ambiens Græcè λευκόπ, id est, album nominant. Nicander uocat λογάδα, alij per metaphoram σφονδύρα, id est, fundam, alij etiam κυκλάπιον.

Circulus candido proximus & albus, pupillæ lymbus dictus est, nebuloso circa Solem aut Lunam circulo persimilis existens.

Vbi album finitur & palpebrarum sunt fines, πείμνος uocatur, Lat: extremitas albi oculorum.

Spacia ambientia in interna parte oculi, aurora uocantur.

PARTIVM TABVLAE.

5

Ossea & immobile, quae utrinque
ad males uergit & genis proxima
est, huius

Tota pars dorsum, à quibusdam summum nasi dicitur: Superior
uero, quae supercilijs proximè subiacet, à quibusdam, sed impro-
priè ῥιμός, Lat: colatorium appellatur.

Acuminata pars, Græ: ῥάχις, Lat: spina & scapula uocatur.

4.
Nasus Græ: ῥίς uel ῥίς, ab Aristotele μύκ-
της, à Sophocle μύξα: item μύξωτης, à
mucore, qui ex naribus effluit, uocatur à quibus-
dā ῥιμός. Diuiditur autem in

Cartilaginosa et mobilem, quae
est dilatator nasi pars, sese fun-
dens in naves, uocatur ἀντοπί-
ος, id est, nasi summitas, uel inum
nasi: à ποιῆς ob rotunditatem
ὀφθαλμοῦ, Lat: caput & globulus.
Huius autem

Exteriores utrinque & infimae partes, foramina ambientes & mo-
biles inter respirandum, tubuli forma praeditae, ῥιέπυλα, id est,
alae narium uocantur: ab alijs ὑπὸναι, à quibusdam pinnae di-
cuntur.

Duo foramina Græ: ῥόποι, à Ruffo ῥίγες καὶ ῥιόδονες: à nona
nullis θαλάμους, id est, caernae uocata sunt: Aristoteles appella-
uit ῥιέπυλα, id est, spiritus uel mucoris uehicula. Phil: Mes-
lanth: μύκτες. Nasi nomina, foraminibus etiam attribuuntur.

Diaphragma siue septum, quod
foramina à se mutuo separat,
διωφραγμα dicitur, diuidis
turque in

Interius, quod propriè septum
uel diaphragma dicitur.

Prominentius, ac labris uicinia
us, carnosum, quod ῥιόνα
cant, id est, columnam.

Cavitates externae existentes inter partem osseam & cartilaginosa
sam ῥιόνα uocantur.

Pili, qui in naribus nascuntur, à Pompeio Feslo uibrissae uocati sunt,
quod, cum euelluntur, ui, caput uibratur.

Superior inter nasum & aurem sub oculis leuiter eminens, pilis nuda, pudoris sedes,
propriè ῥιόλον Lat: mala, à mali similitudine, quantum ad ruborem & rotunditatem
attinet, uocatur. Hippoc: eam partem uocat ῥιόλον ῥιόσσω, id est, faciei circulo,
latini etiam genam appellant.

5.
Genae, quas non exactè autores distinguunt suisque nomini-
bus appellant. Confundunt enim inuicem malarum et Buccae
carum uocabula. Nos autem parti faciei, à lateribus nari-
um sub oculis ad mentum usque protensa, duas assignabimus
partes, quarum

Inferior sub malis laxior, quae spiritu inflari potest, propriè ῥιόλος, Lat: Bucca dicitur.
Vnde Gnathones. A quibusdam γένος, id est, gena, παρὰ, στόμα.

Extremum ambitum prisci Graeci cilia neminabant.

EXTERNARVM HVMANI CORPORIS

6

Totum à columna ad superius labrum, ubi primum lanugo prorumpit, ὑπορρινιον καὶ μύσταξ, ἀπὸ τοῦ μυκτῆρος, à muco narium, quia illic mucus narium defillat, Lat: dicitur mystax, apud Homer: ὑπὶν, quod uocabulum etiam significat superioris labri barbam.

6.
Locus sub navibus ad labrum superius pertingens, cuius

Cavitas uel sulculus sub columna findens hyporrhinum et labrum superius, uallectula similis, Φίλατρον, tanquam diceret, amoris illecebras, à Lactantio lacuna dicitur.

Singula, scorsim sumpta, diuersa consequuntur nomina. Nam

Superius δ' ὠχέλου, id est, labrum superius appellatur: alijs generaliter labrum.

Inferius κατ' ὠχέλου, id est, labrum inferius: alijs hoc proprie appellari nolunt labrum.

7.
Labra, quae dicuntur oris extremitates musculosae, ipsum undiq; claudentes aperiennesq; Gra: χεῖλεα ἀπὸ τοῦ χεῖν λόγον, quod sermonem fundant, Lat: labra et labia: horum

Partes utriq; communes communis uocabulo appellantur, ut utriusq; labri prominentia πρὸς χεῖλον ἢ πρὸς χεῖλεος dicitur: Homero μύστωξ, Hippoc: πρὸς βουχὸν καὶ χεῖλεος. Vtraq; simul sumpta seu coniuncta, pro forma conformationeq; sua diuersis nominibus donantur. Etenim

Cum mutuo congregiuntur, uel consortio labiorum, προσόμιον καὶ προσόμια uocatur.

Cum mutuo diuiduntur uel inciduntur, id est, sectio, quae os efficit, στόμα ἢ λογιόν nonnullis à Sermonem: Lat: os dicitur. Item bucca, ab Homero μύστωξ.

Cum ita distenduntur, ut partem sibi uicinam lineis quibusdam terminent, quemadmodum in homine ridente uel cane irascente conspicuum est, seu contortio labiorum rictus dicitur, Gra: σίστην, id est, σίστην, id est, uel risum uel iram os in rugas diduco.

Extremitas ambitum oris efficiens, κυμὸς uocatur.

Integra pars γένειον, Lat: mentum, quia à gula eminet: à nonnullis πώγων, quod illa pars in barbatis praecipue barba exornatur.

Quae ab inferiori labro in acutum et extremum definit, cuius

Fouea mento indita ornatus causa Gra: νύμφη Lat: nymphe: ab alijs τῦρξ uocatur.

8.
Pars ab inferiori labro ad gulam usq; diuiditur in eam

Eminens et acuta menti pars à Poll: δξύγων ἢ γένυς.

Quae carnosae existens, à menti sine siue acumine incipiens ad faucium principium definit, Gra: ἀνθεράων à barba flore, quae ibi maxime floret: ab alijs λευκήνεια ἢ λευκήνεια: Vulgo antherion: Buccula à Suetonio.

PARTIVM TABVLAE.

7

9.
Barba, qua mentum, superius
labrum et genae inuestiuntur,
huc etiam pertinet. Ea autem

Plena & tota, cum

- Primo incipit prorumpere, à Didymo $\chi\upsilon\upsilon\upsilon\varsigma$, id est, lanugo.
- Adoleuit, $\omega\acute{\omicron}\gamma\omega\upsilon$, ab alijs $\upsilon\pi\tau\acute{\iota}\nu\eta$, Lat: barba.
- Pili barbæ $\gamma\epsilon\upsilon\alpha\acute{\omicron}\delta\epsilon\varsigma$ uocantur.

Pro diuersitate partis
um, quas exornat, di-
uersa adipiscitur nos-
mina, ut:

- Prima genarum lanugo, quæ per malas serpendo non aliter, atq; $\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ uermis, se conuoluit, $\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ dicitur, Suidæ $\tau\omicron\upsilon\theta\omicron\varsigma$.
- In probarbio uel in labro su-
periori, cum
- Primo molles prodire incipiunt $\pi\epsilon\sigma\omega\pi\omega\gamma\omega\upsilon\upsilon$ et $\upsilon\pi\epsilon\gamma\epsilon\iota\varsigma$
 $\nu\omicron\upsilon\upsilon$, Lat: probarbium dicitur.
- Postea induruerunt, & utrinq; rigidi eminent, $\mu\acute{\upsilon}\sigma\tau\omicron\chi\alpha\varsigma$, L:
Mytaces uocantur.
- Inferiori labro & mento annascens $\omega\acute{\omicron}\pi\tau\omicron\varsigma$, quod carduorum floribus similis sit, uocatur.
Sub mento quasi foliula prodicens $\upsilon\pi\tau\acute{\iota}\nu\eta$ uocatur, Lat: hypena.

10.
In aurium partibus tum distin-
guendis, tum nominandis autho-
res admodum confusi & obscuri
sunt: equidem conabor ex scrip-
tis illorum ueram distinctionem,
propriamq; etymologiam elicere.
Tota igitur illa pars ex cartilae-
gine & carne constituta, quæ
uanni modo auditorium meatum
cingit Græ: $\pi\epsilon\gamma\upsilon\gamma\omega\mu\alpha$, id est,
ala $\delta\varsigma$ $\omega\tau\omicron\varsigma$ Lat: auris, quod
uoces bauriat, uocatur. In aure
autem consideratur uel

Tota, cuius

- Circunductio subter alam, tempora spectans, ob uariam complicationem & circunvolutionem,
 $\epsilon\lambda\epsilon\gamma$, id est, uolutulus, & per metaph: $\nu\omicron\chi\lambda\acute{\iota}\alpha\varsigma$, id est, cochlea uocatur.
- Anterior pars, priori opposita, in cuius medio est cauum $\kappa\omicron\gamma\chi\eta$ uocatum, $\alpha\acute{\upsilon}\theta\epsilon\lambda\acute{\iota}\varsigma$ dicitur, ab
alijs $\sigma\kappa\alpha\phi\omicron\varsigma$, id est, limter, à scaphæ siue nauiculæ similitudine.
- Extremus ambitus ab anteriori in interiorem retrusus, atq; in summita-
tibus reflexus in circuitu usq; ad lobum, $\kappa\upsilon\beta\omicron\epsilon\iota\delta\acute{\iota}\varsigma$, id est, cubiformis,
 $\kappa\upsilon\beta\tau\omicron\epsilon\iota\delta\acute{\iota}\varsigma$, id est, curuiformis, siue gibbosus dicitur.
Dimidius orbis uel semicirculus sub hoc ambitu rotundus, & in micro-
nem exurgens, $\epsilon\upsilon\sigma\eta\epsilon$ uocatur.
- Partem ab auditorio
meatu sursum uersus
tempora expansam,
quæ $\pi\epsilon\gamma\upsilon\gamma\omega\mu\alpha$, id
est, ala uocatur, Lat:
proprie pinna. Huius
autem pinnae
- Solum siue panimentum $\nu\epsilon\sigma\tau\omega\upsilon$ dicitur uel à plana
su uel quasi ricinus.
Superior cavitatis $\alpha\sigma\tau\omicron\kappa\omicron\varsigma$.
- Concauum inte-
rius totum, quod
anthelici uel acu-
mini auris subia-
cet, $\kappa\omicron\gamma\chi\eta$ $\kappa\epsilon\iota$
 $\nu\omicron\gamma\chi\iota\omicron\upsilon$, id est,
conchula uoca-
tur, cuius
- Cauli pars, quæ in
aure, quæ se supra
tempora effert, ueluti
intrò declinat, $\tau\epsilon\alpha\gamma\omicron\varsigma$,
id est, hircus,
quia concamerata
esse uidetur: uoca-
tur & $\kappa\epsilon\mu\acute{\alpha}\rho\alpha$, id
est, camera. Huius
- Pars iuxta tempora $\alpha\kappa\omicron\upsilon\eta$
dicitur, id est, pila, cuius mo-
do cauata uidetur.
- Contraria pars, quæ uersus
tempora protuberat, $\alpha\upsilon\tau\acute{\iota}\alpha$
 $\tau\epsilon\alpha\gamma\omicron\varsigma$.
- Cauitas iuxta auditoriū me-
atum, in qua ueluti in alueo
Sordes colliguntur $\kappa\upsilon\beta\epsilon\lambda\eta$,
id est, alueus.
- Pars declinior propriorq;
faucibus uasorum, per quas li-
quor effunditur, $\epsilon\chi\upsilon\iota\omicron\kappa\omicron\varsigma$,
quod nomen iudiciarij uasculi
liffuces notat.
- Particulatū us-
na quæq; pars,
quæ diuiditur
in
- Auditorium meatum, qui $\omega\tau\omicron\varsigma$ $\alpha\kappa\omicron\upsilon\varsigma$
 $\sigma\iota\kappa\omicron\varsigma$ dicitur.
- Inferior, quæ soluta à maxilla inferiori depen-
det, $\pi\epsilon\sigma\omicron\lambda\omicron\beta\iota\omega$.
- Superior pars, quæ tendit uersus alucum $\tau\epsilon\tau\acute{\iota}\varsigma$,
id est, cicada dicitur, quia ab ea parte
Athenienses indigenæ cicadas appendere so-
lebant.
- Partem inferiorem, carnosam, ab
ala pendentem, quæ uocatur $\lambda\omicron\beta\omicron\varsigma$,
Lat: lobus, siue auricula:
huius
- Suprema pars asperior, imæ auriculæ contra-
ria, $\alpha\upsilon\tau\iota\lambda\omicron\beta\iota\omega$: qua parte puto intelligen-
dum septum, quod in impressis tabulis rich-
iam appellant.

EXTERNARVM HVMANI CORPORIS

De collo.

Summitas à quibusdam ῥόγχος, Lat: guttur, uulgo pomum Adami appellatur.

Anteriorem partem, que
Græ: δειρὸν καὶ λαμῖος,
Lat: guttur, gula et iugul-
lus à Valla uocatur: huius
autem

Inferior pars, que monilibus
est: huius autem

Pars, que in anteriori parte cum pectore coniun-
gitur iuxta clauiculas, ὑπερακλῆς καὶ παρὰ
φρενὶς, quod circa iugulum sit, ubi ihyms est.

Cauum, quod est in osse sterni inter utranq; clauicu-
lam, collo & pectori commune, Græ: στήθος, Lat:
iugulus, quia hic locus cædi est obnoxius. Ruffus
uocat λευκαίον. A medicis antiquis ἀντιπνεύ-
μων, lacuna à nonnullis. Celsus non uidetur acces-
sisse iugulum pro fouea, sed iugalia ossa intellexis-
se, sicut & Ouid: ut ita iugulus uideatur dictus à
iungendo.

Pars, ni fallor, paulò supra iugulum faucibus subie-
cta, que per iram incensa inflatur et intumescit πνεύ-
μα, sicut dicitur.

Collum, quod Galenus indifferen-
ter τραχήλου καὶ ἀνχένας uo-
cat, Ruffus per Synechodochē
δὲ γλῶ: Lat: collum, à colendo.
Nam torquibus & monilibus or-
natur: Vocatur & λόφος λο-
φία λοφίως: estq; illa pars,
que inter caput & pectus est:
totius colli ambitus περιδερῖος
dicitur. Diuiditur autem in

Partes laterales, quarum

Partes sub auribus exortæ, ad
latera sub maxillis antror-
sum uergentes, παρὰ τὴν δὲ
dictæ sunt.

Partes, à parotidibus ad iugulum & asperæ arteriæ latera tendentes, τίβερα, id est,
cornua.

Gibbæ partes laterales & carnosæ, uertebris annatæ, tendentes ad terthra, παρὰ
λοφίαν: posteriori cervici sunt etiam communes.

Vbi à lateribus cum scapulis collum committitur, ἐπὶ ὤμῳ dicitur.

Posteriorem, que ἀνχένας
Lat: propriè cervix di-
citur: huius autem

Superior pars occipiti proxima, quia in capitis motu tenditur, à Ruffo νέω, Lat:
tendo uocatur: Item ἀσφάλεα, λοφία & λοφιδία, λόφος etiam.

Cauum inter primam & secundam uertebram ἐπὶ στήθεος à cæde: Nam hac par-
te fracta ceruice interit homo, Lat: fouea dicitur.

Inferior pars, que cum dorso committitur, etiam ἐπὶ ὤμῳ uocatur.

De Thorace siue medio uentre.

Superior pars ἀνωσθίων, id est, summum pectus uocatur.

Partes inter acromia & iugulum Græ: & Lat: κλεῖδες, claues à celso.

Partes laterales, instar mediæ lune curuatae, πλευραὶ latera, & περιστερναὶ pectus
ambientia uocantur: item per metaph: crates, cō, quod series costarum in formam cratis
um latera constituat: Sunt autem latera duo, dextrum & sinistrum.

Medium totum Græ: στήθον, Lat: Sternum, quod in medio costarum sternatur, uocatum
est. Sterni autem medium, quod quasi sulculum exprimit, στήθιον dicitur.

Loca carnosæ & depreßiora inter costas spacia, spacia intercostalia nominantur.

Cavitates insignes sub humeri articulis, in quas sæpè humerus luxatione delabitur, &
ubi pili nascuntur, Græ: μασχάλαι Lat: axilla, ale, & Atticis μάλα uocantur, à non-
nullis ἀγκύρες.

Glandulose eminentiæ, pectori ad herentes,
seminis propriæ, mammae & mamillæ uocate
sunt: hæc cum

Mamillarū extre-
mæ eminentiæ in
medio constitutæ,
duo habent, nimis-
rum

Totam eam partem que
Græ: θηλή uocatur, La:
papula & papilla.

Areolam, quasi pupillæ
& iugellum ambitum,
qui φῶς, id est, inustus
dicitur secundum Pollu-
cem.

Primum tument, κύματι uocantur, id
est sabbæ, unde puellæ κυμαίνεσθαι
dicuntur, quarum mammae fratrant, id
est primum tument secundum Festum.
Iam ad iustam magnitudinem creuere
& lacte tument, per Metaph: ἀκνῶς
ματὰ dicuntur: generali uoce ali-
as πτεῖλαι, πτεῖλαι, πτεῖλαι mammae,
mamillæ μαῖοι, μαῖοι καὶ μαῖοι.
Plinius rumen pro māmā accipit. Vos
cantur et δόματα, id est, ubera, id las
men propriè de onibus & brutis.

Medius uenter, Græ: & Lat: tho-
rax dicitur, estq; pars costis septa
que utrinq; à costis ab anteriori
& posteriori parte circumscribitur.
Hipp: Ruff: Pollux alijsq;
nonnulli totam illam partem, que
à iugulo ad os coxendicis perti-
net, pro thorace accipere, et eam
partem uocantur ὀλμοῦ, id est,
pilam eulimariam siue mortariū.
Ego cum Galeno thoracem ab
abdomine separabo. Vocatur
Dorica lingua à Galeno κίθαρις
ab Hipp: κίθαρις: uocatur &
pectus à cavitatē γυαλῶν: θῶς
græ, quod includat diuinam men-
tis partem secundum Stoicos. Di-
uiditur autem thorax in partem

Posteriorem, que ær signum A in sequenti tabula.

Protuberantia acuta spinarum aculeis similis in dorsi medio, Græ: ῥάχης: Lat: *spina dorsi et nigricans*, id est, *discrimen*: uocatur à quibusdam poetis κρόνις καὶ κρόνιον.

Medium ubi pili pudendorum prorumpunt, & pu-
denda incipiunt, Græ: ἐφ' ἑσίου Lat: pubes, nam ibi
pubertatis signum prorumpit: uocatur & τριχά-
ρις, ἢ βύβη, ἐπίσκιον, ἐφ' ἑσίου: hæc pars Plinie
est imus uenter: uocatur & peden.

EXTERNARVM HVMANI CORPORIS

Departibus procreationi inferuentibus.

Virilia genita
lia atq; uirilia
dicta, quæ dis
uiduntur in

Penem pendulum, & prominens
tem, seminis eiactationi reddi
tionisq; urinae inferuentem, qui à
Gr: $\epsilon\phi\alpha\chi\lambda\upsilon\ \mu\acute{o}\rho\iota\upsilon\mu$, id est, mē
brum uocatur, et $\nu\epsilon\alpha\ \nu\lambda\delta\varsigma$, Lat: co
les seu caules: item $\sigma\acute{\iota}\mu\mu\alpha\ \tau\omicron\delta\delta\epsilon\upsilon$:
à Xenoph: $\tau\omicron\delta\delta\epsilon\upsilon$: ab Aristo
pha: $\pi\epsilon\acute{o}\varsigma$ mentula: $\delta\ \nu\epsilon\alpha$, id est,
cauda & penis: $\sigma\acute{\alpha}\nu\upsilon\iota\upsilon\mu$, hasta:
item $\kappa\omega\lambda\alpha$, & $\alpha\ \nu\alpha\gamma\mu\alpha\ \iota\omicron\upsilon$, id
est, ad generis propagationē ne
cessarium: item $\iota\omega\lambda\alpha$, Lat: uerpa,
ab inuicendo, Vnde Iudei dicti
sunt uerpi id est, recutiiti: $\sigma\epsilon\mu\mu\alpha$,
quod præputio tanq̃ corona inte
gatur: uocatur & $\kappa\epsilon\iota\theta\eta$, Lat: mur
to: itē $\nu\epsilon\alpha\ \pi\epsilon\acute{o}\varsigma$ & $\tau\acute{\upsilon}\lambda\omicron\varsigma$: Lat:
penis pendendo, cauda salax, et
à quibusdam inguen, item obscē
no uocabulo Priapus. Huius au
tem quedam

Partes toti membro com
munes sunt, utpote

Linea à præputio ad sedem, futura modo
protuberans, quæ Gr: $\epsilon\ \alpha\ \Phi\alpha$ futura uoca
tur, à Ruffo $\delta\epsilon\phi\phi\omicron\upsilon$ et $\tau\epsilon\phi\alpha\upsilon\varsigma$: ab alijs $\delta\epsilon\phi$
 $\phi\omicron\tau\upsilon\upsilon\iota\omicron\upsilon$ dicitur.
Tota exporrecta extuberansq; penis pars,
facta à canali Vrinario ad anum usq; Gr:
 $\tau\omega\upsilon\phi\omicron\varsigma$, Lat: taurus dicitur.

Vna non pendula, uentri proxima & uentri quasi infu
sa, $\nu\epsilon\alpha\ \tau\omicron\delta\delta\epsilon\upsilon$ dicitur.

Summa carnosâ pars, Græ: $\beta\acute{\alpha}\lambda\alpha\tau\omicron\varsigma$, Lat:
glans, & caput penis nominatur.

Cuticularis excrescentia glandem tegens
apud Aristotelem nomine caret: à Polluce
 $\tau\omicron\delta\delta\epsilon\upsilon$: in sacris literis $\alpha\ \nu\epsilon\phi\omicron\varsigma\ \iota\alpha$ di
citur: Lat: præputium à putando. Arist:
uidetur glandem et præputium $\alpha\ \nu\epsilon\phi\omicron\varsigma$
 $\sigma\iota\alpha\upsilon$ uocasse.

Præputij pars prominentior Græ: $\alpha\ \nu\epsilon\phi\omicron\varsigma$
 $\tau\omicron\delta\delta\epsilon\upsilon$ & $\alpha\ \nu\epsilon\phi\omicron\varsigma\ \tau\omicron\delta\delta\epsilon\upsilon$ dicitur.

Cauernula, per quam semen & lotiū pro
funditur, & $\epsilon\ \phi\alpha\delta\epsilon\alpha$, uulgo uretra uocatur.

Fibula, qua reuinciri solet membrum, uel
qua præputium alligatur glandi, & quod
in primo coitu plerunq; rumpitur, Græ:
 $\sigma\iota\upsilon\varsigma$, $\nu\acute{\iota}\omicron\upsilon$ Lat: canis, & $\nu\upsilon\upsilon\delta\epsilon\phi\omicron\varsigma\ \iota\alpha$
caninum uinculum uocatur: à quibusdam
 $\chi\epsilon\lambda\alpha\upsilon\delta\varsigma$, Lat: frenum, quod effrenato
rum iuuenem in coitu impetum refrenet,
dicitur.

Circulus glandem Coronæ modo cingens,
ubi præputium glandi annectitur, Græ:
 $\sigma\epsilon\phi\epsilon\alpha\upsilon\eta$, Lat: corona dicitur.

Partes in
ter se di
stinctæ, qua
rum

Cutem propendulam siue
alutam, quæ tanq̃ burfa
uel sacculus testes inclu
dit, Græ: $\delta\epsilon\chi\epsilon\omicron\upsilon$, item
 $\delta\epsilon\chi\epsilon\alpha$ & $\delta\epsilon\chi\epsilon\delta\varsigma$ seu $\delta\epsilon\chi\epsilon$
 $\iota\omicron\upsilon$, Lat: scrotū siue scro
tum & $\beta\acute{\upsilon}\rho\omicron\alpha$, id est, co
riū uocatur: huius autem.

Pars laxior seu
flaccidior Gr: $\lambda\alpha\varsigma$
 $\kappa\acute{o}\ \pi\epsilon\delta\omicron\upsilon$, unde As
thenesibus $\lambda\alpha\kappa\omicron\varsigma$
 $\pi\epsilon\delta\omicron\varsigma$ dicebatur,
cui scrotū semper
laxum et quasi fluidum est: eadē
ab alijs $\kappa\omicron\lambda\epsilon\delta\varsigma$ & $\kappa\omicron\upsilon\lambda\epsilon\delta\varsigma$, id
est, magna, alijs $\alpha\chi\chi\alpha\ \delta\alpha\phi\omicron\upsilon$
dicitur.

Alia pars nullum peculiare no
men consequitur.

Altera pen
dula $\sigma\acute{\iota}\mu\mu\alpha$
dicta, cuius

X. Pubi uel aqualicus
lo annexa, quæ gene
rationi inferuunt, &
generali uocabulo
Græ: $\alpha\ \iota\delta\omicron\iota\alpha$, Lat: pu
denda et uerenda uo
cantur: à quibusdam
inguina: à Suetonio
ueretra à quibusdam
 $\mu\acute{\iota}\delta\epsilon\alpha$. Sunt autem
duplicita, quorum alia
sunt

Muliebria, quæ omnia uno uocabulo
 $\mu\acute{\upsilon}\lambda\epsilon\beta\epsilon\iota\alpha$, id est, naturæ, & uocabulo
obsceno cummi comprehenduntur, uocan
turq; muliebria, in quibus considerata
ueniunt

Pubes & pars pilosa, quæ $\tau\epsilon\iota\chi\theta\omicron\iota\varsigma$, $\epsilon\ \pi\iota\sigma\epsilon\upsilon\upsilon$, & $\kappa\tau\epsilon\varsigma$ peccen dicitur.
Sinus, qui totus est ille meatus ab extremitate cummi ad matris orificium tendens,
Galeno & Sorano $\kappa\omicron\lambda\pi\varsigma\ \gamma\upsilon\upsilon\alpha\iota\kappa\epsilon\acute{o}\varsigma$, $\alpha\ \delta\omicron\iota\omicron\upsilon\ \gamma\upsilon\upsilon\alpha\iota\kappa\epsilon\acute{o}\upsilon$, nunq̃ autem ceruix,
nisi improprie: à nobis semineum uel muliebri pudendum, & locus à Celfo uo
catur.

Rima, Græ: $\chi\iota\varsigma\mu\alpha$, Lat: scissura uel fissura dicitur & cummus.

Carnose margines, utrinq; rimam, labiorum instar, ambientes, à Ruffo $\mu\upsilon\epsilon\phi\omicron\chi\epsilon\alpha$
 $\lambda\alpha$, $\mu\upsilon\epsilon\phi\omicron\chi\epsilon\lambda\iota\delta\epsilon\varsigma$, $\epsilon\upsilon\epsilon\phi\omicron\phi\omicron\varsigma$ $\kappa\epsilon\iota\alpha$ $\kappa\epsilon\mu\mu\upsilon\iota$, id est, rupes dicuntur: ab alijs
 $\pi\epsilon\phi\upsilon\gamma\omega\mu\alpha\tau\alpha$, id est, ale & labra uocantur.

Caruncule alares sub labris & alis occultatæ, Græ: $\nu\acute{\iota}\mu\phi\alpha\iota$, $\mu\acute{\iota}\gamma\epsilon\tau\alpha$, $\epsilon\ \pi\iota\delta\epsilon\gamma\iota\varsigma$
 $\mu\acute{\iota}\delta\epsilon\varsigma$, Lat: nymphæ dicuntur.

Membrana sub nymphis anuli modo perforata Græ: $\upsilon\mu\epsilon\mu$, Lat: hymen & uirgi
nale claustrum dicta est: hanc Aegyptij ante coitum uirginibus excindere sole
bant.

Virga muliebris, à pie memorie præceptore meo Fallopio ex antiquorum Ara
bum scriptis eruta, uirorum peni similis, sed multo minor, & magis occultata, à
Sorano & Ruffo $\kappa\lambda\alpha\delta\epsilon\iota\varsigma$, ab Arab: albathar, ab albucafi tentigo dicitur: ha
bet suam glandem & præputium uirili proportionē respondens: lingua samior:
 $\nu\upsilon\mu\phi\alpha$.

Foramen urinae emissioni destinatum, ut in uiro Græ: $\delta\epsilon\phi\tau\epsilon\alpha$, uulgo uretra
uocatur.

PARTIVM TABVLAE.

De lumbis,

Superiorem, costis extremis terminatam, ubi venes sunt & ofis ilij spina. Hec pars vocatur $\phi\acute{o}\alpha$, id est, pulpa, $\alpha\pi\epsilon\tau\epsilon\phi\acute{\alpha}\nu\sigma\alpha\iota$ uel $\phi\acute{o}\sigma\alpha\iota$ a palpando: Nam illa pars est musculosa & carnosa. Dicitur & $\delta\omicron\phi\upsilon\varsigma$, id est, lumbus, quia ei subsunt renes, renum loculi, & uulpes. Lumborum autem

Superior pars dicitur $\mu\epsilon\tau\alpha\phi\epsilon\upsilon\omicron\upsilon\mu\epsilon\tau\alpha$.

Musculosa pars, cuius

Extrinsicus $\nu\epsilon\phi\epsilon\omicron\sigma\mu\epsilon\tau\epsilon\alpha$.
Intrinsicus, $\alpha\lambda\acute{\omega}\pi\epsilon\alpha$ ues dicitur.

Caro oblique iuxta lumbos extans $\phi\acute{o}\alpha$ et $\phi\acute{o}\iota\alpha$.

Partes laterales, quae sunt prominentiae seu protuberantiae globosae, ofisium illorum dorsa occupantes, atq; ad clunium fissuras terminantur. Hae Graecae: $\gamma\lambda\omicron\upsilon\tau\omicron\iota\varsigma$ $\kappa\lambda\acute{\iota}\nu\epsilon\varsigma$ dicuntur, Lat: clunes in masculino & foemino genere: Veteres Graeci uocarunt $\kappa\lambda\acute{\omega}\nu\alpha\varsigma$, unde latinum nomen quidam deducunt: nominantur & nates, quod in sedendo ijs innituntur, & a sedendo $\phi\epsilon\delta\epsilon\gamma\alpha\upsilon\alpha$ dictae sunt. Dicuntur ab Aristotele $\iota\chi\iota\alpha$.

Carnosae eminentiae iuxta anum, ad femora tendentes, quae dictae sunt $\pi\epsilon\sigma\chi\acute{\omega}\nu\alpha\iota$, $\upsilon\pi\gamma\lambda\omicron\upsilon\tau\omicron\iota\delta\epsilon\varsigma$, id est, subnates, & $\pi\upsilon\gamma\alpha\iota$ etiam.

Partes infra genitales partes intra coxas & femora, ubi coxendix cum femore coniungitur, quae $\nu\omicron\chi\acute{\omega}\nu\alpha\iota$ dicuntur, quae etiam uoce totus locus sedis appellatur.

Inferiorem, quam clunium regio nobis circumscribit. Hae continet

ϕ . Posteriores partes, quae ab extremis costis, ubi cingitur, incipit, atq; s. ueritebris omnium crassissimis maxime compacta inter dorsum & os sacrum sita est. Hae sine discrimine $\delta\iota\chi\iota\sigma\mu\alpha$, id est, cinctus & $\delta\omicron\phi\upsilon\varsigma$, id est, lumbus appellatur. Latini lumborum nomen ei ascribunt. Pollux uocat totos lumbos $\phi\acute{o}\alpha$ & $\phi\acute{o}\iota\alpha$. Diuiditur autem in partem

Tota & integra, $\alpha\iota\omicron\mu\alpha$ Lat: fissura natium dicitur.

Partem mediam inter clunes, ubi ofis sacri et coxigis posteriores processus ueluti excarnes sunt, quae a quibusdam $\pi\upsilon\gamma\alpha$ dicitur: huius autem pars

Angusta et ultima, quae spondylii finis est in podice emittens, ubi recti intestini orificium existit: $\alpha\delta\delta\omicron\sigma\tau\upsilon\gamma\lambda\omicron\upsilon\varsigma$, id est, finis caudae, idq; proprie in aubus, uocatur. Hae comprehendit

Recti intestini ultimū, quod Graecae: $\epsilon\sigma\phi\alpha$, $\pi\upsilon\gamma\eta$, Lat: sedes, anus & podex uocatur. Hippo: $\kappa\acute{\upsilon}\gamma\omicron\upsilon\varsigma$.

Ipsū foramen, quod Graecae: $\delta\alpha\kappa\tau\acute{\upsilon}\lambda\omicron\varsigma$, id est, anulus, $\pi\epsilon\sigma\chi\alpha\kappa\tau\omicron\varsigma$, $\kappa\acute{\omega}\lambda\omicron\varsigma$ dicitur, Lat: Soco & locus.

Rugae ani & fissurae Graecae: $\epsilon\gamma\gamma\alpha\delta\epsilon\varsigma$, id est, fissurae.

Cauda, quae a lateribus inter lumbos & clunes utrinque proiectus quidam carniū sunt umbilico opposita, $\gamma\lambda\omicron\upsilon\tau\omicron\iota\varsigma$, id est, clunibus, infra sitis, apposita. Hae Graecae: $\kappa\upsilon\beta\omicron\upsilon\varsigma$, item $\iota\chi\iota\alpha$ & $\sigma\kappa\acute{\alpha}\phi\iota\alpha$, Lat: illa, nimirum latera, quae respiratione consueuntur, dixerunt.

Vicina sedi excarnis, inter scrotum, anum & femora

Tota à Ruffo $\pi\epsilon\pi\iota\upsilon\alpha\iota\omicron\varsigma$: ab alijs $\pi\epsilon\pi\iota\upsilon\alpha\iota\omicron\varsigma$ & $\omega\pi\epsilon\pi\iota\upsilon\alpha\iota\omicron\varsigma$ seu $\pi\epsilon\pi\iota\upsilon\alpha\iota\omicron\varsigma$, Lat: perianth, quod à principio genitalis ad anum usq; pertinet, quae ceruix uestica collocata est: à Polluce $\delta\epsilon\phi\epsilon\omicron\varsigma$ et $\tau\epsilon\phi\epsilon\mu\iota\varsigma$.

Partes circumpositae $\alpha\mu\phi\iota\sigma\tau\epsilon\lambda\epsilon\varsigma$.

EXTERNARVM HVMANI CORPORIS

De artubus & primo de manu.

Manus est, & χεῖρ dicitur, ac sumitur propriè pro apprehensionis instrumento, & impropriè pro illa parte, quæ ab humero ad extremam digitorum aciem producta est: continet uerò tres partes, quarum

Prima & superior ab humero ad cubitum, uel ad proximum articulum, ob breuitatem βραχίον, Lat: brachium, à Celfo humerus: à nonnullis etiam ὀλένη & ὀλῆν, Lat: lacertus dicitur: huius autem

Caput dicitur ὀλέκρανον.

Extremitas δὲ κεραιόνη.

Tota à fine humeri ad extremam manus principium πῦχος ὀλένη, & ab Atticis ὀλέκρανον, Lat: Vlna propriè: à Cicerone etiam lacertus: item cubitus uocatur.

Pars tenuior iuxta brachiale ἀπὸ τοῦ ἵψους καὶ ἀπὸ τοῦ ἵψους, Ab Hippoc: in offic: Medic: ut & omnes corporis partes, quæ in extremitate extenuantur, ἀντολῆνιον.

Secunda pars siue media, cuius

Articuli angulus, cui flexo brachio innititur, Græ: ὀγκῶν: à Polluce autem κύβωλον, & ab Hipp: κύβηδ' dicitur, Lat: cubitus: uocatur, & ab Hippocrat: ὀλέκρανον. Hinc Ancus Martius uocatus fuit, quia flexo fuit brachio. Ab Hipp: item commissura huius, quod extrahit eminet, ὀγκῶν nominatur.

Lacertorum superior pars propriè ὀλέκρανον, id est, lacertorum caput.

Interiores tori, id est, interior musculosa pars, παρὸς ὀλένιον:

Artus, qui duo sunt. Ex his enim alter

Tertia & infima à cubiti extremo incipit, & ad summam digitorum aciem terminatur. Hæc proprium apprehensionis instrumentum est, Græcè ἀντολῆν, Lat: manus extrema uocata est: hæc cum clausa est, πύγμα, id est, pugna dicitur, Vnde ad uerbum πύξ apud poetæ est: cum uerò compressa est digitis complicatis, ita, ut articuli, præcipuè medij digiti extent, condylus uocatur, unde condylo ferire dicitur. Eius item Extremus ὀπιοδένειος, uel potius ὀπιοδένειος, id est, πρυμνὴ χεῖρ, prona manus dicitur: intrinsecus uerò ἀνὸς ὀπιοδένειος est secundum Aristotelem, cum scilicet manus ὀπιοδένειος, id est, supina est. Huius autem 3. partes sunt, quarum

Prima, cubiti flexioni propinquo, Græ: & Lat: ἡστέρος: Dicitur etiam brachiale, roseta uulgò, quia eam partem rosæ ac diuersis floribus exornare solebant: dicitur & νεκρίς.

Internam Latitudinem, quæ manum cauam reddit quæ cū

Exporrecta est, de vax, Lat: palma dicitur: dicitur et à quibusdam παλάμη. Curuata & concaua facta, Græ: ὀπιοδένειος, id est, manus dicitur.

Palma plures partes uide sequente tabula, signo litteræ A.

Secunda à carpo ad digitos, Græ: μετὰ τὸν ἵψον, Lat: inferior carpus, post brachiale: à Ruffo τὰς ὀστέων, id est, πελῆς, à peloris forma, dicitur, diuiditur in

Externam siue extimam, quæ est auersa manus, uocatur ὀπιοδένειος: uocatur & νεκρίς, pellem à pelliculis forma: & ὀπιοδένειος, et ὀπιοδένειος, id est, palmus: huius

Pars iuncturæ carpi proxima ὀπιοδένειος, id est, finis.

Pars ad digitos uergens τὰς ὀστέων καὶ νεκρός, quasi manus robur & fiscina

Pes est, de quo uide tabulam signo C. notatam.

PARTIVM TABVLAE.

De palma manus.

13

Vbi palma initium est, ἀνδρῶν uocatur, quasi quiddam exaggeratum, ut in ripis & sulcis uidere licet: & quibusdam εἴς χερός, id est, radix manus.

Spacium inter pollicem & indicem à Galeno ἐνυχοῖα ἢ ἡγοῦ τὸν λιχάνου dicitur.

Spacium inter pollicem & medium digitum πλῆξ uocatur.

Intra θέναρ, ὑπεθέναρ καὶ σῆθος, medius quasi lacus, cauum in manu dicitur: A Chiromant: μετὰ σῆθου, quasi interstitium montium.

Prior pars, qua aliquid prehendi solet, ab Hippo: & Homero θέναρ uocatur.

Pollici substrata, θέναρ, à Ruffo σῆθος, Lat: pectus uocatur: quibusdam etiam mons pollicis: item mons Veneris dicta est.

Prominentiores & carnosiores partes, qua manus pulsam constituunt, & quasi toros efformant, ab Hipp: θέναρ, ἀπὸ τῶν θέναρ, id est, à percutiendo uocantur. Nam quicquid percutimus, illis partibus manus ferimus: à Chiromant: quòd quasi tubercula quaedam sunt, montes dicuntur. At pulpa

A Palma plures partes sunt: uidelicet

4. alijs digitis subiecta, uno uocabulo ὑπεθέναρ's comprehenditur: sed speciatim

Indici substrata, mons Iouis uocatur.

Medio adherens, Saturno dedicatur.

Anulari opposita, Solis est.

Minimo subiecta, Mercurium habet.

A linea mensali sursum uersus carpum tendens, mons Lineae dicitur.

Linea recurua, qua sub radice indicis, qui locus μετὰ τὸ θέναρ, id est, post planiciem manus dicitur, orta, desinit in μετὰ σῆθου, & uocatur χρομῖα, id est, temporum linea, constituit cum uitifera triangulum, unde etiam spacia illud τετράγωνον appellatur.

Lineae seu incisurae, Gra: ὑπομῆται & βῆμαι uocantur, quarum

Linea ab hac initio plerumq; coniuncta, descendens per mediam et cauum manum, quae in manus separat, χρονοφόρος, id est, uitifera nuncupatur.

Linea supra uitiferam monticulis subiecta ἀναγμαῖα, Lat: media naturalis, item Mensalis, Toralis, cauda draconis dicitur, describens cum uitifera quadratum: Unde locus ille τετράγωνον appellatur.

EXTERNARVM HVMANI CORPORIS

De manus digitis.

B. 3. Manus pars, complectitur digitos, qui Græ: δάκτυλοι dicuntur: quia ues rō singuli terna continent ossa, sibi mutuo colligata, et ordine sibi succedentia, ueluti in acie, Φάλαγγες dicuntur: Ἀλίσ: à turma equitum σκευαλίδες. Diuersa autem nomina consequuntur. Aristoteles enim inquit, eos, ubi contrahuntur, νενδύλους: ubi directi sunt, Φάλαγγας uocari. Digitorum porro considerantur uel

Singuli, qui sua nomina habent: nam

Primus, Græ: ἀντίχειρ dicitur, quod reliquæ manus uicem præstet: unus enim instat omnium est: item διφύλλος, quod duos saltem articulos habeat: item μέγας, Lat: pollex, quod robore ac magnitudine polleat.

Secundus Græ: λιχάνος à λίαν καὶ χέειν, quod multum debiscat: item τεχνόφύλλος, ut alij omnes: et δακτύλος, Lat: index, quod eo indicamus, exprobamus & mimamur.

Tertius μέσος, id est, medius: uocatur & impudicus & uerpus, quia hoc digito extenso homines deridere uel infamia notare solebant: dicitur & infamis, à quibusdam λιχάνος à lingendo.

Quartus medio proximus παραμέσος καὶ ἰατρικός, Lat: annularis, quia illo digito anulos ferunt: uocatur & Medicus Latine.

Quintus Græ: μικρός, id est, minimus, & ὠτίτις, id est, auricularis.

Internodia siue articulationes σκευαλίδες καὶ νενδύλοι à quibusdam uocantur.

Internam, cuius

Partes extremæ, ubi pulpæ teretes digitos terminant, Græ: ῥάγες, νορυφοί Lat: unguetices, acimi & cacumina uocantur.

Particule, quas distinguimus in partem

Proluberantias iuxta commissuras articulosum, que Græ: κόνδυλοι, Lat: nodi nominantur: horum autem

Primi προκόνδυλοι
Medij κόνδυλοι
Postremi μετὰ κόνδυλοι

dicuntur.

Externam, que continet.

Principium ἐκρονοχία, id est, radix unguium: horum enim margines, uno de procedunt, ἐκρονοχες dicuntur.

Ungues, qui Græ: ὄνυχες. Unguium autem

Pars, alba lunula candicans, circa unguium radicem, ἀνοτόλις, id est, ortus

Extremitas unguium ἀκρονοχία.

Pellicula radici annata ἀργεμώνη à quibusdam Macula alba, men dacia.

Loca abscondita sub unguibus νεφὰ καὶ uocantur.

PARTIVM TABVLAE.

De Pede.

15

Primâ & superior illa est, quæ à coxendice incipit, & ad genu finitur, Græ: μηρός Lat: femur, & femur improprie: Quidam coxam uocant: Huius autem

Partes interiores & posteriores, quæ carnosæ et pulposæ sunt, ac se in alterius mutuo contingunt, μεθμικτα, πλγιδες & πλγιδες ab Hipp: uocantur, Lat: femina & interfemina.

Antiores atq; externæ, Græ: παραμικτα, Lat: femora appellantur.

Magni rotatoris protuberantia, & osis articulatio, ῥαξομ, Lat: coxendix siue coxa uocatur.

Pulposa articulationis femoris & tibia pars

Posterior, in quam genu inflectimus, ἰγνύα καὶ ἰγνύς, Lat: poples: item καμπτὰ suffrago, & ἀγκύλη: Homero κώλυε: δὲ καλὰς etiam ad uerbum est, quo flexus genuum significatur.

Anterior protuberans, γόνυ Lat: genu.

Patella, qua genu tegitur, ἐπιγονάτις uocatur.

Pars musculosa, paulo supra genu eminens, ἐπιγονυῖς, quasi geniculum diceres.

Anterior pars excarnis & ossæ, cute sola obdusa, ἀντιπυνίμοις à quibusdam, quod admodum acuta est, ἀνθηθα: Gaza transfert ocream, Celsus tibiam: quibusdam Græ: κρεα.

Posterior pars musculosa siue pulposa, siue pulpa uentricosa, γαστροκνήμιον & γαστροκνήμια, Lat: Sura dicitur: Prisci Latini uocant cream, unde ocrea.

Exterior tibiae pars à Polluce παρακνήμιον.

Interior περονίμιον.

Gibba protuberantia, utrinq; ad pedes excarnes, τὰ σφυρὰ καὶ πέλαι, Lat: malleoli: improprie tali dicuntur: ab Hipp: dicuntur aliquando malleoli perones.

Prima articulationi uicina, ex 7. constans osibus, πείδιον Græ: & Lat: ab Hipp: ἰμβος πείδος uocatur. Huius autem

Postrema pedis pars, Græ: ἡέρινα, Lat: calx: unde ἡέρινον, idem quod λακκα πέλαι, id est, calce ferire seu calcem impingere.
Infima pars, qua terram calcamus, σφυρὰ καὶ πέλαι, Lat: calcaneum.
Isthmus, post os calcis, ceruix pedis dicitur Internum latus concauum.
Cauitas in illa angustia sita, Gr: κοίλον, Lat: fons dicitur.

Tertia, quæ uocatur πείδος ἄκρος, id est, pes extremus, est tota illa pars, qua incedimus: Diuiditur uero in tres partes quarum

Secunda latior pedis pars, ex 5. osibus constans & metacarpo in manu respondens, proprie μετὰ πείδιον: à quibusdam τείδιον ἢ πείδιον, à nonnullis etiam πάλμιν appellatur, Græ: & Lat: τάρσος proprie. Tarsi autem

Pars inferior ac carnosæ, siue ima, planta pedis, Gr: πέλμα, τύλωμα: ab Hipp: τείλα, Lat: planta, uestigium, & à Plauto solum pedis dicitur.
Pulposa pars, inslar pectoris, eminens iuxta digitos, ἰμβος καὶ περὸς ἰμβος nominatur.
Superior pars tota, quæ ante digitos extat, neruis osibusq; constans, ἰμβος, Lat: pedus dicitur: à quibusdam περὸς ἰμβος, à crebris osibus, quibus constat, & tarsus.
Plantæ Callus seu callum, Græ: ἀρεμὰ πείδιον, quod Cicero callum solorum interpretatur.

Tertia digitis circumscribitur, qui manuum digitis quasi respondent.

Finis Tabularum Externarum partium. Sequuntur Internarum.

De cerebro.

Cutem periosij modo externam cranei partem immediatè ambientem, quæ ob id περιγῶντος dicitur, Latine pericranium.

Altera exterior & crassior existit, & instar pericranij externi internam calvariae sedem integrit uocaturq; à densitate πᾶσις μύρις: à duritie οὐλῆς μύρις: à crassitie, qua cuti quosquo modo similis est, à Galeno 9. de anatom: administrat. δερμὶς τῶν δ' αὖ μύρις, id est, cuticularis membrana: ab Arabibus & à vulgo dura mater. In hac membrana sunt

Membras cerebri intus sub craneo inuoluentes, Græcè & Latine Meninges, ab Arabibus, quod fideliter cerebrum à rebus noxijs custodiāt, matres, à Macrobio omenta dictas. Hæ autē membranae duæ sunt, quarum

Altera tenuis, immediatè obducens cerebrum, et passim in cerebri reuolutiones quàm profundissimas sese implicans, Χοροειδὴς dicitur, eò quod cerebri uasa, non aliter sustineat, quàm Χοροειδὴς uasa ad fœtum pertinentia complectitur. Ruffus non uocat totam membranam ita, sed tunicam obuolentē interius uentriculos. At Herophilus totam membranam uocat Χοροειδὴς, id est, secundinam. Ob tenuitatem dicitur λεπτὴ μύρις, Lat: tenuis membrana, & pia mater.

In internarū partium distinctione ac descriptione sequemur ordinem in tabulis nostris de externis partibus præscriptū: Musculos, uenas, arterias & nervos ad proprias & peculiares tabulas reijciemus. Primum autem de capite agemus in quo considerabimus

Cerebrum & eas, quæ ad cerebrum pertinent. In cerebro intuebitur

Cerebri ipsum, quod cum in capite collocatum sit, ἐγκεφαλός, Latinis cerebrum uocatur, & à quibusdam μὲν ἑγκεφαλίτις, id est, medulla cerebri, quod (ut Plato inquit) medullæ quædam species sit. Ab alijs uocatur μὲν ἑγκεφαλός, id est, ἐγκεφαλόν. Diuiditur autem à

Partes cerebro uel capiti annexas, de quibus quære literam C.

Nonnullis in partem

A Ruffo in

Anterorem, quæ propriè cerebrum nominatur.

Posteriore, quæ πᾶσις μύρις dicitur, quia in posteriori regione collocata est. Latine cerebellum, tanquam paruulum cerebrum

Superiorem, de qua in sequenti pagina, signata litera A.

Inferiorem, de qua uide literam B.

Processus duo, quorum

Alter positus est inter dextram & sinistram cerebri partem, & ob similitudinem, quam cum falce habet, falx messoria dicitur.

Alter cerebri partem, quæ cerebello incumbit, sustinet, atq; inter cerebrū atq; cerebellū collocata est, proprio nomine carens.

Duo nimirum dexter et sinister, utriusq; à foramine 6. paris nervorum incipiunt, & os occipitis attēsi à lateribus ascendunt, atq; in unum sinum concurrunt, ubi elatissima cerebelli pars os occipitis contingit. Hic concursus ab Herophilo λῆγος, id est, torcular uocatur, eò quod in illis coeuntes meningis duplicationes sanguinem quasi in cisternam deducunt, atq; inde uelut ab arce quadam omnibus subiectis partibus riuos mittunt, alios in totum cerebrum, alios uerò in partem anteriorem tanquam uinum è torculari promentes. Vocatur & λῆγος, à recentioribus lacuna, puteus, fouea, sanguinis conductus.

Tertius sinus ex hoc torculari oriatur, & sub sagittali sutura & osis frontis medio ad osseum septum, quo cribiforme os separatur, protenditur, nomine proprio carens.

Quartus breuissimus omnium ex eodem torculari prodiens, ac semper pimentum cerebri & cerebelli transforans, ad testes cerebri pertingit, & proprio uocabulo caret.

Præter hos 4. sinus, sunt & alij à recentioribus, ut Folio, inuenti.

INTERNARVM HVMANI CORPORIS

Singula spirituum animalium receptacula, siue singulas cauernas, quæ νοητικά, id est, uentres, uentriculi, sinus & amplitudines uocantur. Hi autem sunt ex 4. uentriculis cerebri primi duo.

Dextram & Sinistram, quæ falce messoria et proprio diaphragmate à se mutuo separata, singula continent

Singulos contextus uenarum artieriarumq; in uentriculis constitutos, atq; beneficio tenuis membranæ implicitos, qui uocantur χοροειδής, Lat: plexus χοροειδής.

A. Superiorem uel summam partem, quæ à forma κροτοειδής, id est, uaricosa dicitur. Hæc rursus diuiditur in tres partes, utpote in

Mediam, quæ continet substantiam quandam uentriculorum substantia candidiorē & duriorē, utriq; cerebri parti communem, quæ ob duriciem τυλλώδης σώμα, id est, callosum corpus, ob figuræ rotunditatem σφαίρειον, id est, sphaericum, id est, fornix & testudo dicitur. In hoc testudinali corpore considerabimus duo

Primò substantiam quandam cerebri tenuem & quasi membraneam, dextram à sinistra separantem, quæ ab officio διαφραγματος sepius, à nonnullis ob tenuitatem & perluciditatem, lapis specularis dicitur.

Primò substantiam cerebri peluis modo formatam, quæ propterea Gr: πνευλος, id est, peluis uocatur, ab alijs χοοειδής, id est, infundibulum.

Alter ex humiliori sede antrum tendit, ubi si antrum sum Pogrediaris inuenies

Secundò post peluim inuenies glandulam quadratam in sella ossis cunei collocatam, quæ pituitam tertij uentriculi per peluim transmissam excipit, ideòq; ab officio glandulae pituitam excipiens uocatur.

Tertiò à lateribus selle, et sub glandula, in alijs minor, in alijs maior reperitur plexus, qui πλέγμα δυνάτωειδής, rete mirabile, & à Vesalio plexus reticularis dicitur.

Secundò sub hoc corpore calloso humiliores uentriculorum duorum primorum sedes in communem sinum duobus prioribus minorem concurrunt, qui tertius cerebri uentriculus dicitur. Hic tertius uentriculus ex sese producit duos meatus, quorum

Due primæ laterales sunt, & constituunt à dextro & sinistro latere duos globos, inuicem appositos.

B. Inferiorem à cerebri basi ortam quæ παρεγκεφαλῆς dicitur, quasi posterior cerebri, efformaturq; quatuor partibus, quarum

Due secundæ in medio sunt constitutæ et sunt cerebelli processus, quorum

Alter anterior est, et meatum tertij uentriculi ad quartum tendentem apertum retinet, à similitudine, quam cum ligni putrefacti a caseiue uermis habet οκρολινωειδής, id est, uermiformis processus dicitur.

Alter est non exiguus tertij uentriculi pars, eandem nalis retrorsum ad quartum uentriculum tendens: ubi

Conarium est collocatum, ibi sunt testes, Græ: δέχαιο & δίδυμοι, dicti perinde, quasi conarium penis sit: quæ uero parte conarium non est, nates nominantur.

Ingressus est meatus, à uentriculo 3. producti, in 4. uentriculum, ubi sita est glandula peni assimilata, diuersa substantia atq; cerebrum, quæ uenis & arterijs in cerebrum fufis pro firmamento est, & quia nucis pineæ seu turbinatæ figure modo efformata est, κωνοειδής & κωνοειδής uocatur.

Alter à posteriori parte reflectitur uersus quartum uentriculum, quem apertum conseruat, uocatur etiam οκρολινωειδής, id est, uermiformis processus, eo, quod, ut prior, ex multis constat particulis inuicem tenui membrana copulatis, ita ut uideantur uermis ritu produci & contrahi.

In ulteriori descensu est uentriculus 4. seu ultimus, cerebello & dorsali medulle communis, qui initio latius patens, deinde arcuans sese, calami scriptorij modo (ut Herophilus inquit) extremo suo in mucronem comprimitur.

PARTIVM TABVLAE.

De partibus cerebro annexis.

19

Spinalis medulla, quæ cerebelli processus est, & per ueribras defluit, uocatur; $\mu\epsilon\lambda\omicron\varsigma\ \epsilon\alpha\chi\iota\tau\upsilon\varsigma$, id est, dorsalis uel spinalis medulla, uocatur etiam à ueribris $\sigma\tau\omicron\nu\ \delta\upsilon\lambda\iota\omega\upsilon$, ab alijs $\nu\omicron\pi\alpha\iota\omicron\varsigma$, $\delta\iota\alpha\chi\epsilon\iota\nu\omicron\varsigma$ & $\delta\omicron\iota\tau\upsilon\varsigma$.

Velamenta dorsalis medulle, quæ uocantur ab Hippocrate $\epsilon\lambda\upsilon\tau\epsilon\alpha$: sunt autè hæc tria, quorum

Primum à dura matre est.

Secundum à pia matre.

Tertium à membrana ueribras complectente.

C. Partes cerebro, uel internis partibus annexæ, quæ à nobis hic considerantur, sunt

Humores tres, quorum

Primus in ordine est humor aqueus sub cornea immediatè collocatus, & uocatur $\upsilon\delta\alpha\tau\omega\delta\epsilon\varsigma\ \upsilon\gamma\gamma\omicron\upsilon$, id est, aqueus humor: item $\lambda\epsilon\pi\tau\epsilon\varsigma$ tenuis $\nu\epsilon\lambda\alpha\gamma\epsilon\delta\varsigma$ id est, purus, qualis in ouis reperitur, unde & iam $\omega\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$, id est, albugineus uocatur.

Secundus est $\nu\epsilon\upsilon\sigma\alpha\lambda\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$, id est, glacialis: uocatur ab Aëtio $\Phi\alpha\kappa\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$ & $\Phi\alpha\chi\omega\tau\omicron\upsilon$, id est, lenticularis, à similitudine, quam cum lente existimatur habere.

Tertius est $\upsilon\alpha\lambda\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$, id est, nitreus, eo quod consistentia suo uitro similis est.

Oculi qui separantur in

Prima uocatur $\epsilon\pi\iota\pi\epsilon\phi\upsilon\kappa\omega\varsigma$, id est, adnata, eo quod non sit propria oculi, sed quasi ascititia, colligans oculos uicinis partibus: adhaerens etiam uocatur, quod huius interuentu oculis adhaereat: item & alba à colore, à neotericis coniunctiua.

Secunda, quæ pars duræ anterior perlucida $\nu\epsilon\gamma\alpha\delta\epsilon\delta\epsilon\varsigma$, id est, cornularis, ob similitudinem, quam cum perlucido cornu lucernarum habet, uocata, item cornea, ut Ruffus inquit, quod cornu instar in laminas quas si dissolui potest.

Tertia $\sigma\kappa\lambda\eta\phi\omicron\tau\upsilon\varsigma$ dura dicta, & à substantia, qua prædita est, & à dura matre, unde originem trahere scribitur.

Quarta orta à pia matre dicta est $\epsilon\gamma\gamma\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$ & $\epsilon\gamma\gamma\alpha$ uinea, quod qua parte corniculari subijcitur, uinea folliculo, ex quo pedunculus cum acinis extractus est, similis sit: uel quia intus colore uinea nigra colorem præsentat: appellatur & $\chi\omicron\gamma\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$, id est, secundina, uel quia à pia matre $\chi\omicron\gamma\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$ uocata oritur, uel quia secundina uteri instar uasorum est sustentaculum post situm Crystallini humoris.

Quinta tunica à cerebri substantia oritur $\alpha\mu\phi\iota\beta\lambda\alpha\varsigma\tau\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$, id est, reticularis uocatur, à similitudine retis piscatorum, quod uni baculo accommodatur, et ex ampla basi globi dimidiati modo in obtusum mucronem fertur. Ruffus uocat hanc membranam $\upsilon\alpha\lambda\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$, id est, uitream, quod includat uitreum humorem, at non rectè, nam uitreus humor propriam habet tunicam. Ruffus hæc etiam uocat $\alpha\gamma\alpha\chi\omicron\gamma\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$: putat enim ni fallor, esse processum reticularis.

Tunicas, quæ

Apud plerosque Anatomes sunt numero septem, quarum

Apud Galenū in quibusdā locis quinq; alio in loco sex

Apud Fallopiū octo.

Sexta tunica est crystallini humoris semicircularis, crystallini dimidium ab anteriori tantum parte ambiens, uocatur $\alpha\gamma\alpha\chi\omicron\gamma\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$ à similitudine, quam tenuitate sua nequaquam duricie & robore, cum telis aranearum habet. Ruffus inquit, hanc nomine antiquitus caruisse, à posteris lenticularem uocatam, & ab humore contento crystallonem.

Septima & ultima est processus $\chi\omicron\gamma\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$ & interstitium inter aquæum & uitreum humorem, & uix tunice nomen meretur: Vnde Fallopius: hanc tunicam uocat ligamentum ciliare, tanquam crystallinum humorem alligaret $\chi\omicron\gamma\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$. Vesalius dignatur hanc tunicam tunice nomine, & uocat ciliarem tunicam à palpebrarum cilijs.

His septem tunicis Fallopius adijcit tunicam uitreo humori peculiarem & propriam, ex autoritate Ruffi, quæ propterea uocatur $\upsilon\alpha\lambda\omicron\epsilon\delta\epsilon\varsigma$, id est, nitrea.

Adijci potest tunica $\alpha\pi\epsilon\upsilon\epsilon\gamma\gamma\omicron\tau\omicron\varsigma$ musculorum, quæ à Galeno tunica oculorum uocatur.

Animaduertendum, Galenum aliosq; antiquos scriptores interdum omnes tunicas reducere ad quinq; interdum ad quatuor tantum. Cum ad quinq; reducit, omittit corneam & ciliare interstitium, cum ad quatuor et etiam adnatam tanquam impropriam excludit.

INTERNARVM HVMANI CORPORIS

De ore & partibus in ore.

Gingivæ & gingivula, quæ sunt caruncule dentibus circumpositæ, & Græcè ῥιζα uocantur. Harum autem

Dentes, de quibus in osium tabulis.

Palatum siue convexitas oris superior obducta cute nervosa, Græcè ῥαχὶς, ῥαχίς, id est, oris cælum, Ennio cæli palatum, item ὑπερώα, Lat: palatum, quod dentibus tanquam palis vallatum sit: item testudo & solum oris.

Lingua à lingendo, γλῶσσα & γλῶττις, γλῶττις, ab Euripide in Supplicibus ἄγγελος λόγος, id est, sermonis nuncia, ab alijs plectrum & glossa: Lingua uero

Exterior pars ῥιζα uocatur, & plurali numero ῥιζαί

Interior ἔνθα, & ἔνθα.

Connexio χαλινός, id est, frenum.

Radix seu intima pars, quæ imæ maxilla iuxta fauces annectitur, ὑπερώα, καὶ ἀλὶν & γένος à Polluce

Acuta seu extrema pars in ærem exiens πρυλωσίς.

Superior & asperior pars iuxta Palatum ἐπρυλωσίς.

Excavationes utrinque χαραμοὶ & παγίστρα.

Ligamentum, quo lingua oris basi annectitur, à quibusdam frenum.

Ligula, id est, membrana cartilaginosa, basi linguae annexa, inter transglutendum arteriam asperam occludens, uocatur ἐπρυλωσίς à laryngis rima, quæ γλῶττις dicitur: à quibusdam laryngis operculum: καὶ τρυγὰ ab Hippocrate. Hæc ligula iuxta fauces uocatur καὶ ἀλὶν, latine ligula: etiam græco nomine uocatur latine epiglottis.

Os dicitur στόμα, apud Comicos χείλος, λείπον à sermone et μάσθη, in ore considerabimus scia, quæ aperto ore uisui nostro occurrunt, scilicet

Vuula, quæ caruncula fungosa est, à palato iuxta narium meatus in os propendens Superiori parte latior, inferiori in modum pyramidis acuta, hominibus & auiibus cantantibus solummodo donata, uocatur, quando

Integra est, γαργαρέω, id est, gurgulio, à quibusdam βρόγχος & χείλος, item σαρκοφάγος, μόγιος & κίω ἐπὶ βλεφάρων & curculio, & ab ijs, qui falso opinantur modulationi uocis inferuire. πλάττω, id est, plectrum uocatur & infundibulum.

Male affecta

Superna sede tenuior est, & inferna crassior, inflatur de pendens à suo pedunculo, σαρκώδης, id est, uua siue vuula & ἰσθμός.

Teretem nasciscitur formam καὶ ὡς & κολοίς, id est, à columna columella.

Fauces, Græcè φάρυγξ & φάρυγγος. At animaduertendam, scriptores in faucium descriptione & distinctione ualde inter se discrepare atque ob multarum particularum in faucibus concursum mutuamque uicinitatem, particularum multarum nomina confundere: inter hos sunt nonnulli, qui

Generali uniuersaliq; definitione utentes, accipiunt pro pharynge regionem intra os, ubi tum gula tum asperæ arteriæ extrema concurrunt: uel, ut Pollux inquit, quod supra collum cauum est. Ruffus uocat fauces omnem capacitatem, quam inter deuorum dilatamus, idque probat autoritate Homerique, qui ita de Cyclope loquitur: φάρυγος δ' ἐξέσθ' ἔδωκεν ἑμὸν τ' ἀνθρώπου, id est, faucibus erupit unumque humanaq; membra. In hac capacitate reperiuntur narium foramina in os descendens, larynx, stomachi initium, linguae radix cum osse hyoide, faucium proprii musculi, & glandule. Vocatur hæc pars faux uulgato dicendi usu fauces. Faucium regio uocatur ἰσθμός ab angustia, quod nulla regio in toto corpore ita angusta sit, & totius terim organis donata.

Glandulæ duæ fungosæ cerebri humiditates in saluam conuertentes, quæ os & fauces rigant, iuxta isthmum collocatæ, dicte Græcè τριγύρῃ obpositum. Notandum, cum glandulæ hæc quouis modo præter naturam sunt affectæ, etiam à Paulo paristhymia uocari. Quidam nominant paristhymia inflammationem earum partium, quæ prope tonsillas sunt. Item ὑπὸ τῷ ἰσθμῷ, quod sibi inuicem oppositæ sunt. Significant & glandularum morbos. Celsus ὑπὸ τῷ ἰσθμῷ tonsillas, quæ post inflammationem induruerunt, à græcis uocari uult. Latine tonsillæ in homine, in sue (ut ait Plinius) glandulæ, Celsus in homine quoque uocauit glandulas: fauces: amygdalas.

Speciale et particularem sumit significationem, et distinguunt ex illis

Primo Grammatici secundum genus

Masculinum, & tum sumitur pro larynge, id est, asperæ arteriæ summo, uel pro ipsa asperæ arteria, Aristoteles uero 3. Ethicorum φάρυγγος in masculino genere sumit pro collo seu œsophago.

Fœmininum, & tum uocatur amplum illud spatium inter laryngem & gulam medium, quod, quale sit, non scio: ita enim sibi mutuo hæc duo annexa sunt, ut minimum spatij reperiatur inter laryngem & œsophagum.

Secundo Hippoc: Praxagoras & Galenus, qui sic uocant indistinctam laryngem seu asperæ arteriæ caput, et per sinechodochem asperam arteriam, idque tamen melius genere fœminino. Nam masculino etiam Euripide in Cyclope fauces significat.

Celsus ὑπὸ τῷ ἰσθμῷ tonsillas, quæ post inflammationem induruerunt, à græcis uocari uult. Latine tonsillæ in homine, in sue (ut ait Plinius) glandulæ, Celsus in homine quoque uocauit glandulas: fauces: amygdalas.

Asperam arteriam, quæ guttur dicitur, & ad cartilagineas spectat.

Absolutis cerebri eiq; annexarum partium tabulis, peruenimus ad collum, in quo considerabimus duo, utpote

Gulam, quæ uocatur Græcè $\delta\iota\phi\acute{\alpha}\gamma\gamma\omicron\varsigma$, quod cibum & potum ab ore in uentriculam ferat, quandæ ab Hippoc: Oesophagus uocetur uentriculi os. Item $\sigma\omicron\mu\alpha\chi\omicron\varsigma$: item $\lambda\epsilon\upsilon\kappa\omicron\upsilon\iota\alpha$: deniq; $\lambda\alpha\tau\mu\omicron\varsigma$ proprie: Latine proprie gula: à nonnullis faux, tanquam diceret fox, unde uox deducta uidetur: Vnde autem fauces in numero plurali. Gula tamen nomen ab alijs pro anteriore parte colli usurpatur. Caput autem gula uocatur ab Hesichio $\beta\omicron\delta\epsilon\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \beta\omicron\gamma\chi\omicron\varsigma$: Latine frumen, unde uerbum frui.

DE THORACE.

Pleura dicitur Græcè $\pi\lambda\epsilon\upsilon\tau\alpha$ $\eta\ \tau\omicron\iota\ \upsilon\mu\iota\upsilon\ \eta\ \chi\iota\tau\epsilon\upsilon$, ut Gal: inquit, uocatur & $\pi\lambda\epsilon\upsilon\tau\alpha$, id est, succingens membrana. Nam, ut peritonæum uentrem inferiorem, eaq; quæ in uentre continentur, amplectitur: Sic $\pi\lambda\epsilon\upsilon\tau\alpha$ thoracem suaq; contenta succingit. Latine proprie pleura, quod lateribus quàm firmissime adheret.

Ab hac pleura prodit processus, cor in medio undiq; retinens, & thoracis capacitatem diaphragmatis uice in duos uentres separans: Hic uocatur $\mu\epsilon\mu\beta\omicron\lambda\omicron\varsigma\ \delta\iota\alpha\phi\omicron\gamma\epsilon\eta\omicron\upsilon$, id est, intersepiens membrana, à Festo dissepimentum, communiter mediastinus.

Segmenta duo in homine, in cane & alijs brutis quàm plurimis 6. aut plures, quæ uocantur Græcè & Latine $\lambda\omicron\beta\omicron\iota$, lobi.

In thorace, cum multe & diuersæ sint partes uarijs usibus destinate, & utrosq; uocatur, quæ ad alias tabulas spectant: nos illas perstringemus, quæ uite & respirationi inserviunt. Harum aliæ sunt principales, ut cor et pulmo, aliæ his inserviientes, ut pleura & diaphragma. Hæc contenta, cum ijs, quæ in abdomine latitant, uocantur uiscera: item exta, quod in animalibus extant: etiam à quibusdam præcordia uocantur. Nos exordiemur à pleura, inde ad alia accessuri.

Pulmo, Græcè $\pi\upsilon\lambda\mu\omicron\upsilon$, à $\pi\upsilon\lambda\omicron\varsigma$, quod respirans, id est instrumentum, dicitur. In pulmone autem considerantur

Ab Aspera arteria, quæ ab ore exeat, aerem per uniuersum pulmonem deferunt, & rursus fuliginosa cordis excrementa expirando reddunt: horum uasorum cartilagineas Græcè & Latine bronchia uocantur.

Vasa per uniuersum pulmonem dispersa, quæ triplici genere uasorum, retis modo implexatorum, pulmonis carnem sustentant: Horum alia sunt

Ab arteria uenosa excipiente aerem eternum ab aspera arteria, & fuliginosa excrementa à corde. Quæ quidem ideo arteria dicitur, quod aeris ductui subministrat: uenosa autem, quod sua substantia uenis similis, quia æquè tenuem, atq; uena, tunicam habet.

A uena arteriosa, deferente proprium pulmonum nutrimentum ad pulmones. Hæc autem uocatur uena ab officio, ut apte quod sanguinem ex corde per pulmonem distribuat: arteriosa, à tunica rum substantia, quæ crassitie arterias adæquat.

Cor, à Græcis uocatur $\kappa\omicron\rho\delta$: uide in sequenti pagina.

INTERNARVM HVMANI CORPORIS De corde.

22

Cor vite fons, Græ: $\kappa\alpha\rho\delta\varsigma$, Lat: cor dicitur: Ad cordis his-
toriam tria perti-
nunt

Primò tunica crassa dura, à cordis basi nata, & cor undiq; cingens, theca siue arcula instar, atq; ab externis periculis munis-
ens, quam Græci $\pi\epsilon\pi\lambda\omicron\upsilon\varsigma$, Latini cordis capsulam siue inuolucrum cordis uocant: quidam etiam, sed malè, ualleculum.

Secundò uniuersalis distinctio
atq; descriptio, in qua consi-
deramus

Primò basim, quæ est latior & superior pars, uasorum origo, nobiliorq; cordis pars, uocaturq;
Græ: $\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\omicron$, caput & summa cordis pars, dicitur & radix.

Secundò Latera cordis, quæ in cordis dilatactione admodum expanduntur.

Tertio cordis acumen, quod conus dicitur, Græ: $\delta\epsilon\upsilon\ \kappa\epsilon\lambda\ \pi\upsilon\theta\upsilon\mu\omicron$ micro.

Substantiâ, quæ
duplex est, alia

Fibrosa, constata ex omnis generis fibris.

Carnosa, fibris circumfusa, quæ communi uocabulo cum reliquorum uiscerum carne $\pi\epsilon\pi\lambda\omicron\upsilon\varsigma$ uocatur.

Fouæ, in quibus sanguis diutius retinetur & concoquitur.

Carneæ quædam explantationes, processus teretes & gracio-
les, quæ in fibras membranaceas cessant, & ipsis sinibus continui
sunt.

A situ dexter, et, quia
pulmoni sanguinem
preparat, sanguineus
et $\phi\lambda\epsilon\beta\omicron\delta\omicron\varsigma$, id est,
uenosus dicitur. In
hoc autem uentriculo
ut in sequenti reperi-
untur

Sinus uel uentri-
culos duos, car-
nis cordis substan-
tia tanq; septo
quodâ à se mu-
tuo separatos &
distinctos, qui
Græ: $\kappa\omicron\lambda\iota$ uel, id
est, Ventriculi à
situ et officijs no-
mina consequen-
tes, dicuntur. Ho-
rum alter

Tertio parti-
cularis diuisio
in qua conside-
ramus

Septum transuersum, quod aîcludit
partes nutritorias à spiritualibus, &
propterea uocatur $\delta\iota\alpha\phi\epsilon\pi\omicron\gamma\mu\alpha$, Lat:
Septum transuersum. Veteres id soles
bant appellare $\tau\eta\upsilon\ \phi\epsilon\epsilon\upsilon\alpha$, quod eo
inflammatione affecto, mens lædatur
per consensum. Latini uocant præcor-
dia, quod cordi prætendatur.

Septum carneû
ex ipsa cordis
substantia pro-
ductû, quod dia-
phragma siue se-
ptum uocatur.

Sinister est, spirituum uitalium officina &
promptuarium, & arteriarum fons unde di-
citur $\kappa\omicron\lambda\iota\alpha\ \delta\epsilon\tau\eta\gamma\epsilon\iota\omega\delta\omicron\varsigma$: habet & foueas
& carneas explantationes, nec non & duo-
rum uasorum, ut dexter uentriculus, orificia,
quorum alterum est

Venam, cordi nutrimentum proprium suppeditantem, quæ coro-
næ modo cordis basim perreptat, & aliquando duplex est, uoca-
turq; $\sigma\epsilon\phi\alpha\upsilon\iota\alpha$.

Ramulos duos aorte arteriæ, qui coronæ modo cordis basim una
cum coronali uena amplectentes, cordi secundum longitudinem
exiles propaggines transfundunt. Hi à quibusdam etiam arteriæ
coronales uocata sunt.

Nerviulos, qui uno plures sunt, ut Fallopius annotauit.

Cauæ uenæ,
per quâ san-
guis ex epas-
te in cor tras-
mittitur. Hu-
ic orificio as-
signantur.

Duorum uasorû ori-
ficia, quorum alterum
est

Membrana cornu-
læ referens figurâ
orificio maioris uenæ
coronariæ ceu opus-
culum ultra medium
obducta. Hæc Eusta-
chius.

Valuule siue membra-
nosæ epiphyses tres,
sanguinis retrocessum
prohibentes. Hæ, ut uul-
gò loquimur, spectant
foras intus, & quia sub
eis sagittarum similes
sunt, Græ: $\tau\epsilon\pi\lambda\omicron\omega\chi\iota\omicron\varsigma$
ues, Lat: trisulcæ &
trienipides uocantur.

Auricula sita ad latas
huius orificij, ut probis-
beat, ne ualida attra-
ctione cordis uena eas
uaumpatur, & $\kappa\epsilon\phi\alpha$
 $\delta\iota\alpha\kappa\epsilon\lambda\ \upsilon\mu\epsilon\delta\iota\ \omega\tau\omicron\alpha$
ed'is.

Venæ arteriosæ, de qua in pulmonis las-
bulis dictum est. Hæc uena etiam conse-
quitur ualuulas tres, quæ ad differentia-
am priorum uulgò intus foras spectan-
tes dicuntur, et mediæ lunæ similes sunt.

Arteriæ uenosæ, quæ
aëri à pulmone in cor
transmittendo, & su-
ligimibus cordis red-
dendis destinata est.
Hoc orificium conti-
net

Valuulas duas
tantum. Nam
non ita exalte
ut alia orifi-
cia, ocludi de-
bent, quæ spec-
tiant foras in-
tus.

Auriculam ad
tutelam arte-
riæ uenosæ præ-
stetam.

Arteriæ aortæ siue magnæ, per quam
uitalis spiritus per uniuersum corpus
deferitur. Hæc arteria etiam, ut uena
arteriosa, tres consequitur ualuulas, in-
tus foras spectantes.

PARTIVM TABVLAE.
De partibus nutritorijs generales tabule.

22

Ex cibo chylum conficiunt, utpote precipue uentriculus, deinde intestina, quæ & leuem quandam chyli perficiendi facultatem obtinent.

Χολώες, id est, Chylificationi: harum alie

Chylum maiori ex parte confectum distribuunt, quæ facultas precipue intestinis attribuitur, quamuis hæc etiam pluribus muneribus destinata sint, nimirum concoctioni, & excrementorum tum exceptioni tum delationi.

Chylum ad epar ex intestinis attractum deferunt, nimirum uenæ mesaricæ.

Chyli superflua, feces uocata, deferunt et colligunt, ut sunt intestina, inter quæ gracilia distributioni, crassa superfluis recrementis excipiendis & euendis destinata sunt.

Nutritiōi destinata, quarū alie inferuiūt

Optimo nutrimento, quarum alie

Sanguinem faciunt, ut epar.

Sanguinem ad suam perfectionem perductum toti corpori transmittunt, ut uena cava cum suis ramis.

Χυμώες, id est, sanguificationi: harum quedam destinate sunt

Sanguinem purgant, quæ tria sunt, ut

Vesica bilis trahens bilim.

Lien humorem melancholicum exuens

Renes, qui serosum humorem ex sanguine eliciunt.

Sanguinis excrementis, quarum alie

Superflua sanguinis deducunt ad propria excrementorum receptacula, ut sunt

Vena portæ ad lienem.

Meatus biliosus ad uesiculam felleam.

Vetereles, urinam ex renibus ad uesicam deferentes.

Hisce omnibus nutritorijs partibus, alijs ad meliorem operationem perficiendam, alie ad conseruationem partium, ut sunt peritonæum, omentum, pancreas.

Recrementa sanguinis excipiunt, ut

Lien.

Vesica bilis.

Vesica urinaria.

Excretionem inferuiunt quorum quedam

Intempestiuam excretionem prohibent, ut

Vesica urinaria Sphincter.

Recti intestini Sphincter.

Tempestiuam incitant, ut musculi abdominis, precipue autem recti.

Partes in abdomine uel inferius uentre collocatae, seu ipsi annexæ, sunt duplices, nempe uel

Generatiōi inferuientes, de quibus paulo post, signo X.

DD

INTERNARVM HVMANI CORPORIS

De nutritorijs partibus tradituri auspicabimur ab ijs, quæ in Anatomica administratio-
ne oculis nostris primo sese offerunt.

Tunica siue membrana totum ventrem inferiorem continens, ac singulis in eo contentis partibus tunicam præbens uocatur Græcè *πρόσθωλον* & *πρόσθωλον*; item *πρόσθωλον* ὑμῶν & *χρῶν*, tunica. Galenus enim confundit significationem membrane & tunice. Latini mutuati sunt nomen huius membrane uel tunice, & etiam uocantur peritoneum. Arab. Siphac, Simphac, peritoneum, periteron, beritheron, & albirethron.

Pellicule in uentre contentæ, quæ interiora tegunt, uocantur genere masculino pluraliter panticæ à Plautò in Pseud. Martialis uocauit interiores uentris partes panticæ.

Pars membranosa & pinguis dupla, pluribus nervis arterijs uenisq; instar retis cuiusdam, intertexta, intestinis incumbens, uocatur Græcè *ἐπίπλοον*, eo quod uentriculo & intestinis incumbat, & quasi innatet: item *γαστρίον*, & *σπλῆν*, id est, rete & reticulum. Lat. omentum, quasi diceret opes vimentum, & reticulum à quibusdam: Arab. Zirbus.

Superius quod constituitur ex substantia uentriculi multo crassiori, quam reliqua uentriculi pars est, & appetitus proprium instrumentum perhibetur, uocaturq; ueteribus Græcis *ὠσφῆς*, quod affectus superioris orificij uentriculi, (ita enim uocatur latinè) similes sunt cordis affectibus.

Orificia duo, ut

Ut integer et minimè deffectus, in quo occurrunt

Fundus, in quo concoctio fit prima, hoc est, mutatio cibi in chylum.

Inferius, quod concoctum & elaboratum cibum transmittit in intestina, & propterea uocatur Græcè *πυλωρὶς*, id est, ianitor, quasi portæ curator. Hoc orificium, ut superius, est crassum: at minime in hominibus consequitur glandæ carnosam, ut Gal: uult. Canibus enim hæc glandula concessa est à Deo, ad fulcienda uasa duodeno intestino exportrecta.

Interior est tota nervosa, omni genere fibrarum prædita, intestinis rugis referta. Hæc tunica ad multos usus donatur crassa carne, in cocta uentriculo magis conspicua, cuius inuentio, autor est Fallopius.

Dissectus in tunicas tres, quarum

Secunda etiam propria uentriculi est, & immediate primæ annexa, carnosæ tota, atq; in crassie sibi ubiq; æqualis.

Tertia est impropria, extima eius partem circundans, eumq; cum uicinis membris connectens, à peritoneo orta.

De Intestinis.

Vniuersalis, quæ tractat generalia de uniuersis intestinis: quo quidem modo consideramus tunicas 3. similes uentriculi tunicis, in crassationem siue efflorescentiam internæ tunice, & multiplices rugas, quarum Fallopius mentionem facit.

Intestina, Græcis *ἐντέρεα* dicuntur, quod in intima sede corporis collocata sint: Vnde apud Comicos *Λείμω* uocabuli exentere. Historia autem intestinum duplex est, alia

Particularis, quæ cõplectitur singula quæq; prout distinguuntur ab autoribus. Intestinorum enim continuus est ductus, & quidam uentriculi processus: qui diuiditur in

Gracilia siue tenuia, Græcè *λεπτὰ* & *λεπτά*, quæ Plauto in hominibus & ouibus lactes dicuntur, aut propter candorem pinguedinis, aut ab antiquo uocabulo lactis, quod cibum alliciant. Hæc tria sunt, quorum

Crassa, de quibus in pagina sequente.

Primum uocatur *διωδὲκαδῶκτυλον* ab Herophilo quod longitudine 12. digitorum latitudinem adæquet. Quibusdam quidam non, ut reliqua, anfractuosa sunt, non intestini, sed potius ex quous, id est, processus uel exortus intestinum dicitur: Lat. diodenum.

Secundum Græcè *ἡστίς*, Lat. icium dicitur, quod inter dissectandum reliquis intestinis inanius reperitur.

Tertium propriè Græcis *λεπτόν*, Latinis tenue & gracile uocatur, quod omnium gracilimum sit: item *ἐλκυσ* quasi obuolutum, quoniam *ἐλκυσ* conuolueri seu circumuolueri est. Vocant et *ἐλκυσ* à multis anfractibus atq; circumuolutionibus, latinè ilium et tenue intestinum ab *ἰλκυσ*, id est, vertendo *ἐλκυσ* uero Galenus malum quoddam intestinum istorum uocat, ab *ἰλκυσ*, id est, circumagendo, quod Latinis conuolutus est.

INTEN: HVMA: CORPO: PART: TAVLAE.

24

Crassa & laxa inter
stina etiam, ut tenuia
triplicia sunt, quorum

Primum in brutis quibusdam magis, quam in hominibus conspicuum, τοφλόη id est cœcum dicitur, eo quod egressum in
troitu aduersum non acceperit, sed per unum foramen sit succorum ingressio & egressio: Vnde quidam hoc uocant mono-
culum, quidam uero saccum.
Secundum crassum & tabulatum intestinum multis cavernis cellulisque plenissimum uocatur κόλον, à κολάειδης id est, à tora
quendo: nam ingentes dolores in eo sunt, cum uel pituita, uel statu crasso est plenum: alij tamen dictum putant, quod propter
crassi ciem cupiant membro simile sit, quod κόλον uocatur.
Tertium & ultimum, nullis orbibus implicatum ἀπευθόμενον ἔντερον id est, Musculus σφικτικὸς ἐν σφικτικῷ, hoc
rectum intestinum. Hipp: appellauit ἀρχον, hoc est, principium, uel prin-
cipem: Latini longæon & longan. Vocatur ea parte, qua
Latus est, nec ullo musculo comprimitur
Χυλόρον, id est laxum.

Mesenterium, corpus ex duabus peritonei tunicis, multis glandulis, uenis, arterijs, et nervis
constitutum, eorundemq; uasorum sustentaculum & uehiculum uocatur græce μεσάριον,
quod in medio sit tenuium intestinorum, quæ Græcis ἀραιὰ, id est, tenuia & gracilia, mimi-
mè à raritate ita uocantur. Item μεσεντέριον, quod in medio intestinorum sit positum:
Gaza mesenterium apud Aristotelem lactes interpretatur, commotus auctoritate Plinij, qui
lactes dixit esse molliora intestina in homine & oue, fortè propter molliciem et suauitatem.
Budeus inquit, lactes significare non tam intestina, quam pingue intestina ambiens. La-
tis etiam mesenterium dicitur. Hoc

Primum corpus glandosum habet, quod ramo uenæ portæ
ad lienem tendenti transmittendo potius, quam diuisioni-
bus uasorum confirmandis (ut Galenus putat) desti-
natur, uocaturq; πάγκρεας, quod uidetur totum caro
esse: unde Ital: dicitur buon boccon: item καλινκρεας,
Latine etiam pancreas.

Deinde à Galeno
diuiditur in tria
quantū unicū est
utpote in
Dextrum, in dextro illo
Sinistrum in sinistro
Mediū in media regione.

Iecur crassioris sanguinis
officina, concupiscibilis
facultatis sedes, & uenarū
fons & origo. Græ:
ἥπαρ, Lat: hepar & ier-
cur dicitur, in quo consi-
deratur.
Gibba hepatis pars, unde uena caua prodit.
Sima hepatis pars, unde uena porta prorumpit.
Propria substantia, & caro hepatis, πᾶρ ἡπατος ab Erasistrato dicta.
Origo & fons uenæ portæ atq; caue.
Loborum numerus, in multis brutis frequens, in hominibus nullus.
Venæ, arteriæ, & nervi.
Tunica à peritoneo orta.
Ligamentum à peritoneo, iecur alligans.

Vesica, bili flaua sanguinem purgans, infima
epatis parte collocata, Græ: κύστις χολοδόκη
χολή id est, uesica fellea, & folliculus felleus,
qui duos obtinet poros.
Alterum, per quem ex hepate bilem trahit.
Alterum, per quem ex se bilem in duodenum intestinum transmittit.

Lien sanguinis limosi & melancholici expurgationi destinatus, uocatur græce σπλήν, Lat: lien & splen. Eius care uocatur etiam πᾶρ ἡπατος.
Aliæ eius partes peculiaria nomina non consequuntur.

Renes, in animalibus renibus præ-
ditus duo sunt, & uocantur Græ:
νεφροί, Lat: renes: in hisce præ-
ter cetera considerantur
Glandula, siue caruncule subalbæ & duræ, papillis mammarum similes, atq; angustissimis foraminibus perforatæ,
quæ uix capillum admittunt. Hæ præpediunt, ne sanguis cum sero effluat, atq; ne affatim serum transmittatur. De
his Eustachius in tractatu de renibus.
Glandula, ab Eustachio inuenta, externa à peritoneo eductæ membrane renem adherens, figura reni similis. Vre-
ter in renibus dilatatus, atq; instar pedis asferens diuisus in ramos maiores ex parte nouem, in sine dilatatos, atq; ca-
runculas amplexantes. Hic colatorium uocatur, eo quod præcis Anatonicis & Vesalio uisum sit instar coli urinam
transmittere.

Canales urinarij, siue meatus urinarij, Græ: ὀφθαλμοί, καὶ ὀφθαλμοί, καὶ ὀφθαλμοί τῶν νεφρῶν sunt dicti, Latine ureteres, id est, meatus urinam ex reni-
bus in uesicam deferentes.

Fundum, quod appellatur totum id, quicquid intra cavitatem uentris continetur.
Cervicem, per quam uesica lotij uel quantitate onerata, uel acrimonia stimulata, sese exonerat. Hæc etiam collum di-
citur, quod in exortu musculo sphinctere obductum est, de quo alijs.
Tunicas, quæ multo aliter in hominibus atq; in brutis sese habent.

Vesica urinaria, siue lagena,
qua excipitur & colligitur
urina, Græ: κύστις καὶ κύστις
& κύστις ἀποδοχὴ uoca-
tur. Hæc diuiditur in

Meatus, qui duplices sunt:
alij enim inferunt.

Venas, arterias & nervos,
de quibus alijs.

Vrinæ immisioni, ut ureteres, qui utrinq; à lateribus inter uesicæ tunicas obliquo ductu
delati, in uesicam inferuntur. Vbi autem horum est insertio, ibi sunt membranulæ uel
ualuulæ urinae recessum impediētes.

Vrinæ excretioni, qui rursus
sunt duplices, quorum alius
reperitur in

Utero gestatis, & dicitur ὀφθαλμός, per quem uesica
puerorum, dum adhuc in utero hærent, sese expurgat.

Adultis, qui urinam per uesicæ collum reddunt, & dici-
tur ceruix seu collum uesicæ.

Hæc de partibus nutritioni famulantibus, pro nostro instituto sufficiant: reliqua huc spectantia
ad alias tabulas, & anatomicam plenam historiam pertinent.

DD 2

DE PARTIBVS AD PROPAGATIONEM GENI

Prima sunt uasa, materiam semini aptam deferentia, eaq; preparantia, & sunt due uenae, atq; due arteriae, à singulis lateribus una uena & una arteria utrinq; quae dicitur *σπερματικα*, id est, uasa spermatica, à nonnullis preparantia dicte sunt: arteriae quidem *σπερματικα* dicitur, uena autem *σπερματικα* *φλεβος*. Haec uenae arteriaeque in descensu ad testes ramorum myriadibus utrinq; complicantur. mirum in modum: quae quidem complicatio uaricosus plexus dicitur.

Virilia, quae quadruplicia existunt, quorum

Secunda sunt uasa, semen conficiencia siue generantia, eaq; duo, quorum alterum est

Varicosum et candidissimum quid, testis uero adhaerens, quod simul cum facultate testis illi impartita, semen media ex parte confectum ad perfectam elaborationem perducit, uocaturque *ἐπιδιδυμὸς* propriè, quod testis incumbat. Alij magno errore ex testis tunicis unam uocant *ἐπιδιδυμὸς*. Alij uero eò, quod ueritè parastatem uaricosum ignorauere, illud, quod nos *ἐπιδιδυμὸς* nominamus, uaricosum parastatem uocant.

Tertia sunt seminis ad perfectam elaborationem perducendi delationi inferuentia, quae sunt duo corpora alba, dura, neruorum instar ab Epididymide, orientia, uocanturque Graecè *ὄρχις* & *σπερματικὸς*, Latine ab officio uasa deferentia

Testis, proprium seminis generationis instrumentum, semine epididymide excipiens, *ὄρχις* dictus: At quia testes duos *ἐπιδιδυμὸς* appellantur. A Galen: tertio alimentorum ad testes referuntur, Latine: quod uirilitatis testimonium prebeant, testes testiculi: ab alijs colei à coele, à quo dependent. Ad testis tunicas pertinent membranae, quibus inuoluuntur. In hisce enim & appellandis auctores admodum inter se controuersati. Alij enim constituunt tres, alij 4. alij 5. & 6. Nos auctoritatem priorum posthabita, conabimur ueras tunicas enumerare, ipsas propria assignare nomina. Constituimus igitur tunicas quatuor, quae

X. Generationi inferuentia membra duplicia sunt: alia sunt

Quarta sunt, perfectum & elaboratum semen ad commendam ei aculationem conseruantia. Haec duplicia sunt, alia enim

Colligunt semen ad frequentem ei aculationem, quae à multis anatomicis constituta. Sunt autem due uesiculae ex multis cavitatibus anfractuosis constitutae. Rophilo primo harum uesicularum inuentore, uocantur *σπερματικαὶ κύστεις* gyri uocantur. Nonnulli, qui has uesiculas ignorauerunt, testes duplices dixerunt.

Comprehenduntur glandula satis magna, uesicae collo, ubi uisus est stantia praedita est. Vocatur autem Graecè *πρόσθιος* cat. Preter mures, quo cum superioribus uesiculis semen colligere & uenit, multo existit tenuius: Secundò, ut salinali & pingui humido cum canalem lotium transeat.

Muliebria, de quibus in sequenti tabula.

Quintum est instrumentum, immisioni seminis in uterum & excretioni urinae inferuentis, quod est penis caput uel glandem penis. Habet autem tria ligamenta, à Synchondrosti osis pubis orta: unum duos reliquo corpore penis coherens praecipue tum ei aculationi seminis, tum urinae emissioni. Glandem autem, quae brancus canalis est, ac Graecè *ἐγδὴς*, & Latine urethra uocatur, qui constat duabus tunicis, quae

Est à cute, quæ quia multis rugis referta est ἀρτεὶς & ἀρτεὶς dicitur: Latine bursa & scrotum, à quibusdam scortum.

Due sunt externe, & utriusque communes, quarum altera

Est membrana carnosæ, quam Vesalius innominatam relinquit. Paulus Aegineta, & Ruffus eam uocant ἀρτεὶς, ἀρτεὶς δὲ ἀρτεὶς, id est, quod excoriari possit. Hæc carnosæ membrana totius corporis multo tenuior existit & uenis arterijsq; referta est. Hisce addit columbus cuticulam uel epidermidem, quæ hic membrane nomen non meretur.

Prima & exterior uocatur à Galeno, Ruffo & Paulo ἐλκυστήρ, ἀρτεὶς δὲ ἐλκυστήρ, quod uaginam & inuolucrum, seu receptaculum significat: à Paulo uocatur etiam ἐλκυστήρ, etiam ἐλκυστήρ à rubea dicitur, quia augetur fibris carnosiss. Vnde nonnulli hanc membranam pro musculo habent, ac uocant ἀρτεὶς. Anatomiæ existimant hanc tunicam à peritoneo originem ducere: Oritur autem ab oblique descendens dentibus musculis, & continet omnis generis herniarum species. In posteriori parte testis annexatur testiculo, atq; ibi πρὸς τοὺς uocatur: in anteriori parte & à lateribus libera est.

Secunda immediatè testis substantiam mollem ambit, atq; unitam conseruat, à Galeno ἀρτεὶς, à Vesalio ἐπιδιδυμὴς errore quodam uocatur. Ruffus Ephesus hanc membranam omnium rectissimè uocat ἐλκυστήρ, id est, membranam uernosam.

Due sunt singulis propriæ quarum

Hisce iam enumeratis membranis aliæ adijci possunt, ita à me in hernia hydroceli repertæ. Vidi enim uasa seminalia secum ex uentre duxisse membranas à tribus musculis abdominis & à peritoneo, quarum una erat à musculo oblique ascendente, altera ab oblique descendente, & erat ἐλκυστήρ: tertia à transversali, quæ ita complicabatur cum superiore, ut uix separari posset: quarta à peritoneo. Hæc membrana uasa seminalia testesq; instar uagine integunt, de quibus fusiùs alias.

à multis Anatomiæ scriptoribus ignoratæ fuerunt, primum uerò à Rondeletio, deinde à Fallopio p. a. memorie præceptoribus meis, ex Herophili scriptis reperta. Constat, ad glandulam parastatam, ubi uesica ceruix oritur, positæ, uidenturq; ex uasis deferentibus produci, & eorum processus esse. Ab Herophilo uocatur ἀρτεὶς, id est, uaricosi parastatæ uel adstites, à Galeno, ut fallor, meatum seminalium extrema. Vesalio uasorum semen deferentium, ut uisus d' a. accepere pro parastatis uaricosis, ut antea quoq; monuimus: unde Anatomicorū permulti in his partibus appellandis mirifice differunt.

collo, ubi ex uesica in meatum urinarium primò prorumpit, ad penis radicem substrata, quæ reliquis glandulis candidior existit, & satis dura substrata. Lat: glandulosus parastates, uel corpus glandulosum. Adhuc enim glandulas, seu duras carnis in seipsam conuolutiones teste Galeno significat. Constat, ad parastatam referre dictum est, puto alia duo illi assignanda esse, nempe primum, ut semen incrasset: ante enim, quam semen ad hanc parastaten perueniret, humiditate urinarium meatum irrigeret, tum ne ab acerbis humoribus cum urina permeantibus facile offundatur, tum ut tanto expeditius per lubria

ueniens, & penis ipse, de quo in tabulis partium externarum. Hic facit ad uoluptatem excitandam, & semen proliciendum, diuidiq; potest in penem ipsum, & in tabulis partium internarum. Lat: glandulosus parastates, uel corpus glandulosum. Adhuc enim glandulas, seu duras carnis in seipsam conuolutiones teste Galeno significat. Constat, ad parastatam referre dictum est, puto alia duo illi assignanda esse, nempe primum, ut semen incrasset: ante enim, quam semen ad hanc parastaten perueniret, humiditate urinarium meatum irrigeret, tum ne ab acerbis humoribus cum urina permeantibus facile offundatur, tum ut tanto expeditius per lubria

Altera interna est, membranosa, tenuis, & exactissimi sensus. Altera externa, tota carnosæ existens, ad urina atq; seminis expulsionem ex transversis conflata fibris.

INTERNARVM HVMANI CORPORIS

Materiam semini aptam deferunt & preparant, suntq; uena & arterie spermaticae, in uirilibus membris descriptae, at multo minores. Eodem etiam modo, ut in uiris, uena arteriaq; separate, regionem testium, ut inquit Fallopius, transcendunt, sed antequam ad testes perueniant, complicantur: quae quidem complicatio, (ut supra in uiris) uaricosus plexus uocatur.

Semen generant & ad perfectam elaborationem perducunt, quae etiam, ut in uiris, duplicia sunt, at hoc differunt, quod in mulieribus instrumenta testes dicta, epididymidibus priora sunt. Ex his igitur

Vnum uasorum seminalium implicationem sequitur, corpus minime, ut testis uirilis, rotundum, glandulosum aequale, molle ac continuum: Sed planum, substantia membranaceum, inaequale, durum, cauum, multisq; uesculis sibi mutuo adnatis similiter, atq; de uaricoso plexu traditum est, refertum. Id pro testibus muliebribus sumitur, quod mea quidem

sententia parasitates potius quam testes appellandum uenit. Nullam enim similitudinem uim formae, tum contento, quod est quid aequum limpidumq; aliquando etiam luteum, cum testibus uirilibus obtinet. Tunicam uero propriam & impropriam habet.

Alterum epididymis, quod in mulieribus prodit ex uasa deferente. Nam nihil aliud est, nisi portio uasis deferentis uertiginosa, circa testem inuoluta, testis instrata, deferenti uasi continua, estq; uas peculiare ex deferentis uasis gyrus uel anfractibus effectum, substantia epididymidi uirili simile: aliquanto tamen mollius & carnosius est, semine bono turgidum. A Galeno & alijs muliebris epididymis uocatur: at aliter connectitur cum teste dicto in mulieribus, atq; in uiris.

Deferre semen muliebre astimantur, & sunt duo uasa, quae ab officio deferentia dicta, gracillia admodum, angusta, angustioramine aliquo usq; perforata, substantia candida & nervosa, forma tereti, capreolari, et uertiginoso ductu graciliora redacta ex diffuente membrana, qua continentur, uespertilionum alarum instar, uteri cornibus inferuntur. At, quomodo semen per haec duo uasa in uterum immitatur, uideri non potest.

Muliebria, quae primum, quod exceptioni & non, ut uirilia, ei aculationi seminis aptata sunt, a uirilibus differunt. Deinde differunt etiam ratione conceptionis. Primum autem considerabimus uterum uacuum per se, deinde partem mox sequente praegnantem, quae igitur ad uterum manem pertinent, quintuplicia sunt. Quaedam enim.

Virile & muliebre semen recipiunt, indeq; foetum creant, & sunt uteri. Uterus autem quasi utriculus uocatur, Graece $\mu\alpha\tau\epsilon\kappa\alpha$, Latine matrix, eo quod omnia animantia inde tanquam a matre oriuntur. Dicitur & $\delta\upsilon\sigma\epsilon\gamma\alpha$, a Situ: nam omnium uiscerum in mulieribus extremum est. Vocatur & $\alpha\delta\epsilon\lambda\phi\eta$, quod soror est. Latine uulua, quasi uolua, quod foetus ea uoluitur, proprie de brutis dicitur. Uterus autem mulierum consideratur

Foris duo habet, quorum

Primum a lateribus utriusq; fundi est lenis & obtusa quaedam apophysis & protuberantia, papillis similis, qualis in uituli capite cernitur, quae cornua praeputia sunt, uel desinit in duos utrobique obtusos angulos, quos uocant $\nu\epsilon\gamma\epsilon\kappa\alpha\varsigma$ id est cornua, a situ & figura cornuum, quibus uteri brutorum praecipue ruminantium praediti sunt. Primi Anatomici bruta & minime homines seuerare, quare hominibus similes partes falso ascribere. Multi uolunt per haec cornua semen in uterum mitti, quod nulla ratione demonstrari potest.

Secundum processus est utriusq; unus a matricis cornibus ortus, quos Vesalius non recte uocat facinaria $\nu\epsilon\gamma\epsilon\kappa\alpha\varsigma$ & ligamentosos musculos: Sunt enim ligamenta laxa, teretia, peritonei beneficio ilibus armata, quae transeunt siue transforant musculorum abdominis aponeuroses, & non longe ab inguinibus terminantur. Vocantur autem proprie matricis ligamenta siue tendones: a Fallopio meatus seminares, & alio modo describuntur.

Fundum, qui est interna cauitas, & quasi hortus nostrae procreationis, propria continuaq; actione semen excipiens fouensq; dum foetus maturus est partui. Is Graece $\sigma\iota\mu\varsigma$, Latine Sinus dicitur, qui in dextrum & sinistrum obscuriori sutura, qualis in scroto existit, distinguitur.

Intus diuiditur

Congressui maris & seminae in inferiunt, sic ut & primae seminis ei aculatione, utpote cumus siue pudendum muliebre, quod etiam a quibusdam $\nu\epsilon\lambda\lambda\omega\varsigma$ $\gamma\upsilon\upsilon\alpha\upsilon\eta\epsilon\omicron\varsigma$ id est sinus muliebris, a quibusdam ceruix uteri dicitur. De hoc & eius partibus latius in tabulis externarum partium dictum est.

Cervicem uel collum uteri, quod a praeis proprie sumebatur pro ostio uteri, per quod semen uirile in uterum ingreditur: improprie a neotericis pro muliebri pudendo, in quo actus ueneris perficitur: uocatur & $\sigma\omicron\mu\epsilon\omicron\varsigma$ id est, uteros.

Matrula, cum foetum natum alant, etiam earum historia instrumentorum generationi subseruientium historiae esset adiungenda: Sed cum exteriora ad primas tabulas pertineant, & interiora ad uberum ad glandularum historiam spectent, his hic super sedeo.

De partibus in utero existentibus, dum mater in utero gerit.

Partes in utero contentae tempore praegnationis, uel cum semina in utero concepit in diuersis corporibus uario sese habent modo. Quia uero Anatomie procerum alij haec, alij illa inspicere bruta: pauci uero humana corpora secure: in delineandis, describendis, et appellandis his partibus confusionem et obscuritatem non exiguam lectori attulere. Equidem, quò me hisce tenebris explicarem: commotus uaria animantium corpora secui. Vt igitur ad intelligendos autores fores Anatomie studiosis aperiantur breuiter, quae in singulis à me animaduersa sunt, hic simul amotabo. Consideramus in utero praegnanante duo, quorum alterum spectat ad

Exteriora foetui ambientia, quae omnia coniunctim sibi mutuo connata, unum uidentur constituere, quod Graecis δευτερον, Lat: Secunda uel secundina dicitur, idque duabus de causis, uel quòd secundò post partum procreetur, uel quòd secundum ab utero sit fetus domicilium ac indumentum. Paulus non rectè uocat χοριον, nam membranarum altera dicitur chorion: appellatur δευτερον, id est, quòd in pariendo ultimum est. Propter secundina sumitur pro toto eo, quòd partum paulò post sequitur. Constat secundina ex tribus, quorum

Foetum queras C.

Primum consideratur in triplici genere animantium, et

Secundum continet duas membranas foetum inuoluentes, de quibus queras in sequenti paragraphi: littera A.

Primo in humanis corporibus, in quibus reperitur massa quaedam, parenchymatis siue sanguinis coeeti, uel ut Vesalius planius inquit, orbis plene lunae similis, foetum nusquam ex toto ambiens, crassitie magni uiri pollicem aequans: constat ex infinitis uenarum, mensuris purgationibus destitutarum, et arteriarum ramusculis inscrutabili modo inter sese implicitis contextisque, deinde etiam ex parenchymate quodam, uasorum collectioni et securitati deferuente. Corpus hoc non ubique semper haeret. Fallopius uult haerere semper alteri uteri parti, in quam definit foramen à seminario meatu ueniens, ita ut foramen hoc sit centrum totius spatij occupati à placenta. Alijs anteriori in regione, alijs posteriori in regione uteri haeret. Antiqui et neotericorum multi, quibus incognita fuit, uocant cotylidones, quae ruminantibus propria sunt, ut postea liquebit. Alij putant à Galieno chorion uocatum, sed falsè. Recentiores in humanorum corporum dissectione uersati, uaria huic massae indidere nomina. Fallopius uocat placentam. Columbus affusionem orbicularem. Anatomicus Bononiensis quidam, quo iudicio ignoro illi hepatis munus attribuens, uteri hepar uocat. Alij uocant glutem, et substantiam lienosam.

Secundo in cornuibus et ruminantibus omnibus, haec massa uidetur in multa corpora diuisa, et per membranà chorion, Leopardi maculatum insister, dispersa. Sunt autem tubercula, papillis mammarum, et uerticillis, quibus fusi aggranantur, et cotylidonibus priscorum similima, inaequali magnitudine et distantia per uniuersam membranam disseminata: plura in uteri cornibus, atque in reliquo chorij corpore. Substantia est similis tenis parenchymati membranula circumuoluta. in medio uersus foetum leuiter sunt excava uata, usque ex cavitare emittunt. Vocantur ab Hippoc: cotylidones: membrana ab uteri substantia prognata integuntur, si ab utero trahuntur, uidentur ex uasculis extrahi. Substantia liensa beneficio uasorum adheret.

Tertio in alijs quadrupedibus non ruminantibus, ut canibus, felibus et porcis aliter sese habet haec massa. Est enim in hisce diffusa aequaliter per membranam chorion hoc modo: Chorion ex duplici constat substantia, altera carnosa extrinseca, satis tenni, aspera, in aequali, nullibi cum utero coniuncta, sed propter asperitatem uteri tunicae ita adherente, ut non difficile ab utero auelli possit: altera substantia interna, membranosa.

Tertium queras littera B.

INTERNARVM HVMANI CORPORIS

*De membranis foetum in utero existentem
inuoluentibus.*

Vna externa, totum foetum amplectens, nervosa ualidaq; undequaq; existens, in exteriori superficie, qua uterum respicit, carnosam eamq; uiscidam substantiam, quod in canibus & porcis manifestius conspicitur, acquirit. In cornutis prorsus per totam substantiam membranosa est, sed cotylidonibus, quae spongiosa & carnosae substantia sunt, et folliculis ab uteri substantia productis usq; ad uasorum exitum comprehenduntur, repleta. Haec membrana dicitur foetus urinam colligere, & uenas arteriasq; sustinere, quare nulli alij parti, quam placenta (ubi etiam crassissima existit) adheret. Hoc eodem loco uenarum arteriarumq; tenuiores ramusculi per placenta dispersi, uidentur in magnos ramos, quasi membranam findentes, non aliter, atq; arborum radicle in magnas, deinde in truncum arboris resultantes, colligi, atq; umbilicalia uasa producere. Vocatur proprie $\chi\omicron\gamma\sigma\tau\omicron\upsilon$ ἢ $\chi\omicron\gamma\sigma\tau\omicron$, quod in eo uasa, ueluti in choro disposita sunt. Nonnulli scribunt per ω $\chi\omicron\gamma\sigma\tau\omicron\upsilon$, quod foetus quasi domicilium, & domus sit, uel quod una cum foetu $\chi\omicron\gamma\sigma\tau\omicron$, id est, procedit: uocatur etiam a quibusdam secunda. Constitui uidetur ab externa intestini tunica dilatata, ut & amnios ex dilatatione intestini siue substantiae suae uiscosae: in cornutis manifestum exortum a cute dilatata consequitur.

A. Secundum constat in rationalibus ex duabus, & non ex tribus (ut Galenus illiusq; aescle ad nostram aetatem usq; credidere) tunicis siue inuolucris, foetum tum tutele, tum excrementorum expiendorum gratia inuoluentibus, a crassiori seminis parte procreatis. Harum

Altera intima, foetui proxima, etiam, ut chorion, integrum cingit foetum, chorio multo tenuior, attamen pro tenuitate ualde ualida & robusta, ab uracho (ut quidam uolunt) dilatato prognata, undequaq; libera existens, praeterquam in regione placenta, ubi chorio ita firmiter annectitur, ut a se mutuo separari nequeant. Aliquando tamen prorsus aliqua ex parte pro copia aquae, inter hanc & chorion contentae, se iunctae reperiuntur. In cornutis ita firme primae adheret, atq; annectitur, ut difficulter separetur, & nihil humoris inter hanc & primam inuenitur, omnis uero aqua inter foeturam, & hanc tunicam. Inter hanc & foetum plus aquae, atq; inter amnion & chorion inuenitur, quare nonnulli dubitant, num sudor sit, existimantq; potius esse urinam per penem excretam. Continetur etiam hac membrana sordes smegetosa & crassiuscula, a quibusdam butyro assimilata: uocatur Graece $\alpha\mu\upsilon\iota\omicron\upsilon$, id est, membrana agnina, uulgo caria uirginea, quidam pueri hanc membranam in procreatione dirumpunt, & secum educunt. Vocatur in masculis galea, in feminis uitta, apud Italos indusium.

Tertia $\alpha\mu\alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon$ ἢ $\alpha\mu\alpha\upsilon\tau\omicron$, id est, sarcimimalis magno errore seminis ad nostra tempora ascripta, a me nec in feminis, nec in caniculis, si uisus, nec in cornutis reperta est. Attamen eius loco uidet in cornutis membranam tenuem, ex cute foetus dilatata prognatam atq; totum foetum, ut priores, cingentem, quae foris erat lubrica, intus aspera & sordidit smegetosa sublimata. Notauit etiam aquam membranarum contentam dilabi huc & illuc, unde forsitan accidit, quod sarcimimis speciem pars quaedam membranarum referat, & in hunc errorem lapsi sint scriptores. Fallopij autem allantoidis necessarii usus in brutis demonstratio non potest admitti, quoniam in canibus non inuenitur.

PARTIVM TABVLAE.

De uteri gestatione & embryone.

30

Ut est adhuc substantia feminalis, necdum recte formata & perfectis membris ornata, sed rudi minerva delineata. Hinc enim dicitur à Gal: lib: Sympto: $\chi\eta\mu\alpha$, id est, uteri gestatio. Cum aliquanto ualidius est factum hoc animalis rudimentum, tunc Gra: & Lai: uocatur embryo uel embrio.

C. Vetus du-
pliciter consi-
deramus, aut

Vi coaliuit in creaturam per-
fectam, omnibusq; partibus
absolutam. Tunc enim dicitur
in seminis foetus, eoq; in ute-
ro fouetur: in brutis & inas-
minatis foetus. In foetu autē
reperiuntur partes, quae ab
adultorum partibus discre-
pant. Harum alie spectant ad

Ossa & cartilagine,
quae ad ossium tabu-
las pertinent.

Partes nutritoriae,
quae duae sunt utpote

Partes uitales siue spi-
rituales, quae dupli-
ces sunt, in quibus nu-
merantur

Vena umbilicalis, quae indiuisa ab umbilico sursum tendens, peritonaeo
semper inuoluta, atq; musculis abdominis annexa, simulatq; ad hepar per-
uenit, scissione siue perforatione sibi uiam facit, ac iuxta uenae portae
exortum eidem inseritur. Per hanc uiam primò, deinde per uenas mesera-
cas sanguinem maternum in foetus uentriculum ingredi, atq; nouam con-
coctionem subire opinor. Semper enim in abortuum uentriculis, & canis-
culorum, catulorum, procellorumq; excelsorum stomachis chylum candi-
dissimum reperi, in intestinis uero faeces crassissimo et atterrimo sangui-
ni simillimas. Ignoro, quae ratione inductus Bononiensium Anatomicus
Arantius sibi in suo libello de humano foetu imaginatus sit, foetus uentri-
culum concoctionis facultate priuari, uteriq; hepar (ut ille inquit) illam
coquendi facultatem subire, propterea quòd foetus in utero nihil nutrimen-
ti per os sumit: ratio uero & experientia aliter attestantur. Animadu-
tendum, quod haec uena in adultis coalescat & in ligamentum conuer-
tatur, & rursus in proeuectioribus aetate, in uenam laxissimam rursus muta-
tur, ut semel Noriberge in uirgine. 34. annorum, quae ex maxima hepa-
tis obstructione, duritie, & debilitate occubuerat, uidi.

Vracho, id est, meatus urinaris, per quem foetus, dum in utero existit,
urinam emittere creditur, inter duas arterias medius, ab umbilico recta
per peritonaeum (quo toto ductu inuoluitur) ad uescicam urinariam ten-
dit, cuius fundi medium recta uia, & non oblique, ut ureteres, perforat.
Adultis etiam (ut uena umbilicalis) ligamenti munus subit.

Primò binæ arteriae umbilicales, quae maiori ex parte (ne dicam semper)
duplices, ubiq; à me uisae sunt, extra foetū colligatae non longè ab umbilico
laxo ligamento leniter disiunctae, deinde post umbilicum à se mutuo re-
cedentes, lateribus uescicae, beneficio peritonaei annexae, utriusq; ossis sacri ar-
terijs singulis, singulae inseruntur. In cornutis et ruminantibus arteriae um-
bilicales in arteriam aortam implantantur.

Secundò pulmo, qui in utero
quidem officio suo respiran-
di nondum utitur, quare tria
consequitur peculiaria, quae
alia quā in adultis munia obe-
unt, nam pulmo in utero exis-
tentibus

Primò substantia non est, ut in adultis, ra-
rus, fungosus, & spirituosus, sed densior et
sanguineus: nutritur enim dum in utero
est, sanguine crasso, & minime spirituosus.

Secundò cum sanguine crasso enutritur,
necesse est, ut consequatur uasa crassa
sanguini transmittendo apta. Vena enim
arteriosa, quae sanguinem extra uterum
ad se rapit, ad hoc nimis est densa &
crassa: unde in foetu, dum in utero existit,
peculiaris est meatus, à uena caua non lon-
gè à cordis basi ortus, ubi cordis dextra
existit auricula & in arteriam uenosam
foramine satis conspicuo insertus. Ad il-
lura meatum est membrana secundum Ve-
sal: refluxum sanguinis prohibens. Hic
meatus in adultis coalescit, & occluditur.

Tertiò, cum foetus per os non respirat, con-
sequitur osculum non longè à cordis basi
ab arteria aortae: unde in uenam arterio-
sam dehiscit & spiritum pulmoni ad ca-
loris naturalis distillationem transmittit.
ne uerò recedat, etiam ut arteria uenosa,
dicitur consequi membranam. hic meatus
etiam coalescit & occluditur. De his
Galen: de usu part: 15. cap. 6.

E E

Tertium, quod ad secundinam spectat, est collectio uasorum umbilicalium, proceſſus, siue funiculo, seu canali cuiusdam uiscoſo neruoſoq; longo tortuoſoq; incluſa, unde à quibusdam funiculus, à quibusdam laqueus, à nonnullis intestinum dicitur. Vasa umbilicalia, quae una uena & duabus arterijs comprehenduntur, debilia existunt, & facile tensione, contorfione uel rumpeantur, uel angustantur, uel multis triciſ implicarentur, si soluta, huc illuc incerto uagabundoq; ductu fluere. Quapropter (ut ante dictum est) funiculo quodam tenaci ex umbilico prognato siue educto ita conglutinantur, ut non nisi accurata ſeſione à ſe mutuo ſeparari queant. In cornutis facilius ſeparantur & aliquoſq; integuntur membranea cute. Conſert & hec tenacitas ad uasorum ductum pampini modo tortuoſum conſeruandum, & uim extensionis excepiendam, ſiquidem hac ratione ſanguis & ſpiritus circumducti diu per longam uiam melius elaborantur, ac non intercepti, augent robur nerui & ligamenta à lateribus diſperſa. Longitudo canaliculi interim adaequat, interim excedit uenam, idq; non tantum longi ductus uasorum gratia, uerum etiam ob duas alias cauſas, nimirum ne ob nimiam breuitatem rumpereſſet, aut etiam ne partum in egrediendo remoraretur. Talis eſt ductus, ſi à chorio inchoari uelis, ex medio placentae prodit, ita ut ex membranis chorio & amnio ſimul conuolutis prodire uideatur, & cum ſectus capite ſuſſum ſpectet, facie placentam reſpiciat, recta tendit ad ceruicem, quam à poſteriori parte cingit, inde per humerum ſiniſtrum ad anteriora ſeſe ſectens, in umbilicum inſeritur. Hic ductus à manibus pedibuſq; remotus eſt, & propterea liberrimus ſecuriſſimuſq; exiſtens, omni periculo implicationis caret. Tria enim in eo reperiuntur uafa

Vena umbilicalis, quae à quibusdam gemina, à quibusdam unica uifa eſt, in multis ac uarijs corporibus ita à me obſeruata. In humana ſecundina ex uenarum paruorum per placentam diſperſarum duobus maioribus ramis, una reſultat uena, ubiq; utraq; arteria laxior, in principio latior, deinde anguſtior per canaliculum ductum euſdem in noduloſi effigiem conuoluti ſequens, inter utramq; arteriam progreditur. Circa medium longitudinis locum mutat, ac in gyrum ſemper circumuoluta deſcendit ad umbilicum, quem penetrat, ut dictum eſt. In uacino ſetu quinq; reperiuntur uafa, 2. uenae. 2. arteriae & uerus urachus. idem ſatetur Fallopius, qui dicit in cornutis ſeſe ſemper 2. uenas inueniſſe, quae antequam abdomen ingrediuntur, in unam coeunt.

Arteriae duae notantur ab Arantio: à Fallopio non perpetuo duae, ſed ſepe una praeforibus umbilici diuifa eſt animaduerſa, à me uero ubiq; geminae, canaliculus neruoſus arteriarum gratia exſculptus, beneficio laxarum fibrarum immiſſe. Hi canales neruoſiores erant canali uenae umbilicalis, & ita ducuntur, alio quando coniunctae, aliquando ſeparatae ab umbilico ad placentam.

Vrachus Graecus: ὀμφαλὸς in ſeminarum canaliculo nullus à me obſeruatus eſt, in brutorum quidem. Huius rei habeo aſſenſorem Bartholomaeum Euiſtachium in opusculis ſuis anatomicis duobus in locis, & primo in opusculo de renibus, ubi ſic loquitur: quamuis uracoe an poſſe, an alia uia in membranam agnina, non autem (ut multi opinantur) inter hanc & chorium excernatur, haud ſit item Anatomicis omnibus manifeſtum. Secundo in oſium examine: in humano ſectu nullum urinarij meatus in umbilico & allantoidem perforati eſt ueſtigium. In cornutis, Vrachus eſt alijs uafis umbilicalibus latior ac laxior, rubicunda tunica ueſicae tunice ſimili praeditus.

Finis Tabularum Internarum.

32

DE OVORVM GALLINAE

CEORVM GENERATIONIS PRIMO EXOR- DIO PROGRESSVQVE, ET PVLLIGAL- LINACEI CREATIONIS ORDINE.



POSTQVAM IN FINE TABVLARVM DE internis humani corporis partibus, quæ ad brutorum generationem & foetuum partes peculiare pertinet, attigi, quod ex abundanti & nunc discrimen hac in parte inter quadrupeda & volatilia dignoscatur, & etiam quidam Philosophi, sese ex scrupulosis in scholis ubiq; agitatæ quæstionibus atq; ambiguitatibus omnibus facilius explicare queant: operæ prætium esse duxi hic subtexere, quæ in generatione, & formatione pullorum gallinaceorum animaduerti, incipiam à prima ouorum generatione, descendam ad oui absolutam perfectionem, & vltimò recensbo historicè, quidnam singulis diebus, dum inter incubationem formantur & animantur pulli, noui procreetur. Ne lector, qui quid naturalium rerum scriptores, qui sunt Hippoc: Aristoteles & Plinius de procreatione pullorum gallinaceorum, tradidere, legit, ullibi offendatur, vel in veritatis exquisita cognitione assequenda remoretur, dissentiant enim inter se autores: deinde ne quispiam vel historiæ meæ obscuritate, vel prolixitate, vel etiam ob sententiarum contrarietatem inter legendum implicetur hæsitetq; placuit in fine breuibus huius materiei scriptorum sententias adijcere;



QVa in plerisq; auibus generationis primordium ab auibus sæminis sumere, Zephyria, siue hypenemia, id est subuentanea, quæ alias sterilia & irrita vocantur, & absq; maris semine excusa sunt, demonstrant, circa brumam itaq; in gallinis communibus sub diaphragmate, ubi caua vena ex iocinore prodiens, diaphragma perumpit, sensim ac pedetentim, multi parui & subflauī globuli ex mero vitello conflati, cumulatim ob ventris breuitatem aceruantur, ac colliguntur, minime secundum ventris longitudinem, vt in viperis & serpentibus ouiparis, monilis ex corallis siue magnis margaritis conflati instar, iuxta intestina vtrinq; extenduntur. Eo in loco fouendis ouis aptissimo, dorsi in primis, deinde circumpositarum partium ligamenta dilatata atq; expansa, singulis ouis, singulas membranas venis arterijsq; refertas, vt inde nutrimentum augmentumq; acciperent, impartiunt. globuli in principio pauci & parui numero & quantitate aucti, maiores & inferiores primò, post reliqui ad priorem vterum protruduntur, ex hoc ad secundum, à secundo perfecta prorumpunt: qua verò ratione, nunc per vtriusq; vteri explicationem declarabo.

In gallinis duo reperiuntur vteri, quorum alter elatior existit, & lati intestinuli in gyros circumuolui formam representat, albo colore præditus, vacuus, & dorso annexus à me inuentus est. Superiori regione pertingebat ad imperfectorum ouorum cumulum, sub diaphragmate à dorsi ligamento dependentem, cui beneficio tenuissimæ membranæ alligatus erat, hic deprehendere non potui foramen, per quod inchoata oua uel ouorum seminaria, in hunc ingrediantur vterum. Constat autem primus vterus ex duabus tunicis interna nimirum, & externa, interna est alba, multis rugis referta, sic enim ante iustum tempus oua non elabuntur, externa similis est peritonæo, quæ à vena caua ramos venarum satis insignes, ab aorta arterias multas ad vterum ducit. in hoc oua valde augentur & albumen consequuntur.

Alter & inferior vterus, per quem galli semen immittitur, longitudine adæquat dimidium digitum, consequitur orificium angustum & strictum, quod ad crassitiem oui perfecti dilatatur, vterus verò hic laxè ouum comprehendit. Substantia eius est crassa atq; ex propria impropriaq; siue à peritonæo mutuata, conflatur tunica, externa hæc peritonæi, tenuis atq; plurimis venis arterijsq; conspicuis intertexta est. Interna siue propria crassior est, multò & minoribus paucioribusq; valis perfusa. Vterus hic secundus terminatur ad glandulas duas, quæ renum in auibus vicem subire existimantur, isthic habet strictum orificium sphincteris instar, quod à secundo vtero excipitur, haud dubiè sphincter hic dilatatur & constringitur rursus, dum ouum ingreditur,

& ingressum est. Officium huius est ouum excoquere, & calore suo ita indurare, vt putamen consequatur, num verò hîc prolificum galli semen ouo impartiat, me latet, vteri ceruix satis longa crassaq; est. Haftenus de ouorū origine et absoluta perfectione, nunc verò de pullatione, siue foetura. Animaduertendum hîc, quod pulli gallinacei, vt et aliarum auium, pro propria natura, ratione temporis, regionis, incubationis assiduitate, tardius maturiusue efformentur. Columella inquit diebus quibus animantur oua, & in speciem volucrum conformantur, ter septenis opus est gallinaceo generi. Aristoteles inquit: aestate gallinae duodeuigesimo die foetum excludunt, hyeme aliquando 25.

Equidem anno 1564. mense Mayo Bononiae, instigante me Philosophiae ordinariae professore excellentissimo, viro vt variarum scientiarum artiumq; sic Philosophiae, & in primis verò naturalis partis scientia eximio, Doctore Vlyssè Aldruando, promotore et præceptore meo perpetua obseruantia colendo, & alijs doctoribus studiosisq; cohortantibus, mandauit duas Gallinas glorientes, siue ad incubationem proclius feligi, earumq; singulis 23. oua subiici; atq; istis comitantibus, singulis diebus vnum, quo hæc duo præcipue cerneremus, nimirum originem venarum, atq; quid primò in animali gignebatur, aperui.

In primi diei ouo vidi luteum consequutum circum album, non admodum magnum, in cuius medio eiusdem coloris punctum siue orbiculum, ex circulo fluebat duo germi, quorum alter crassior & longior altero existerat, vitellus fluidior, atq; recentis oui luteum.

Secundo die vidi duas tenuissimas pelliculas, ceu membranas, quarum altera putamini immediate adhæsit, altera aliquantisper à putamine disita substantiam oui inuoluebat, in cacumine enim spatium exiguum fuit vacuum. Vitellus elatus erat ad cacumen, vt Aristoteles inquit tertio die fieri. Vitelli media pars candidior reliqua parte cernebatur, in medio conspexi quid femini simile, punctus & circulus inuenti sunt, sub membrana inuolvente oui substantiam, atq; fibris quibusdam sanguineis aspersi, album vt vitellus aliquanto liquidior solito, substantia alba vitro similis, quam vulgus semen galli existimat, aliquanto durior extitit.

Tertio die in albumine nulla fuit deprehensa mutatio, at punctus, siue globulus sanguineus in vitello ante inuentus, iam in albumine potius repertus, manifestè pulsabat, fundebatq; vnum vengeram, vt ex colore iudicare quiuimus, qui in duos scissus, multos emisit ramusculos, qui circuli modo pulsanter punctum ambiere, hi ramusculi suffulciebantur membrana tenuissima, quæ tum munere, tum substantia secundinam exprimebat. Tres itaq; hic repertæ sunt membranae, quarum prima putamini ascribitur, secunda oui vniuersæ substantiæ, tertia secundinæ.

Quarto die pertudi ouum ab obtusiori parte, & primò occurrit spatium adeo vacuum, vt articulum digiti priorem facillè admiserit, album instar aquæ, ob tenuitatem difflebat, globulus & reliqua maiora reperta sunt, pulsabat autem globulus, vasa minimè, ab altero latere globuli tres sibi mutuo coniuncti, colore translucidi, vitro simili reperti, ab altero latere duo rami, siue vasa arterijs non dissimilia extitere, quæ tamen non pulsabant. Albumine effuso in conspectum prodijt vitellus satis liquidus, & hinc inde sanguine quoquo modo conspersus.

Quinto die deprehendimus secundam membranam totius oui substantiam ambientem, & multis venis perfusam, ita à putaminis membrana liberam et validam, vt absq; offensione cum oui substantia extrahi potuerit, aperta hac membrana, globulum sanguineum pulsanterq; vidi profundius solito subsidisse. sumpsi vtriusq; gallinae quinti diei ouum, & in altero apparuit tantus globulus pulsans adhuc informis, sanguine vtcunq; circumfusus cum suis venis, vt ante dictum est, globuli à latere existentes colore tendebant ad nigrum habebantq; in medio minores adhuc globulos, qui coniuncti cerebrum quoquo modo representarunt, tertius globulus, non nisi in magnitudine mutatus fuit. In albumine visæ sunt partes dissimiles, quarum quædam tenues ad candorè accedentes, quædam crassiores. Vitellus facillime cum albumine confundebatur. In altero ouo manifestè caput pulli apparuit pro ratione corporis maximum, & in eo vtrinq; à lateribus vnus oculus subniger, qui in medio perlucidus conspiciebatur, in medio oculorum tertius globulus, à capite dependebat reliquum corpus oblongum, non longè à capite cor vel orbiculus pulsans situs, vnde & venæ visæ sunt primam ducere originem, nullum hîc potui deprehendere hepatis vestigium, ita interna erant confusa.

Sexto die præter reliqua, quæ omnia fuere maiora, vidimus ab obtusiore parte post membranarum siue pellicularum primò albumen, hærebat enim luteum in fundo, in albumine pullus viuus animatus, & omnibus suis partibus adumbratus fluctuabat, caput pro ratione corporis

corporis maximum illi concessum erat, nihil præter oculos perfectius & maius obtinuit, potui enim, sed cum aliqua difficultate in oculis omnes tunicas & humores à se mutuo discernere. Hinc non præter rationem Lactantius Firmianus ex eo, quod in aibus primò oculi generentur, iudicauit caput in aibus generationis exordium sumere, Fortassis oculi, vt artificiosissima operosissimaq; instrumenta, desiderant longum tempus, vt perficiantur. quapropter cum aues exiguo temporis spatio ouis immorentur, rerum creator primò ab oculis fabricam hanc exorditur. Porro inter duos oculos in superiori regione apparuit globulus satis magnus & pellucidus, qui cerebrum representare visus est, infra oculos erat rostro quid simile.

Septimo die omnia manifestius sese visui obtulere, primò pelliculæ tres, præsertim tertia secundina dicta, venas suffulciens, & omnem liquorem circundans, emisso liquore candido cum flauo, animal exiguum & rudi minerua efformatum prodijt, caput illi erat cæteris corporis partibus tum maius, tum perfectius, dignoscebatur & craneum & rostrum exquisitius, reliquum corpus cum membris informatum, ex visceribus nullum quasi potui distinguere, tum quia ventri thoraciq; inclusa erant, tum quia intus necdum veram & manifestam delineationem consequuta erant, vndiq; enim confusa cernebantur.

Octauo die inueni omnes partes maiores magisq; delineatas, & crura & alas, ita, vt iam pulli effigiem demonstrarit, validiori motu in oui albumine se ipsam voluebat. Præter hæc reperi venas satis conspicuas, in pulli vmbilicum immixtas.

Nono vidi secundinam venarum tum multitudine, tum magnitudine auctam, deniq; & copia sanguinis solito turgidiorem, transudauerat etiam sanguinis tenuissimi nonnihil, post secundinam visui occurrit pullus fluitans in albo & vtrinque à lateribus vitelli dimidium, tanq; vitellus in duas equales partes dissectus fuisset, vasa vmbilicalia multo erant maiora. Pullo exempto detraxi membranam propriam immediatè pullum cingentem, ne scilicet in humore periret, iam omnibus partibus absolutus et poris latis, ex quibus pennarum primæ radices prorupturæ erant, vnde quaq; conspiciebatur, caput omnium maximum extitit, oculi vero perfectissimi & suis palpebris donati. In capite vidi tres globulos transparentes, et simul auium cerebrorū figurā efformantes. Inferiores omnes à collo partes, ad integram naturalemq; figuram perductæ, foris in pectore è cordis regione pulsatio apparuit, cor suam habebat formam et colere subalbido præditum, pulfabat etiam extra pullum diu, iecur subpallidum, ventriculus, intestina, costæ et omnia alia viscera admodum fluida atq; flaccida reperiabantur. albuminis duplex substantia, & singulæ singulis proprijs membranæ compræhensæ erant. Altera portio fuit translucida & pullum ei innatantem continebat, altera lenta, crassa & pallida tanquam excrementitia albuminis portio in fundo oui hæsit.

Decimi diei ouum habebat secundinam solito aliquanto robustiorem, venas sanguine foris irroratas. Fœtus vitello tanq; puluinarî instratus omnibus partibus absolutus: femora dorsum & clunes erant primis radicibus pennarū obductæ, corpus vel venter pulli capite aliquando maior, contrarium asserit Aristoteles. In oculis omnes tunicas, omnes humores, et externa velamenta vitæ palpebras, atq; membranam qua nectant, vidi, cerebrum suos habebat anfractus & gyros, cor vero naturali figura & colore candido, vt partes spermatice præditum: pulmo ac costæ erant efformatæ, in ventre inferiori iecur ab albo colore ad rubicundū tendebat, ventriculus atq; intestina candidissima, prodibant ex fœtus ventre iuxta anum duo vasa vmbilicalia ad vitellum tendentia, exempto pullo deprehendimus maiorem partem albuminis absumptam, & quod super erat, crassum excrementum extitisse, à vitello verò parum vel nihil abscessisse.

Vndecimo die nullam, nisi quæ in magnitudine est, cognouimus differentiam, manifestus atq; caput, creuerat, pennæ subpullularant, fœtus in albo & tenui liquore, vitello incumbens, natabat, sub vitello hæsit crassum & viscidum albumen.

Duodecimo die, præter cætera considerauius membranas & humores, membranæ fuerunt quatuor, quarum prima roboris gratia putamini concessa est, ita enim valide putamen fragilissimū vnitum conseruat, vt ouū recens, et crudū ne a robustissimo viro, si acutiores partes vtraq; manu comprimantur, quidem rumpi queat, secunda totam oui substantiam ambit deprimitur & constringitur, pro oui imminutione, et contractione et hac ratione inhihet partium oui, quæ facile commotione, cum omnia liquidiora incubationis tempore redduntur, fieri potuit, confusionem. Tertia præbet venis arterijs sustentaculum atq; stabilimentum, arterijs enim atq; venis est referta, extrinsecus sanguine subtili conspersa totum ouum circundat, & secundinæ munere fungitur.

Tertiam sequebatur membrana pullo propria, quæ simul cum pullo aquæ non parum continuit, visum mihi est, hanc tunicam siue membranam iuxta umbilicum dilatare, & vasa umbilicalia inuestire, ad pullum quod attinet, maior solidior fuit, & maioribus pennis obductus erat. Extremitati superioris & inferioris rostri adhæsit quid albi & laxæ, quod feminae dicunt prohibere frugum apprehensionem, quapropter simul atque exclusi sunt pulli, hoc album auellunt.

Decimo tertio vidimus substantiæ oui minorem quantitatem, pullum maiorem atque magis pennatum; nihil præter hæc peculiare.

Decimo quarto die, quantum oui albumini abscefferat, tantum pullo augmenti accessit, erat etiam totus parvis pennis contextus, liquor pellucidus, crassus et viscosus, minori quantitate solito, propria membrana, ut & vitellus pellicula vasis referta, continebatur. Umbilici vasa visa sunt mihi numero quinque esse, quorum una vena membranam tertiam siue secundinam, cui multos ramos impartiebatur, petebat; duæ verò aliæ venæ per tunicam vitellum inuestientem disseminabantur, præter has venas, repperi inter vasa umbilicalia duas arteriolas, anfractuose vermium instar, ad vitellum tendentes, insertionem animaduertere non potui.

Decimo quinto die vasa vndique per secundinam diffusa fuere, & adeo tenues habebant tunicas, ut leui cultelli contactu vulnerabantur, effluxit sanguis valde rubicundus & tenuis, hæc vasa siue venæ, ab vno ramo satis crasso per medium chorii longè extenso prodire, dissecta secundina, effluxit aquosi feri non parum, deinde vesicula siue membrana in conspectum venit, in qua hærebant foetus in aqua natans, & simul vitellus propria membrana conclusus, hæc membrana secundina, ut in foetu humano amnios chorio, annexa erat, vitellus in duas partes manifestè diuisus, cohærebat vix spatio dimidij digiti latitudinis, una tamen virgæ parti fuit membrana, quæ ex umbilico siue cute pulli enata fuit, reliqua superioribus respondebant.

Decimo sexto vidi crassam viscosamque albuminis partem vndeque fere absumptam, & arteriæ pulsantis ramum dissipatam inter membranam vitellum cingentem, membrana pulli & lutei eadem erat, alia quæ augeri debuere, maiora, quæ imminui oportuit minora sunt visa: inter cætera venter multo erat solito tumidior & crassior: in ventre viscera plurimum incrementi sumptuerant. In ventriculo repperi substantiâ chylosam, cuius tamen maior portio fuit in fine stomachi, iuxta ventriculum, extra ventrem pendebant vasa duo vermium instar, quæ potius intestinis, quam arterijs assimilabantur.

Decimo septimo die vidi & inter tertiam & quartam, & inter quartam & pullum substantiam aquosam, sed paucam, deinde ex umbilico vidi prodire arteriam vnâ, tres venas, & apophysim ab intestinis ad vitellum, venarum duæ ingrediebantur venas mezericas, tertia ad cauiam, arteria magna transcendens ventriculum, inferebatur in cor, ut alias vidi. Intestina extra umbilicum aliquo usque propendere, & meatus ex intestinis ad oui vitellum peruenire vidi, faeces durissimæ, nimirum putaminis instar, inter membranâ quartam, et pullum deprehendebantur. In ventriculo repertum est chylum non parum cum aqua permixtum: vitelli non parum in ventrem attractum fuit, positus, situs descriptioni Aristotelis respondebat.

Decimo octauo deprehendi inter membranâ quartam & pullum, quid excrementi veri ex pullo, quarta membrana inuoluebat luteum & pullum, pullus fuit totus plumosus & ventricosus. Separata pulli membrana, repperi propriam vitelli membranâ multis venis refertam, atque mediâ ex parte cum vitello iam in longum expro ducto, in ventrem raptam, viscosum, & album, cuius mentio est facta, omnino absumptum fuit. In pullo ventriculus, qui admodum creuerat, continuus & parum serosi humoris & plurimum materiei candidæ casei instar, quod credidimus chylum esse: tale etiam quid ex intestinis effluxit.

Vndevigesimo die pullus habuit caput deorsum inclinatum sub dextra ala & dextro crure reconditum, aquosus humor erat imminutus ubique, veræ faeces inueniebantur inter tunicam quartam & pullum, sic & aquosus humor, quo pullus totus madebat, vitelli membrana conspicuè visa est à cute pulli pronasce, atque ex contractione huius membranæ vitellum intus rapi, atque absorberi, ut etiam iam fere absorptus erat, præter hanc impropiam membranâ, obtinuit & propriam multis venis & arterijs refertam, in ventre vidimus ea, quæ ante, sed perfectiora, nihil vitelli (ut Albertus magnus vult) in intestinis deprehendi. habebat iam testes, cristam, gallus enim erat, præterea audiuius pipientem.

Vigesimo die fuit pullus effectus, & in putamine quatuor reperiiebantur membranæ siue tunicae, in una parte sibi mutuo annexæ, quarum duæ interiores, multas venas & arterias continebant.

nebant. Ad pullum quod attinet, vidimus intus tria vasa vmbilicalia, quorum duo visa sunt arteriæ, vnum vena esse. Vmbilici foramen occlusum erat, attamen specillo immisso facile aperiri potuit, dilatato foramine cultello, profiliit vitellus propria sua tunica vestitus, et in longū expro ductus, vitelli quantitas paulo fuit minor, atq; à principio extitit, cohaerebat beneficio canalis ex intestinis exproducti ipsis intestinis, arteria vmbilicalis cuius in 17, dici ouo mentio est habita, mul to apertius quàm ante visa est pulsare & in cor inferi, venæ bing implantationem moliebantur in venæ portæ ramos longe ab hepate, ex ventriculo dissecto effluxit chylus solito magis flauus, cum pauco aquæ, ex ingluvie aqua, ex recto intestino fæces subuirides, iecoris ad luteum colorem magis, q̃ ad rubicundum color tendebat, pulmo erat rubicundus.

Hippocratis sententia.

Hippoc: in libro de natura pueri sic tradit, volucris ex ouī luteo nascitur hoc modo, Incu bante matre ouum calefcit, & quod in ouo inest à matre mouetur, calefcens autem id, quod in ouo inest, spiritum habet, & alterum frigidum ab aere per ouum attrahit. ouum enim adeo ra rum est, vt spiritum, qui attrahitur, sufficientem ei, quod intus est, transmittat: & augefcit volu cris in ouo, & coarticulatur modo eodem ac consimili, velut puer, quemadmodum iam antea à me relatum est, Nascitur autem ex luteo ouī volucris, alimentum verò & augmentum habet ex albo, quòd in ouo est, atq; hoc iam omnibus manifestum factum est, qui animum aduerterunt. Vbi autem deficit alimentum pullo ex ouo, non habens id sufficiens, vnde viuat, fortiter moue tur in ouo vberius alimentum quærens, & pelliculæ circum dirumpuntur, & vbi mater sentit pullum vehementer motum, putamen ex scalpens ipsum excludit, atq; hæc fieri solent in viginti diebus, & manifestum est, quòd ita se habent. Vbi enim excusa est volucris, nullus humor in ouī testis inest, qui sane memorabilis existat, expensus enim est in pullum. Itidem Hippo: eodem in loco paulò ante sic inquit, Si quis oua viginti, aut plura, quo pulli ex ipsis excudantur gallinis duabus, vel pluribus subiicere velit, & singulis diebus à secunda exordiando, vsq; ad vltimam, qua excudetur pullus ex ouo, subtrahere, ac videre, inueniet omnia se habere iuxta meum sermo nem, quomodo volucris naturam ad humanam conferre oportet. Quòd enim pelliculæ ex vmbilico tentæ sunt, & reliqua, quæ de puero dicta sunt, sic se habere in ouo volucris reperi es, ab initio in finem, atq; si quis nondum vidit, mirabitur in volucris ouo vmbilicum inesse, atq; hæc sic habent, & sic à me relata sunt,

Plinij sententia.

Plinius lib: decimo capite 53. de tempore & generatione incubatus auium his verbis scri bit, A coitu decem diebus oua maturefcunt in vtero, vexatæ autem gallinæ & columbæ penna euulsa, aliæque sumili iniuria, diutius, Omnibus ouis medio vitelli parua inest velut sanguinea gut tula, quod esse cor auium existimant, primum in omni corpore id gigni opinantes. In ouo cer ta est gutta, ea salit palpitatq; ipsum animal ex albo liquore ouī corporatur. cibus eius in luteo est, omnibus intus caput maius toto corpore, Oculi compressi capite maiores, Increfcente pul lo, candor in medium vertitur, luteum circumfunditur, Vicefimo die, si moueatur ouum, iam viuētis intra putamen vox auditur, Ab eodem tempore plumescit, ita positus, vt caput supra dextrum pedem habeat, dexteram vero alam supra caput, Vitellus paulatim deficit. Aues om nes in pedes nascuntur, contrà quàm reliqua animalia.

Aristoteles lib: de hīstor: animalium lib: sexto capite secundo sic inquit, Semen geni tale volucrum omnium album, vt cæterorum animalium est. concipit fœmina, quæ coierit, ouum superius ad septum transuersum: quod ouum primò minutum & candidum cernitur mox rubrum cruentumq; deinde increfcens, luteum & flauum efficitur totum, Iam amplius au ctum discernitur, ita vt intus pars lutea sit, foris candida ambiat, vbi perfectum est, absoluitur, atque exit putamine, dum paritur, molli, sed protinus durefcente, quibuscunq; emergit por tionibus, nisi vitio vuluæ defecerit. Iam quale certo tempore est, tale aliquando prodijt lute um totum, qualis postea pullus est. Gallina etiam discissa, talia sub septo, quo loco fœminis oua adherent, reperta sunt, colore luteo tota magnitudine ouī perfecti: quod pro offento augu res capi

res capiunt, Nec audiendi sunt, qui oua hypenemia dicta à vento, quasi subuenta nea dixeris, reliquias esse partus, quem coitus fecerit, arbitrantur. Iam enim aliquas gallinarum & anserum iuencas, expertes adhuc coitus parere hypenemia visum sapius est. Sunt hæc sterilia & minora, ac minus iucundi saporis, & magis humida, quàm ea, quæ fecunda gignuntur, sed plura numero: humor eorum crassescere incubatione auis non potest, sed tam candida, quàm lutea pars similis sibi perseverat, & c.

Paulo inferius Ovi generatio ab initu, & pulli rursus ovo concocto prouentus, non pari temporis spatio euenit omnibus: sed pro magnitudine generantis interest. Ouum gallinæ consistit à coitu & perficitur decem diebus magna ex parte, columbæ paucioribus. generatio verò ex ovo omnibus volucribus euenit, modo quidem eodem, sed tempora differunt. Capite tertio eiusdem libri his verbis de generatione pulli in ovo, & eius creationis ordine scribit, Gallinis porro tertia die ac nocte postquam capere incubare, indicium præstare incipiunt. At maiorum auium generi plus prætereatur temporis necesse est: minori autem minus sufficit. Effertur per id tempus luteus humor ad cacumen, quæ principium oui est: atque ouum detegitur ea parte, & cor quasi punctum sanguineum in candido liquore consistit: quod punctum salit iam & mouetur ut animal. Tendunt ex eo meatus venales sanguigeri duo tortuosi ad tunicam ambientem vtramque dum augetur. Membrana etiam fibris distincta sanguineis, iam album liquorem per id tempus circumdat, à meatibus illis venarum oriens. Paulo autem post, & corpus iam pulli discernitur, exiguum admodum primum & candidum, conspicuum capite, & maxime oculis inflatis, quibus ita permanet diu: serò enim decrescunt oculi, & se ad ratam contrahunt proportionem. pars autem inferior corporis, nullo membro à superiore distinguere inter initia cernitur. Meatuum quos ex corde tendere diximus, alter ad ambiendum album liquorem fertur, alter ad luteum velut vmbilicus. Origo itaque pulli in albumine est, cibus per vmbilicum ex luteo petitur. Die iam decimo pullus totus conspicuus est, & membrana omnia patent, caput grandius toto corpore est, oculi capite grandiores hærent: quippe qui fabis maiores per id tempus emineant nigri, nondum cum pupilla, quibus si cutim detrahas, nihil solidi videris, sed humorem candidum rigidumque admodum refulgentem ad lucem, nec quicquam aliud, ita oculi et caput. Iam verò & viscera eo tempore patent, & alui intestinorumque natura perspicua est. Venæ etiam illæ à corde proficiscentes, iam iuxta vmbilicum sese constituunt. Ab ipso autem vmbilico vena oritur duplex: altera tendens ad membranam ambientem vitellum, qui eo tempore humet, & largior, quàm secundum naturam est: altera permeans ad membranam ambientem eam, quæ pullus operitur, & eam, quæ vitellum humoremque interiectum continet, dum enim pullus paulatim increfcit, vitellus seorsum in duas partes secatur: quarum altera locum tenet superiorem, altera interiorem, & medius humor candidus continetur, nec partem inferiorem à vitello liquor deferit albus, qualis ante habebatur. Decimo die albumen exiguum iam, & lentum, crassum, pallidulum nouissimè inest. Sunt autem quæque locata hoc ordine, prima postremaque ad testam oui membrana posita est, non testæ ipsius natia, sed altera illi subiecta, liquor in ea candidus est. deinde pullus continetur obuolutus membrana, ne in humore maneat, mox pullo vitellus subiacet, in quem alteram ex venis proripere dictum est, cum altera albumen ambiens petat. Cuncta autem ambit membrana cum humore, specie sanici. tum verò membrana alia circa ipsum foetum, ut dictum est, ducitur, arcens humorem, sub qua vitellus, alia obuolutus membrana. in quem vmbilicus à corde, ac vena maiore oriens pertinet: atque ita efficitur, ne foetus alterutro humore attingatur. Vicesimo die iam pullus, si quis putamine secto sollicitet, mouet intus sese pipitque aliquantulum: & iam ab eodem die plumescit, quoties vltra vicesimum excusio protelatur, ita positus est, ut caput super crus dextrum adnotumilibus, alam super caput positam habeat. quin etiam membrana, quæ pro secundis habetur, post vltimam testæ membranam, ad quam alter vmbilicus pertendit, euident per id tempus est pullusque in eadem iam totus locatur, & altera quoque membrana, quæ & ipsa vicem secundarum præstat vitellumque ambit, ad quem alter vmbilicus procedit, latius patet, oritur autem vmbilicus uterque à corde, & vena maiore, ut dictum est, fit autem per id tempus, ut vmbilicus alter, qui in secundas exteriores fertur, compresso iam animante absoluitur: alter, qui adit vitellum, ad pulli tenue intestinum annectatur. Iam & pullum ipsum multum humoris lutei subit: atque in eius aluo facis aliquid, subsidit luteum: excrementum etiam album eodem tempore pullus emittit, & in aluo quiddam album consistit. Demum vitellus paulatim absumitur totus membrorum haustu, ita ut si decima die post excluso rescindas aluum, nonnulli adhuc vitelli comperias. Vmbilico vero ab

ro absoluitur pullus, nec quicquid præterea haurit, totus enim humor, qui medio continebatur, assumptus iam est. Tempore autem supradicto pullus dormit quidem, sed non perpetuo, quippe qui excitetur interdum, & mouens sese respiciat, atque pipiat. Cor etiam eius, cum umbilico, ut spirantis reflat, & palpitat. Sed auium ortus ad hunc modum ex ovo agitur. pariunt autem oua nonnulla infœcunda, vel ex ijs ipsis, quæ conceperint coitu, nullus enim prouenit fœtus, quamuis in cubitu foueantur, quod maxime in columbis notatum est. oua gemina binis constant vitellis: qui ne inuicem confundantur, facit in nonnullis prætenue quoddam septum albuminis medium, alijs vitelli contactu mutuo sine villo discrimine iunguntur. Sunt in genere gallinarum, quæ pariant gemina omnia, in quibus animaduersum est, quod de vitello exposui. quædam enim duodeuiginti peperit gemina exclusitque, præterquam, si qua essent (ut fit) irrita. Cæteris itaque fœtus prodijt: sed ita gemini excluduntur, ut alter sit maior, alter minor: et tandem in monstrum degeneret, quod minor nouissimè prouenit.

Aristoteles de generatione animalium lib: 3. capite 2. quod inscribitur de ortu eorum, quæ perfectis ouis foras generantur &c. ita scribit. Secernitur in ouo principium genitale maris ea parte, qua ouum vtero adhæret, sitque proinde dissimile, quod bicolor est: nec plane rotundum, sed altera parte acutius, quoniã partem eam differre oportet, in qua principium illud continetur, quamobrem durius ea ipsa parte est ouum, quam inferiore. principium enim operiendum custodiendumque est. Exit etiam pars oui acuta post, quod enim adheret, id exire postea conuenit. adhæret autem ea parte, qua principium continetur, & principium ipsum in parte acuta est. Idem in plantarum etiam seminibus modus est. Principium enim seminis adhæret aut ramo, aut putmini, aut pulpæ: ut in legumine patet, quã enim biualuis fubarum strues, & cæterorum id genus coniungitur, hac principium seminis adhæret. Sed quæras de incremento ouorum, quonam modo ex vtero veniat, animalia enim per umbilicum capiunt cibum: oua autem quomodo cum non modo vermium, ipsa per se recipiant incrementum. At si quid est, quo adhærent, id quonam transcat perfecto iam ouo? nihil enim tale exit cum ouo, ut umbilicus cum animali. Quod enim circiter ambit, testa perfecto iam ouo efficitur. recte igitur hoc ita quaeritur. sed latet primò membranam mollem id esse, quod postremo testa efficitur. perfecto enim ouo, durum ac rigidum euadit ita modicè, ut exeat adhuc molle. dolorem enim moueret, nisi ita exiret, egressum statim refrigeratum duratur, euaporato humore quàm primum, qui exiguus inest relictaque portione terrena. Huius itaque membranæ particula quædam umbilicaris parte acuta principio continetur tenditque paruis adhuc veluti fistula, quod in eiectionis inchoatis ouis patet, nam si auis madefacta, aut alia causa inalgescens eiecit, cruentus adhuc cernitur conceptus habensque sibi annexam appendiculam umbilicarem, quæ ouo amplius in crescente obtenditur latius, atque minuitur, perfectoque micro exitum complet: membrana interior sub hoc umbilico est, quæ vitellum albumenque ab eo determinat. Vbi iam ad consummationem ventum est, ouum absoluitur totum, & umbilicus ratione non insuper apparet. extremum enim, vltimum eius est. Partus ouorum contra atque animalium euenit. animal enim versum in caput suumque principium, nascitur, at ouum quasi in pedes conuersum exit. cuius rei causa quod diximus est, quod ouum ea parte, qua principium continetur, adhæret. Generatio auium ex ouo ita euenit, ut incubante & concoquente aue, animal ex parte oui secernatur, augeatur ex reliqua parte, & conficiatur. natura enim simul & materiam animalis in ouo reponit, & satis cibi ad incrementum. Cum enim auis intra se perficere nequeat, cibum vna parit in ouo. non ijs quæ forma animalis nascuntur, cibis in alia parte paratur, quod lac vocatur, videlicet in mammis. At auibus hoc idem in ouo natura constituit, sed contrà, quàm homines putant, & Alcmaeon Crotoniæ ait, non enim oui albumen lac est, sed vitellum, hoc enim pullis pro cibo est: illi albumen pro cibo esse existimant, propter coloris affinitatem Paulo post, iam naturam quoque contrariam luteum & candidum habent. luteum namque gelu duratur & coit, calore contra humescit, quapropter cum vel in terra, vel per incubitum concoquitur, humescit. atque ita pro cibo animalibus inascentibus est. Nec verò cum igitur assatur durefcit quoniã naturæ terrenæ est, ut cæra. Ideoque cum plus iusto calefcunt, nisi ex recremento humido sint, saniescunt, redduntur vrina. At candidum gelu non concrefcit, sed magis humescit, causam ante reddidi, igitum solidescit: quamobrem cum ad generationem animalium concoquitur, crassefcit, ex hoc consistit animal. luteum autem pro cibo est, & membris subinde instituendis incrementum hinc administratur. quocirca luteum & candidum membranis inter se distinguuntur, quasi naturam habeant diuersam, de his dicit se latius in alijs locis scripsisse, pergit hoc modo.

modo, Principio corde constituto, & vena maiore ab eo distincta, vmbilici duo de vena eadem pertendunt, alter ad membranam, quæ luteum continet, alter ad membranam, cui secundarum species est, quæ animal obuolutum continetur, quæ circa testæ membranam est. Altero igitur vmbilico cibum ex luteo sumit, efficitur luteum copiosius, quippe quod calefscens reddatur humidius. cibum enim quoniam corpulentus est, humidum esse oportet, qualis plantæ suppeditatur: viuunt autem principio, & quæ in ouis, & quæ in animalibus gignuntur vita plantæ, adhærendo enim capiunt primum & incrementum & alimentum. Alter vmbilicus ad secundas tendit: ita enim in ijs, quæ ouo nascuntur animalibus, pullum vti luteo existimandum, vt fœtus viuiparus sua parente vtitur, quam diu intra parentem continetur. Cum enim non intra parentem nutriantur, quæ ouo proueniunt, partem eius accipiunt aliquam habentq; secum in cibo. Membrana verò exteriore nouissima sanguinolenta hæc perinde, vt illa vtero, vtuntur. Simul autem & luteum & secundas testa oui complectitur vteri proportionem, perinde quasi quid vnum obductum amplectatur fœtum, parentemq; totam, quod ita est, quoniam fœtum esse in vtero, et cum parente necesse est. Itaq; in viuiparis vterus in pariete est, in ouipares è diuerso fit, quæ si dixeris parentem esse in vtero, luteum enim est cibus, qui à parente præstatur. Causa est, quod fœtus nutritio non intra parentem est. Crescentibus vmbilicus primum confidet, qui secundis adiungitur. hæc enim pullum excludi conuenit, reliquum lutei, & vmbilicus ad luteum pertinens, post collabitur, cibum, n. habeat statim oportet, quod exclusum est, nec enim à parente nutritur, & per seipsum statim capere cibum non potest, quapropter luteum subit cum vmbilico & caro ad nascitur. Talis ortus eorum est, quæ ex ouis perfectis foris generantur, tum in auibus, tum in quadrupedibus, quæ ouum crusta intectum dura pariunt, Sed hæc euidentiora in auctioribus sunt animalibus, nam in minoribus obscura præ sua exiguitate habentur. hæc sunt Aristo: verba desumpta ex interpretatione siue versione Theodori Gaza.

FINIS.

OSSA omnia ita conti-
gua sunt, ut nullum (ni-
si fortassis os vocetur, & os in
cordis basi consistens) seorsim
per se habeatur, sed aut pars
continui sit, aut aliud os con-
tingat, alteriq; annexetur, ad
deum, ut sagax rerum parens
naturae, tanquam uno con-
tinuoq; osse, pluribus ossibus
ad varios usus hominem uti
uoluerit. Hanc porro mutuam
ossium coherentiam Graeci οκε-
λετος uocant, quasi asseca-
tum cadauer diceres: Vox
enim ista οκετος οκετος
ta est, id est, ab exiccatione &
attenuatione. Et qui de ossibus
differuerunt, libros suos alij
περι οκελετου inscripserunt:
alij περι οστεολογιας. οκε-
λετος autem secundum Gale-
num est omnium humani cor-
poris ossium inuicem commi-
ssorum uniuersa compositio.
Nam οκελετος proprie arti-
culum cadauer & exiccatum
corpus significat: Osteologia
uero ossium explicationem. In
hoc autem nostro instituto ne-
gocii duo agemus, quorum al-
terum pertinet ad

Prolegomena,
id est, obscuras
rum uocum, quae
auditorē in his-
toria ossium re-
morari pote-
rant, explica-
tionē. Hae rur-
sus duo sub se
complectitur,
quorum

Primum ha-
bet nomina
partium et
locorum siue
sedum ossi-
um ex quibus

Partes dicuntur
illa omnia, quae
extra simpli-
cem planamq;
superficiem de-
liqua sui sede
extuberant, ita
ut id, quod ex-
tuberat, uel

Sedes siue loca
νοτολαε νο-
minantur, a ue-
teri uasis &
mensurae gene-
re, quod cas-
uum erat. Om-
nem uero cavi-
tatem partium
nostri corporis
uocamus νοτος
Αλυ. Quare et
iam ad ossa et
uolam manus
transfertur. Hip-
pocrates om-
nes tales cavi-
tates nomine
speciei βολα-
μιδας uoca-
uit. Hisce in lo-
cis processus et
appendices ex-
cipiuntur. Se-
des autem hae
sunt uel

Secundum, de quo uide in se-
quente pagina, signo lites-
ra C.

Ossa ipsa, de quibus post prolegomena dicitur.

Ossa siue pars, &
nihil a suo osse
differat: ideoq;
αποφύσις uoca-
tur, ab αφεσις φύ-
σις, tanq; ab alio
quo natum: Graeci
etiam dicunt
ἐκ φύσεως ὀστέον
ὀστέον, id est, ex-
crescentiam siue
eminentiam: in-
terpretes appel-
lant processum,
excessum, expla-
tationem, addita-
mentum, &c. Nos
semper processum
nominabimus, id
q; recte. Nā pars
gibbi aut tuber-
culi instar, ex os-
se procedit, ut ex
arboris trunco
rami.

Os alij ossi annex-
tum sit, & pecu-
liarem obtineat
circumscriptionem
neq; illius ossis,
cui committitur,
uera portio sit:
ideoq; Graeci ἐπι-
φύσις, Lat: ap-
pendix, addita-
mentum, appla-
tatio, annexum uo-
catur. Nos sem-
per appendicem
dicemus

Profundae, ita, ut altē ac profundē processus
siue appendices excipere possint, & tunc di-
cuntur, Graeci νοτολαε καὶ ὀφύβηφα, Lat:
acetabula, uulgo acceptabula, pyxides, inter-
dum Buccillae.

Ad eo obscure & ambiguae, ut dubium sit, an
sinuum numero ueniant ascribenda: ita enim
leuiter & superficiei tenus cauae occurrunt,
ut dubites, an aliud os admittant, an aliud
ipse subeant, non secus quam duo aseres pla-
ni ac leuigati, si alter alteri imponatur. Sic
igitur depressis capitibus, quae κόρυμβοι seu
cotyledones uocantur, respondent. Dicuntur
autem superficiei cauitates, Graeci γλῶναι
καὶ γλῶνοειδῆς, ab ocularium sinuum for-
ma: nos semper uocabimus superficiei os-
sum cauitates.

Tales, ut basis fundamentiq; ritu obstant, ne ossa ulterius, quam
par est, moueantur: dicunt Graeci βολαμιδας, Lat: summae exten-
sionis termini, ut in humeri osse. Hippo: uocat in cubito βολαμιδας
duas sedes quasdam, in quas lacerti processus insident.

Capitis, et
uocatur G.
κεφαλή
καφαλιον
Lat: caput:
proprie au-
tem promi-
nentia dici-
tur, quae
manifestū
ostendit tu-
ber, & in
medio ma-
gis, quam a
lateribus e-
minet &
Protuberat:
caput autē
istiusmodi
duplex est.
Aut. n. est.

Virūq; au-
tem uariat
pro ratio-
ne formae,
quae ipsi in-
ditur: aut
enim for-
ma refert.

Cervicis,
uidelicet
humanae,
quia in ac-
utum des-
init, idq;
dupliciter.
Si enim

Prominens, quod
cervice praeditum,
ab ea ad uerticem
pertingit, et caput
uocatur.

Depressum, ceruicē
ce carens, quod ita
obscurum tubere gib-
bōne praeditū est,
ut an caput, an sta-
mus uocari debeat,
non satis constet.
Graeci κόρυμβος uo-
catur, id est, obscu-
rum tuber. Hinc
κόρυμβος etiam
nodus, gibberus,
capitulum, artuum
caput est.

In caput crassum
& corpus rotunda-
tum tenui eminē-
tia protuberat, Graeci
ἀνύψ, Lat: ceruix
collū dicitur. Quā-
quam ceruix etiam
uocatur angustia
siue gracillitas ana-
te processum latius
orem, qui sinū con-
stituit, cui aliud os
coarctatur, sicut in
scapula uidere est,
ubi humerus sca-
pulae maticula-
tur.

In sinem seu mucro-
nem acutum termi-
natur, Graeci κορυ-
νη seu κορυμβος et
κορυβίς: Lat: co-
rona: a quibusdam
etiā cornix, simile
tudine sumpta uel
a rostro cornicis,
uel a cornu arcus,
cuius summitas in-
cisa neruū recipi-
ens κορυβίς dicitur,
appellatur. ad
pophyses rotundae
et curuae etiā alij
quando coronae di-
ctae sunt a Galeno,
Sic & ancroideum
processum, et cur-
uum instar C. lite-
rae cubiti ambitū.

TABVLAE OSSIVM.

C. Secundum, quod continet nomina stru-
cturae et contextus hu-
mani corporis. Ossium
vero mutua composi-
tio vocatur Graecis: σύν-
ταξις, σύνθεσις, σύν-
θεσις, σύνταξις: item
ἀρθροποιήσις, id est, compages seu
articulatio: Graeci ge-
neraliori uocabulo
συνβολήσις. Compos-
nuntur autem ossa, uel

Cum motu, et uo-
catur Graecis: ἀρθρο-
ποιήσις, id est,
commissura ad
motum parata:
ab Hippoc: ali-
quando ἀρθρο-
ποιήσις, quasi
ab articulatione.
Est autem ea os-
sium connexio ita
laxa, ut facilem
motum praestet,
qui quidem mo-
tus est uel

Manifestus et euident,
qui proprie uocatur
ἀρθροποιήσις. Haec 3.
species sub se continet
a coniunctionis modo
sumetas, quarum

Obscurus et obserua-
ta difficilis, qui nomi-
ne proprio caret, et
sub se comprehendit,
ἀρθροποιήσις, quae (ut
modo diximus) cau-
leuiter exemplum et
caput quoque, depre-
sum habet, facta uelut
in planarum superfi-
ciem connexu.

Prima uocatur ἐνάρθρω-
σις, quasi inarticulatio,
in qua cavitates articulum
excipiens admodum pro-
funda est, capitque quod in
eam inferitur, oblongum
et extuberans.

Secunda ἀρθροποιήσις, in
qua ossis cavitates articuli
excipiens superficialia est,
capitque, quod in eam in-
feritur, humile atque de-
pressum.

Tertia γύγλυμος, id est
mutua insertionis com-
missura, ut in iunctura cu-
biti et lacerti per quam
ossa sese inuicem ingredi-
entia ita coniunguntur, ut
unius caput in alterius ca-
uitatem condatur, et ui-
cium huius caput in illius
sinum excipitur.
His autem tribus specie-
bus Fall: unam adiecit,
quae fit in formam rotae
axis, unde τροχοειδής
uocatur.

Omnes autem
haec ossium com-
missurae fi-
unt, aut

Aliquo in-
tercedente
medio, unde
de nomina
consequen-
tur. Inter-
cedit enim
uel

Caro, unde os
οστέον οἰσις.
Cartilago, unde
συνχόνδρος οἰ-
σις, quod carti-
lago colliget
duo ossa inui-
cem.
Ligamentum,
quoniam sub ge-
nere neruorum
comprehendi-
tur, unde σν-
ρίον οἰσις.

uocatur.

Nullius corporis interuentu, ut in mol-
lioribus ossibus. Duriora enim ossa
aliquo intercedente medio coniungun-
tur, aut per mutuam quandam ingres-
sionem, ut in ferratis ossium compagi-
bus.

Sine motu, et uocatur Graecis: σύν-
αρθροποιήσις, latino uocabulo caret: quae natu-
ralis ossium unio est, et apud Hippoc: σύν-
θεσις uocatur. Continet autem sub se
multas species a forma coniunctionis
sumptas, quarum

Prima uocatur Graecis: γόμφωσις, cum os ossi clauis modo insigatur, ut in dentibus.
Lat: fixura.

Secunda uocatur ῥαφή, id est, sutura, quae rebus consutis similis est.

Tertia uocatur ἀρμονία, Lat: harmonia, atque ossium compositio secundum lineam
simplicem et rectam, non autem ut in iuntura, anfractuosa, ossa coniungens.

Quarta Graecis: σύμφωσις, quae Lat: naturalis ossium unio dicitur et coalitio:
quam tamen uocem Hippoc: frequentissime ad articulos manifestos transferri: Lat:
coagmentatio.

His 4. Fallop:
adiecit alias du-
as, nempe
περιβεβημένη, quae nihil aliud est, quam ferratilis quaedam ossium
compositio, qualis in capite reperitur, in qua nimirum reperit-
tur forma duarumerrarum inuicem suis spiculis iunctarum.
Σύνταξις ἐν δυνάμει, id est, commissuram ad formam duorum
unguium.

Potest etiam adieci coarticulatio ex harmonia et ferratili com-
posita, qualis fit in appendicum articulatione.

Sunt et aliae uoces, quae cum
praecedenti tabulae includi non
possent, eas hic tradere decre-
ui. Harum quaedam

Ad processus pertinent, sed non osseos, uerum ligamentosos, qui sinuum
profunditates augent, quo ossa his immixta firmiter contineri possint, et
ne prompte laxentur. Processus hi labrorum instar prominentes pro uar-
ia figura uaria consequuntur nomina. Horum enim quidam, quod si-
miles sunt

Circumferentis rotarum, in
quibus radij insiguntur et as-
xis agitur, et tues

Oculorum supercilij δφθάλμοις

uocatur.


Orificij collarum, ἀμφοτε-
ρα

Labris buccarum, χείλη

Ad nullum dictorum spectant, et sunt numero duo

ῥαφαί Lat: membra seu artus: sunt in homine longiora maio-
raque membra, a thorace separata, et quasi dependentia, ut bra-
chia et pedes.

ἀρθρα, quae Graecis: primum uocantur naturales ossium coniunctio-
nes, ad motum comparatas. Hippoc: uocauit ossis capita, sine ossis
processus, qui in alterius ossis cavitatem inferuntur,



Si hæc omnia ossa in uniuersum contraxeris, inuenies ossa numero 307: Si uero his quædam adimere uelis, quia in corporibus uariatur nonnullus numerus facile possis: Sim adijcere, idem possis. Vesalius in adultis plerunq; inuenit 304. Fuch: 303: Gal: 307. Si autem priuatim omnes appendices (ossa enim propria circumscriptione in pueris sunt terminata) enumerare libuerit, facile numerum semel & dimidio duplicabis. Si uero ossa, ut in pueris uidentur, subdlexeris, infinitum acerrimum cumulabis, adeo ut cuiuslibet arbitrato ossium numerum constringere liceat.

TABVLAE OSSIVM.

Figura, quæ optima est, id est, secundum naturam se habens, si imitetur Sphæram exactè rotundam, sed quæ paulatim utrinque iuxta tempora comprimatur arctiorque fiat. Homero Theriis Quædæ κεφαλή dicitur, quod figuram capituli præter naturam habuerit, quæ nec anteriore nec posteriore parte eminerit, id est, acuminatam: quales quidam omnes Quædæ, item δὲ κεφαλή uocant.

Caluarie interior cavitatis, quæ Græcè κῆτος καὶ ἐνὶ κρατίονι uocatur.

2. a { Squamosa, quæ infra & supra existit, complectens in medio substantiam spongiosam. Hæc substantia ab Arab: nomen acquirit tabule: Quidam laminas uocant: uocant etiam internam vitream.

2. b { Spongiosa & rara, in medio utriusque laminae existens, uocatur à Russ: σπινθώδης, Lat: medullillium. Hipp: uocat carunculam.

Media pars, quæ nonnihil deprimitur, uocatur μεσότης καὶ ἐνὶ κρατίονι.

Nunc aggrediemur particulatim omnia ossa. Attingemus autem partes, quæ priuatim propria apud Anatomie scriptores nomina habent, et primum quidem caput, quod apud Græcos κεφαλή καὶ ὤψος ἢ ὤψην uocatur. Pollux inquit caput à ποῖτις καλεῖται, appellari, quasi πᾶν ἄνω, id est, papaueris caput. Est enim caput totum id, quod collo superimpositum est. Diuiditur uero in duas partes, uidelicet

Cranium, quod & ad capituli significationem aliquando transfertur: id Græcè καράγιον uocatur, à galea similitudine, καράγιον enim galea est Lat: caluaria, quia pilis in se necitate priuatur: Vocatur etiam calua cerebri galea. Sunt autem in caluarie quædam consideranda, uidelicet

Suture, quæ ῥαφῆαι uocantur, à similitudine uestium consutarum: hisce etiam subiiciunt compositiones factas in modum unguium: uocantur à quibusdam etiam commissura: Plinius compages appellat: Celsus uocem Græcā explicans suturas nominat. dici possunt complosa uel commissura, quæ sunt duplices

Foramina, quæ omnia dicit Russus nomine uacare, duobus exceptis, quæ cœca dicuntur, quod non in reseratum excavata sint. Quæ tamen illa sint, ignoratur. de foraminibus separatim

Maxillæ utræque, superiorem et inferiorem, de quibus tabula notata littera D.

Veræ, quæ iudicantur partim forma, partim etiam communitate, quam cum solis cranij ossibus habent: tales sunt numero tres, quibus ut omnibus alijs suturis, ab Aegyptijs medicis propria nomina sunt indita: harum autem

Prima, quæ os frontis separat à uicinis partibus, uocatur

Secunda quæ à medio ossis frontis incipiens ossa bregmatica intersecat, uocatur

Tertia quæ propriè est ossis occipitis, hæc uocatur

3. A. Græcè σφαγιώδης, id est, coronalis, sic dicta, quod ea capituli parte coronæ gestari soleant: ab Arabum interpretibus arcuatis, puppis et sutura dicitur.

Græcè apud Russum ἐπί σφαγιώδης καὶ ἐπὶ βρεγμῶδης, quia uerū, aut sagittæ, aut uirgæ instar recta incedit, Lat: Sagittalis dicitur: à Mos: arcu deck, uirgata: & à quibusdam nervosa idque personis ubi hæc coronali committitur.

3. B. Græcè à litteræ λ similitudine λαμβάνειν, et à litteræ υ figura λαμβάνειν, Lat: lambda, sutura, ab alijs laudæ et prore sutura.

4. D

Mendose, quæ ueram formam suturarum non obinent, & tamen ad suturas referuntur. Hæc due sunt, & temporum ossibus familiares: uocantur Græcè λεπίσσοειδῆ καὶ ἡμερομήμετρα, id est, agglutinamenta squamosa: Latine suturæ temporales, squami formes, corticales, et mendose. Sunt itaque 5. suturæ ad summum, quæ ad cranium pertinent: ab alijs anatomicis plures recensentur, sed communes sunt maxillæ, nominibus proprijs carent.

Ossa ipsa, quæ numero sunt 8. quorū alia

Propria sunt caluarie, numero 6, Impropria & maxillæ superiori communia numero 2.

de quibus omnibus seorsum tabula sequente.

Primum frontem constituit. Totum hoc os, os $\mu\epsilon\tau\alpha\ \tau\omicron\nu$ dicitur, ab Arab: coronale, os puppis, os innerecundum, os sensus communis, Lat: os frontis.
Pars in pueris recenter natis membrana testia pulsans, ubi sagittalis sutura cum coronali coniungitur, ab Arab: Tendib, ab alijs fontanella uocatur.

Secundum & tertium sunt illa ossa, quae a uertice ad temporum ossa protenduntur, dicta ossa $\beta\epsilon\gamma\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$, quia cerebrum sub ipsis humidissimum & molissimum existit, Lat: ossa Sincipitis, quibusdam uerticis ossa, uerualia paria, arcualia, paries talia, ossa rationis seu cogitationis.

Quartum est posterum in cranio, Graec: $\iota\nu\omicron\pi$, dictum a nervo, qui ab illo osse incipit et in colum descendit: Lat: os occipitis, a quibusdam os basilare, ab Arab: os prore, os memoriae, os pyxididis. Processus autem duo, quibus insidet hoc os primae vertebrae, dicuntur $\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\omicron\varsigma\ \kappa\omicron\epsilon\upsilon\alpha\tau$, id est, claviculi capitis.

Propria, quae nullam communem tatem cum superiore maxilla habent: haec sunt numero 6, quorum

1. N. 2. III. Quintum et sexum tempora constituentia uocantur $\delta\epsilon\sigma\iota\ \eta\epsilon\omicron\tau\alpha\ \phi\omega\pi$, $\kappa\omicron\epsilon\phi\alpha\ \sigma\omega\pi$, $\kappa\omicron\epsilon\phi\alpha\ \sigma\omega\pi$. Item $\lambda\iota\theta\omicron\epsilon\delta\iota\varsigma$, id est, petrosa: Lat: ossa temporaria, et lapidosa scilicet ob firmitatem: item squamiformia, quia instar squamarum coniunguntur cum ossibus sincipitis: denique mendosa, quia imperfecta sutura donantur, parietalia, dura armataque dicuntur. Haec autem ossa, est unica sunt, tamen diuersas obtinent partes. Diuiduntur enim in partem tendentem

His proprijs ossibus cranij numerum est adijciendum, quod peculiarem descriptionem non obtinet: Attamen propria consequitur nomina. Id ipsum fit a processu ossis temporalis et maxillae processu, uocaturque $\chi\upsilon\gamma\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$, $\chi\upsilon\gamma\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$, $\chi\upsilon\gamma\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$, Lat: os iugale, os arcuale, anfra temporum.

1. 1. Ab auditorio meatu sursum quae uocatur proprie os temporale & squamiforme. Na instar squamiae extenuatur.

2. 1. 2. Ab auditorio meatu deorsum quae quia prae rupte rupi similis est, $\lambda\iota\theta\omicron\epsilon\delta\iota\varsigma$ uocatur, Lat: petrosa, siue lapidosa: atque rursus diuiditur in partem

1. 2. 2. Ab auditorio meatu deorsum quae quia prae rupte rupi similis est, $\lambda\iota\theta\omicron\epsilon\delta\iota\varsigma$ uocatur, Lat: petrosa, siue lapidosa: atque rursus diuiditur in partem

1. 2. 2. Ab auditorio meatu deorsum quae quia prae rupte rupi similis est, $\lambda\iota\theta\omicron\epsilon\delta\iota\varsigma$ uocatur, Lat: petrosa, siue lapidosa: atque rursus diuiditur in partem

1. 2. 2. Ab auditorio meatu deorsum quae quia prae rupte rupi similis est, $\lambda\iota\theta\omicron\epsilon\delta\iota\varsigma$ uocatur, Lat: petrosa, siue lapidosa: atque rursus diuiditur in partem

Primus extremus est, per quem sonus ingreditur, et uocatur $\omega\delta\omicron\varsigma\ \epsilon\kappa\omicron\upsilon\sigma\iota\kappa\omicron\varsigma$, Lat: meatus auditorius.

2. 1. 2. Internam, quae etiam consequitur nomen ossis, uel processus petrosi, ob insignem duritiam, sed quia auditui inferuit, nos ea appellabimus auditus sedem: uocatur & uocabulo communi cum externa aure auri, item quia obliquum ductum habet, $\sigma\kappa\omicron\lambda\iota\delta\epsilon\varsigma\ \omega\delta\omicron\varsigma\ \eta\iota\varsigma\ \epsilon\kappa\omicron\upsilon\sigma\iota\kappa\omicron\varsigma$. In hac parte meatus & considerandi sunt quorum

Secundus post myringam ab Aristotele uocatur cochlea, a recetioribus Tympanum, ab Eustachio cochlea & anthira, a Fallopio: antrum, a Vesalio: peluis: reperitur in hoc

Tertius labyrinthus a Fallopio: antrum fidei narum a Vesalio.

Quartus cochlea a forma cochleae, a Vesalio buccinosum antrum, ab alijs ceca cavitatis dicitur.

Præter hos 4 meatus est & osseus canalis qui a quibusdam cecus meatus, et cochleae aris meatus, caprolaris meatus, a Fallopio: aquae ductus nominatur.

Oscula tria utpote

Duo fenestrae uocantur a Fallopio, harum altera a Vesalio anterioris foramen dicitur, & a Fallopio ab ovali figura ovalis. Altera fenestra, a Vesalio posterius foramen uocatur.

Musculus unus uel ut Vesalius rotunda et oblonga glandula.

Tuberculum inter utrumque fenestram positum, de labyrinthus et superiori sedi cochleae prodeit.

Meatus a secunda cavitatis in palatum deflens.

Meatus a secunda cavitatis in palatum deflens.

Incus a figura. Malleus ab usu et forma. Stapes a forma.

Duo fenestrae uocantur a Fallopio, harum altera a Vesalio anterioris foramen dicitur, & a Fallopio ab ovali figura ovalis. Altera fenestra, a Vesalio posterius foramen uocatur.

Musculus unus uel ut Vesalius rotunda et oblonga glandula. Tuberculum inter utrumque fenestram positum, de labyrinthus et superiori sedi cochleae prodeit.

Meatus a secunda cavitatis in palatum deflens.

Meatus a secunda cavitatis in palatum deflens.

1. 2. P. P. Primum uocatur Graec: $\sigma\phi\eta\upsilon\omicron\epsilon\delta\iota\varsigma$, id est, cuneiforme & $\pi\omicron\lambda\upsilon\mu\omicron\phi\omicron\upsilon$, id est, multisforme: Vulgo Sphimoides, Lat: cuneiforme, os basilare, quia in basi est. Ab Arabum interpretibus paxillare, paxilla, os colatorij et cauilla, os cribratum. Habet autem diuersas partes, quarum quaedam propria consequuntur nomina. Ex illis igitur

Impropria sunt duo quorum

2. ff. Secundum est os, quod ad summam nasi radicem intus fixum haeret tenue, uocatum Graec a Galeno & Hipp: $\sigma\pi\omicron\gamma\gamma\omicron\epsilon\delta\iota\varsigma$, id est, spongiosum, ob partem spongiosam in naribus contentam, a quo $\delta\epsilon\varsigma$, id est, cribri forme, quia pertusum est cribri modo: Latine colatorium ab officio: uulgo os lithmoide. Hoc partes tres obtinet, quarum

1. 2. P. 2. Prima pars est basis ossis, & glandulam pituitam excipientem continet, a forma quam cum sella equina habet, hanc Fallopio: uocat sellam. Haec sella intus cerebrum spectat, illique respondent duae cavitates palatum respicientes, quae antra dicuntur.

2. 2. Secunda pars nomine caret, & destinata est nervis uisorijs.

1. 2. P. 1. Tertia & quarta a lateribus selle adhaerent, & foris ad maxillam superiorem constituent utrinque processum, qui cum alarum instar prominent, Graec: $\eta\epsilon\gamma\upsilon\omicron\delta\iota\varsigma$ uel $\eta\epsilon\gamma\upsilon\omicron\delta\iota\varsigma$, id est, alaris dicitur quia alarum similis est, quales uespertilio habent.

Prima intus latet & cribri modo perforata est, unde cribri formes dicitur.

2. a Secunda diuidit duas partes cribri, unde septum uocatur.

Tertia in narium cavitatibus est & uocatur os spongiosum.

TABVLAE OSSIVM

I. E

Vtrinque 5. ossa circumscripta, nullis nominibus donata. Vnum os, quod narium cavitates diuidit, unde septum seu diaphragma narium: & à similitudine, quam cum uomere obtinet, uomer à nonnullis dicitur.

Superior, quæ dicitur ἡ ὑπερὶ τοῦ ὤφθαλμοῦ uel ἡ ὑπερὶ τοῦ ὤφθαλμοῦ, id est, superior maxilla, quæ mala proprie à Celso uocatur, ab Aristotele superior ἡ ὑπερὶ τοῦ ὤφθαλμοῦ & habet

Maxilla, quæ uocatur greci ἡ ὑπερὶ τοῦ ὤφθαλμοῦ, quod ibi primò barba prorumpit: item ἡ ὑπερὶ τοῦ ὤφθαλμοῦ: Latine gena, maxilla & mandibula à mandendo. Hæc duplex est: alia

Inferior dicitur ἡ ὑποὶ τοῦ ὤφθαλμοῦ uel ἡ ὑποὶ τοῦ ὤφθαλμοῦ, inferior maxilla. Hæc abbat interpres uocat faucem: Celsus maxillam, Aristoteles inferiorem ἡ ὑποὶ τοῦ ὤφθαλμοῦ, & distinguit in partem

Suturas obscuras, quæ potius sub harmonia ueniunt recensendæ. Hæc etiam proprijs nominibus carent.

Dentes, de quibus in inferiore maxilla.

Priorem, quam mentum uocat. In hac præcipuè parte, ut in tertio superioris maxillæ osse duo consideranda sunt, quorum

Primum continet cavitates dentium radices excipientes, quæ uocantur Græcè Φόρτιαι ἢ Φόρτιαι ἢ Φόρτιαι μετὰ τὴν βόθρην: Latine præsepia uel præsepia la à præsepum similitudine: item cauernæ seu fossulæ, Locelli, mortariola, Frenula alueli.

Secundum continet dentes, de quibus in de tabula sequente.

Posteriorem, quam appellant mandibulam.

In alueolis reconditam, ex radicibus constitutam, quæ cavitates membrana obductas obtinent: Unde hæc pars radix & appendix dentium uocatur.

Generalem, in qua consideramus

Totam seriem dentium, quæ uocatur Φεράριος, id est, septum, quod linguam septat: Homero ἐφ' ὅς τοι δ' ὄντωρ.

Locum uel partem, quæ gingivæ proximi sunt: Hæc μεσσηριος dicitur.

Sedem, quæ concaui sunt intus: ea δ' ἡμεῖς οὐκ ονομάζομεν.

Summitates laterales, quibus cibum mandimus: hæ τρεῖς πλάγες, id est, menses uocantur.

Dentium interstitia, quæ ἀφ' ὧν οὐκ ονομάζομεν.

Dentes, ab officio uocantur ὀδόντες, tanquam ὀδόντες, Latine dentes quasi edentes. Hic autem describemus dentes adultorum, qui diuiduntur in partem

Dentium uero historia diuiditur in

Particularem, in qua consideramus omnium dentium (qui numero quidem 34. in admodum adultis sunt, utpote in superiori maxilla 16. totidem in inferiori, duo autem etate succrescentes) diuersa officia, formas, et nomina: atque ita diuidimus dentes in

Incisores, qui utrinque 4. sunt, ac uocantur Græcè δ' ὀντες & πρυμνοί, id est, incisores ab officio: διχασμοί, id est, diuisores à diuidendo: κτενέες, id est, pestilines à forma pestilinis uel secundum Poll. à κτενέω, quod oblati enecent: γέλαστοι, id est, risores, quia inter ridendum conspiciuntur: ab Aristotele πρὸ ὀντος, id est, priores à situ, et ὀδῶντες, id est, acuti à forma. Latine incisores & incisori: item anteriores, priores à Celso, Quaterij, Canini: Duo medij duales dentes sunt dicti.

Canines, qui utrinque sunt duo, & à lateribus incisoriū sunt collocati, quippe inter molares & incisores singuli & dicuntur Græcè κυνόδοντες canini & λυκόδοντες, quia acuti sunt, ut cum canum dentibus similitudinem habere uideantur: Lat. Serrati, canini, & risores interdum.

Molares, qui decem sunt in superiori, et 10. in inferiori maxilla, & quia duo, ut mox dicemus, succrescunt illis adijciendi, sunt numero 22. uocati Græcè μύλοι, id est, molaræ, & μυλῖται: item μύλοι ab Aristotele & Ruffo: πλάγες, id est, laterales, & γόμφιοι: clauales: etiam νεογνῆδες à Polluce & δ' ὀφ' ὄντων: Lat. molares maxillares, lati & plani. Septen in pueris φεράριες dicuntur.

Dentes denique 2. qui ab anno 18. ad 26. uel 30. prodeunt, uocantur σφρογισσῆδες, id est, dentes sapientiæ: ab Aristotele νεογνῆδες, à Polluce δ' ὀφ' ὄντων.

Gingivæ nudatam, et foris extra gingivam prominentem, quæ proprie à Celso dens appellatur & habet duplicem substantiā, alteram

Internam, eamque cortici uel crustæ similem, quæ obducta seu incrustata est.

Externam candidissimam & durissimam.

Anteriorem, quæ nullum peculiare nomen consequitur, nisi in pectore: nam thoracis anterior pars vocatur στήνιον.

Nunc de fruceo, quem Pollux
thoracem uocat, Sicut Græci
Ὠφρακ, ὅπερ τὸ θῆς, quod
diuinam mentis partem in-
cludat: is diuiditur in partem

Posteriorem, quæ græcè ὠμὸς
 Τὸν, latine dorsum uocatur:
 at, num tota trunci posterior
 pars dorsum sit uocanda, non
 leuis controuersia est: Nam

Quidam ex Aristotelis primo de hislo : animal: totam partem postfericem, ab occipite ad extremū coccygem ex 34. uertebribus compactam, dorsum uocant : cui sensu tentile etiam fuit Latinum dorsi nomen, quod secundum Probum significat totum posterioiorem corporis partem, eod, quod de uexa sit dorsum, ut inquit Felsus : nam tota illa pars declius inflexa q̄st: Sic dorsi quinque partes erunt, Collum, thorax, lumbi, os sacrum & coccyx

Nos assentiemur sententiae Galeni, et agemus de spina, quam efformat tota uertebraꝝ compages.

Quidam artilius dorsum definiunt, dicentes esse partem collo subiectam, & 12. comprehensam uertebriis: atq; ita appellant dorsum partem $\sigma\epsilon\gamma\omega$ oppositam: pu- tantq; ob id à plerisq; ἀντίστροφον dictum dorsum: Sicut Gal: plerumq; dorsum intelligit eam ipsam partem, quæ $\sigma\epsilon\gamma\omega$ opposita est.

Omniū uertebraꝝ coetus uocatur yūns.

Acuta pars per totam Spinam exprorecta, quæ sit à uerteburarum rectis processibus, appellatur Græcè: ἀκυνθα, ἀκυνθος & ῥαχίς. ab alijs simineæ.

Sulcus ad lumbos usq; protensus ὑπὸ ῥέχῃ.

Cauum per quod medulla transit, uocatur σύριξ ἱερὰ, sacra fistula, ab Herophilo σῶλον, id est canalis.

Vniuersam spinam in
genere, Vnde

*Ossea spinam constituentia dicuntur græcè ὀστέονδ' ἄλλος, à similitudine, quam habent cum
nodis, seu verticulis uel verticillis, qui Altera interna est et uocatur ob crassitiem cor-
pus foemine suos fusos aggrauant: κύβος pus uertebrae.*

Altera externa processibus referta, nomine carēs: at spinosa dici potest, processus uerò alij

Extant et inferuntur, qui mares uocantur.

Excipiunt & cas
uantur atq; foemis
næ uocantur.

Spina dicitur illa truci pars,
quæ ex uertebreis, osse sacro
et coccyge constituitur, dicta
græ: ῥαχίς, improprie ὠσ-
τόν: lat: propriè spina, quia
σπῳδύλι parte posteriori sunt
πτερύγματα, id est, spinos-
i et acuti. dicitur hominis ca-
pula. Historia autem spinæ du-
plex est: aut enim pertinet
ad

Processus nu-
mero sunt un-
decim

Duo in superiori sede.
Duo ascendentes.
Duo descendentes.
Quatuor transuersi.
Vnus rectus & posterior.
Omnes uertebrae his processibus sunt praeditae, prima excep-
ta.

Collum quod græcè
τράχηλος dicitur,
constatq; ex uertebis
7. quarum

Prima à non
nullis dicitur

ἄτλας, id est, Atlas, à bailando, quia ut Atlas uniuersum mundum dicitur sustentare. sic hæc totum caput.

ἐπιστοφὸς, id est, conuersor, à uertendo, quia super secundam uertitur, ueluti super axem, quæ ideo ἄξωπ à ueteribus dicta est.

Spinae partes:
diuiditur autem
tem spina in

Thoracem quæras α.

Lumbos quæras B.

Os sacrum γ.

Os coccygis ♂.

Secunda habet acutum quendam processum, ob quem totam hanc uertebrae eius nomine uocatur δοντρα, id est, dentem: appellatur & magna quibusdam: à ueteribus, ut dixi, ἀξω, id est, axis, quia immobilis est, dum super eam prima uertitur. Processus autem uocatur græcè δονδὺς à similitudine, quam cum dente habet: item τρυγητός, à τρυγῶν, quod uolens uis, & δονδὺς à nuclei similitudine: et ἡνωδονδὺς à nonnullis: à nucē pinea: Denique δονδὺς β' δονδὺς à nonnullis: Lat: dens

Sexta et septima magnæ uertebrae à nonnullis uocantur.

Huius autem uertebrae processus, quorum utringue unus, alter quidem primo, alter tertio Spondyli infimus, uocatur ῥατοχοί

Sexta et septima magnæ uertebrae à nonnullis uocantur. ter tertio Spondylo insinuat

Septima siue ultima colli uertebra propriè continendo.
dicitur ἄλως baiulus, tum quòd reliquos colli articulos sustinet, tum quòd
ferendis oneribus potissimum laboret.

Ad collum perimēs illud, quod linguae est basis: id uocatur graecē *ὤσφυς* & ὤσφυος quia similitudinē cum litera u habet *ὠσφυς* ὤσφυος, quia litera *σ* simile est: παρὰ στήθεα & *Ruffio* & *Herophilo*, id est, affessor, quia tonsillis affidet: item φαρυγγίον, quia in faucibus consistit: *Gale* tamen in isagoge pro pharynge accipit, est enim portio maxima pharyngis. Latine os hyoide, os linguae & os gutturis: uulgo os Lande & os morisui Adami.

Thoracis postica pars, quam uerterbrae costas
sustinentes constituunt, propriè $\nu\omega\tau\omega\mu$, id est
tergum uocatur à Ruffo, et quia sterno con-
trarium est, uocatur $\alpha\tau\iota\sigma\epsilon\gamma\omega\mu$ et interca-
pilium ac continet uerterbras dictas $\epsilon\alpha\chi\iota\sigma$
 $\tau\alpha\varsigma$, 12. quarum

Prima $\lambda\omicron\phi\iota\alpha\varsigma$ à ueteribus nominatur, uel à $\lambda\omicron\phi\omicron\varsigma$ quod
apicem seu cristam galeae significat, quia prae alijs eminet:
uel quia $\lambda\omicron\phi\iota\alpha$ et $\lambda\omicron\phi\iota\alpha\varsigma$ inferius guttur, ubi haec uer-
tebra est, uocatur.
Secunda $\mu\alpha\chi\alpha\lambda\iota\sigma\eta\varsigma$, id est, axillaris uocatur: Alij uolunt
primas uocari $\mu\alpha\chi\alpha\lambda\iota\sigma\eta\varsigma$, sicut superiores.
Reliquae nouem consequentes $\pi\lambda\epsilon\upsilon\gamma\iota\tau\alpha\iota$, id est, costales,
quia maximae costae ijs annectuntur.
Undecima tamen thoracis uerterbra uocatur $\alpha\delta\epsilon\epsilon\pi\tau\iota\varsigma$, id
est, spinam habens in neutram partem, siue nec sursum, nec
deorsum: qualis homini falsò ascribitur.
Duodecima $\delta\iota\gamma\gamma\alpha\lambda\omega\varsigma\eta\varsigma$, id est, praecingens, quod ea parte
cingamur

Harum uerterbra-
rum 7 sunt pros-
cessus quorum

Duo ascendentes
 $\kappa\upsilon\upsilon\delta\lambda\omicron\phi\alpha$ dicun-
tur, quasi canina
ceruix.
Duo obliqui $\kappa\epsilon\gamma\eta\alpha$
nomine carent.
Rectus spina dicitur.

Lumbi sunt ex quinque spinis crassissimis maximisque uerterbris, inter thoracem, et os sacrum medijs: illa pars
uocatur graece propriè $\delta\epsilon\phi\upsilon\varsigma$ καὶ $\pi\epsilon\delta\omicron\tau\mu\omicron\iota\varsigma$: impropriè $\iota\epsilon\delta\varsigma$, à $\epsilon\upsilon\delta\alpha$, quod scalpere significat: Latine
lumborum nomine comprehenditur. Lumbi uero constituuntur ex quinque uerterbris, quae uocantur $\epsilon\upsilon\omega\tau\omega\mu$.
 $\delta\upsilon\lambda\iota\alpha$ uerterbrae lumborum et renum: harum

Prima $\nu\epsilon\phi\epsilon\iota\tau\iota\varsigma$, quod ex aduerso re-
num sita sit.

Ultima $\alpha\sigma\phi\alpha\lambda\iota\tau\iota\varsigma$, id est, fulciens et
firmans.

Mediae $\alpha\kappa\upsilon\eta\omega\iota\varsigma$, sed propriè in brutis
quadrupedibus, dicuntur $\alpha\gamma\gamma\iota\varsigma$ καὶ $\kappa\upsilon\eta\alpha$
 $\theta\epsilon\alpha\mu$, id est, fricando, quod ea pars fri-
cari nequeat.

Os sacrum graece $\delta\epsilon\delta\omega\mu$ $\iota\epsilon\phi\omicron\mu$: alias $\upsilon\pi\omicron\sigma\omega\delta\omega\mu$ $\delta\upsilon\lambda\omega\mu$, quasi sub uerterbrum, et $\pi\lambda\alpha\tau\iota$, id est, latum: item
 $\iota\chi\iota\omega$, $\pi\upsilon\gamma\alpha\iota\omega\mu$, $\sigma\kappa\alpha\phi\iota\omega\mu$, $\pi\epsilon\sigma\chi\omega\upsilon\alpha$ et $\kappa\omicron\chi\omega\upsilon\alpha$ seu $\kappa\omicron\chi\omega\upsilon\alpha$, quod ex 6. innominatis uerterbris sibi
mutuo per $\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\mu$ in adultis connatis, in uer uer natis per $\sigma\upsilon\gamma\chi\omicron\nu\epsilon\sigma\phi\omega\sigma\iota\mu$ coniunctis, constituitur. Dicitur
et $\lambda\upsilon\mu\beta\alpha\upsilon$, s. clunium et clautum item uetula, osam, am, osanum quae nomina ossi coccygi ascribuntur. uos-
catur autem os sacrum triplici de causa

Primo, quia ueteres, ut Homerus et
alii $\iota\epsilon\phi\omicron\mu$ magnum, sicut Latini etiam
sacrum uocauerunt.

Secundo, quia nonnulli in illo esse
quid sacri arcanique inesse duxerunt:
nam partus tempore diuinitus aperiri,
eductoque foetu solidescere miro qua-
dam naturae opificio crediderunt.

Tertio, quia membra sacra generi pro-
pagando destinata includit.

Os coccygis est os in fine ossis sacri positum,
ex 3. uel interdum 4. proprijs ossiculis, ins-
uicem per $\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\mu$ coalitis, constans: uos-
catur autem

Totum hoc os, Graece $\kappa\omicron\kappa\upsilon\gamma\iota\varsigma$ à similitudine, quam cum cuculi rostro habet: Latini nomen à graecis mulo-
tuati etiam os coccygis uocant. alij sacri ossis mucronem ab Hippo: uocatur $\delta\epsilon\phi\omicron\delta\epsilon\omega\mu$, $\delta\epsilon\phi\omicron\sigma$, $\delta\epsilon\phi\omicron\alpha$
 $\pi\upsilon\gamma\iota\omega\mu$ et $\delta\epsilon\phi\omicron\mu$.

Tertium et ultimum uocatur $\sigma\tau\omega\mu$ $\delta\upsilon\lambda\omega\mu$, dicitur et $\sigma\kappa\alpha\phi\iota\omega\mu$: item $\delta\epsilon\phi\omicron\sigma$ et $\delta\epsilon\phi\omicron\sigma\pi\upsilon\gamma\iota\omega\mu$: sed hoc
uocabulum propriè competit aubus, quoniam in illis hoc manifestum apparet.

Os clauiculae uocatur Graece $\kappa\lambda\alpha\upsilon\varsigma$ id est clauis, eo quod cernicem et humerum concludit: $\kappa\lambda\upsilon\iota\varsigma$ ab Hippoc: ionica uoce: et $\sigma\phi\alpha\gamma\alpha$ ab Aristotele:
Latini: clauicula siue os clauiculae: os inguli Cornel. Celfo, à iungendo, quia sunt compages colli cum trunco. Est quaedam cartilago, quae clauem cum scapula
humeros uocant, dicuntur furcula, uel furcula inferiores.

Internum, quæ nullum peculiare obinet nomen.

Pars, quæ secundum dorſi longitudinem uerterarum ſpinis proxime exporrigitur, Scapula baſis uocatur.

Latera, quæ uocantur Græc: ueterum more πλεγμα, lat: coſtae, quarum altera eſt.

Superior, coſta ſuperior dicta.
Inferior, coſta inferior dicta.

Hæ ambæ anteriora petentes in ceruicem ſcapulae terminantur.

Partes iuxta ſpinam latiores & tenuiores apud Pollucem τρεῖς αἰεῖς id eſt, menſe dicuntur.

Partes ſurſum tendentes inæquales iuxta primas uerterbras uocant κυνόλοφα, id eſt, caninas prominentias.

Partes deorſum tendentes à menſa, quæ ſenſim arctiores, craſſiores & acutiores redditæ prominent, Græc: μεγύλα, Lat: alæ dicuntur, unde illi, quibus ſcapulae ſine carne nude ſunt, & inſtar alarum prominent, retrorſumq; producantur, μεγύλας, id eſt, alati uocati ſunt.

Pars gibba à teſtudinis forma χελώνιον, ἢ χελώνιον, id eſt, teſtudo dicitur.

Humilis uallecula, ad radices ſpine ſcapulae ſecundum longitudinem decurrens, ab Higino μετὰ χέλιον, id eſt, interſcapilium uocatur.

Proceſſus inſignis acutus, à baſi ſurſum aſcendens, ῥάχης, id eſt, ſpina uocatur, at ex hoc proceſſu alius prodiit, qui à ſcapula recedens clauicula obuius fit, ut illi copuletur.

Proceſſus hic totus interdum ἀκρωτήριον, id eſt, ſummus humerus dicitur. uulgò roſtrum porcinum. caput ſcapulae.

Copulatio dicti proceſſus cum clauicula aliquando ἀκρωτήριον uocatur.

Os cartilaginofum clauē cum ſcapula connectens nonnunq; ἀκρωτήριον dictum eſt.

Articulatio cum humeri capite propriè, dicitur ὄμος, id eſt, humerus: ab alijs hæc compages ἐν τῇ τράχηλι uocatur.

Ceruicem, id eſt, proceſſum il- lum, qui ex cæto capite in cavitatem abit, quo humeri caput cum ſcapula copuletur, & uocatur Græc: ἀνχίρ: huius uerò

Acetabulum ὀμοκότης, id eſt, humeri acetabulum.

Proceſſus impediens, ne brachium nimis laxè ad anteriora moueatur, appellatur Græc: ἀγκυρεῖς, ab anchora, cum qua ſimilitudinem habet: non ἀγκυρεῖς, quia pars eius extrema uelut roſtrum foras prominet: ὀγκυρεῖς, quòd Cantique li- tere ſimilitudinē gerit: uulgò Ancirois proceſſus.

Scapula integra cum ſuis partibus uocatur Græc: ὀμων πλάτη, quaſi humeri latitudinem conſtituat: ἐπιωπύον, quia ſpine dorſi incumbit, etiam ὄμος à quibusdam: quan- uis propriè uocetur articulus humeri: item πλάτη, id eſt, remus. Latine ſcapula: item à Celſo ſcoptulum opertum, & ſimpliciter ſcoptulum: uulgò ac barbarè ſpatula cly- peus & ſcutum peſtoris. Scapula autem plurimas obinet partes, proprijs nominibus donatas, Sed tamen in tres prin- cipales partes diuiditur, nempe in

Costae, ed, quod thoracis latera efformant, Graec: πλεῦραι sunt dictae, & σπῆλαι, id est, defensionis causa factae: uel in morem remorum collocatae. σπῆλαι enim & gladii & remum notat. Diuiduntur autem in

Superiores, utrinque septem, quae uocantur Graecè propriè πλεῦραι & πλόται, id est, latae quasi remi: item γυνῆσαι, id est, uerae. Latine costae uerae, legitime & perfectae, quia sterno articulantur. Harum

Duae superiores, & primae ἀντισσῆσαι a Polluce uocantur, quasi retortae uel sibi respondentes.

Duae sequentes σεπταί, id est, solidae propter firmitatem.

Tres ultimae σεγυρίδες, id est, pectorales.

Inferiores quinque, quae appellantur Graecè νότοι, id est, spuriae & illegitimae, quia imperfectae sunt, & sterno non articulantur: παρασῆποι, id est, παρασκευάζου, ueluti adiunges ita propriè uocantur duae ultimae, quae in ensiformem cartilaginem desinunt. μάλαργαί, id est, molles, quod maior earum pars cartilaginosa est. ἑσῶι autem Celso apud antiquos Graecos dictae sunt. καπταί, id est, palmulae. Latine: Nothae, angustae, mendosae, falsae illegitimae.

Os pectoris, Graec: communiori uocabulo σῆγον, situm in parte pectoris anteriore, clauibus subiectum, in quod costae terminantur, uel quo se pectus inter mammae aperit: ab Hipp: σῆδος, id est, pectus dicitur: aliàs ἑσφοειδές, id est, ensiforme, quia cum infima cartilagine gladii figuram res praesentat, uocatur & thorax, asser, collos, scutum cordis.

Huius

Fouea in primo Sterni osse, quae os iuguli excipit σφαγῆ, id est, iugulum uocatur uulgo furcula.

Cartilago sterni fini adherens, quae in senibus in os conuertitur, uocatur Graec: ἑσφοειδές, id est, ensiformis uel ensiformis. Sternum enim manubrio, & cartilago uel hoc os ensiforme gladio plerumque simile est: Lat: ensiformis & mucronata: uulgo malum granatum. Ab Arabum interpretibus, malum granatum, quod unius balausij apicis imagini accedat: item scutum, clypeus oris uentriculi, os scutale, os cultrale & epiglottidale, quia speciem laryngis operculi refert, medium furculae inferioris.

Prima est lata, superior ac posterior sacroque osi commissa pars, & uocatur λαγόνω, id est, os ilium: quia enim haec pars alias magnitudine & crassitie uincit, inde nomen illi sibi uendicat: huius osis

Appendix amplitudini semicirculari nata spina osis ilium uocatur,

Externa amplitudinis sedes, quia si cum interna conferatur, gibba est dorsum osis ilium uocatur.

Ossa ilium sunt illa, quae osis sacri osium processibus annectuntur. His Galenus nulum peculiare assignat nomen: at Ruffus integra illa uocat ὀσά ἰσῆ, id est, ossa coxae: uulgo uocantur ossa ilij, os anche, interdum lumbare. Distinguntur autem in 3. sedes, quarum

Secunda anterior osis eiusdem pars, qua in pubis regione cum alterius lateris regione committitur, insigniterque perforatur, uel

Tota uocatur ὀσά πυλῆς, id est, os pubis & os pedinis, penis pudibundum, fenestratum os.

Foramen habet, quod quia ob magnitudinem osis inflat uidetur, uocatur θυροειδές.

Tertia est media, ad femoris ingressum posita: haec Graec: ἰσῆ, Lat: os coxendicis siue simpliciter coxa nuncupatur. ab alijs pixis os. Huius autem

Cauitates capita femoris excipientes, circa quas femoris uersura fit, a Ruffo & Hippoc: κοτύλαι, κοτύλιδες, & οὐκῆλαι uocantur, Celso coxae: Lat: acetabula.

Processus cartilaginosus, quo caput femoris comprehenditur, supercilium dicitur.

Prima continet os magnum medium inter scapulam, & cubitum, quod grecè βραχίονα à Galeno, ἀγκύρον ab Aristotele uocatur. Lat: humerus. à Celfo, brachium, lacertus, lacertus agilis à Gaza, adiutorium ab Arabum interpretibus, paruum brachium, canna brachij. Huius autem

Copulatio uel articulus cubiti cum humero, aliquando, nominibus maiori superiorū processuum: ulnae compentibus, ab Atticis ὀλέκων, ab Hipp: & Gal: ἄγκυρον, à Dorienfibus κόλπος: ab aliquibus etiam κόπευον, id est, claua, & ἀγκυρός, id est, compages, et κόνα δ'υλός, id est, tuberculum uocatur.

Inferior pars, similitudinem trochleae refert: nam non solum in extremitatibus suis habet βραχίονας, id est, sedes, unam in fronte, alteram in tergo, quibus processus cubiti superiores accipit, sed etiam ipsa quasi trochleari ambitu cavitatibus cubiti infigitur.

Absolutis his, quae ad truncum pertinent, prius aggrediemur & primum quidem de brachio dicemus, quod totum à scapula ad extremum digitorum, Gr: χεῖρ, id est, manus uocatur, latine brachium: Verum ut Graeci rectè distinguant, uocant δ'απὸ τῆς χεῖρος, id est, totam manum. Distinguitur autem in 3. partes, quarum

Secunda obinet duo illa longa ossa, quae inter brachium & extremam manum sunt: illa pars appellatur grecè δ'ἀλὺν & πύχυν, id est, cubitus ab Arist: ὀλέκων Atticè. Lat: brachium à Celfo, Cubitus à Gaza. Huius autem

Superior pars secundum Pollucem dicitur εἰς πύχυν id est, cubitus superior

Totus uero cubitus constat ex duobus ossibus quorum

Alterum superius, minus & breuius, uocatur Gr: κερκίς, Lat: radius quod figuram rotarum paruarum radios imitantem habeat: appellatur & πρῶτον χροῖον, id est, cubito additum. Arab: ficile minus, canna, arundo minor brachij.

Unum anteriorem et minorem, qui sinui in anteriore humeri sedet, ad elatiorem rotulae regionem excelsum uergit.

Superiore duos

Alterum posteriorem & maiorem qui in cavitatem humeri posteriori insidet, & cui immititur, ab antiquis Atticis ὀλέκων, à Gale: & Hipp: ἀγκύρον, à Dorienfibus, qui in scissura habitauerunt κόλπος, id est, ὀλεῖν, id est, a flectendo appellatur, unde latinum cubiti nomen scissum uisum, et uerbum cubito ferire. Gaza gibberum uertit.

Hi duo processus anterior et posterior communem uocabulo appellantur κόπευον, id est, rostra seu glades partes. n. illa cubiti teretes uisuntur.

Inferior pars γαστήρ, ἀγκύρον, quod ea parte semper quid adducimus ad nos

Alterum inferius crassius & maius, uocatur eodem nomine cũ toto, Græc: πύχυν & Lat: cubitus: speciali nomine ulna: à quibusdā et πύχυν, quod ante alterū collocatur: Ab Arab: ficile minus canna et arundo maior brachij. Habet autem

Processus in parte sui

Inferiore unum, qui inferior dicitur, & quia in acutum procedit, uocatur uel à stylis scriptorij imagine ὑποφθαλμός, uel à columinae figura ὑποφθαλμός.

Simum, qui rotulam humeri excipit, et quoniam antiquae litterae C. uel nostrae C. similis existit, στυμοειδής uel στυμοειδής uocatur. Hipp: & Gal: ὀστέον, id est, os nominat, id est, sedem, cui processus humeri, ex tereti gibbo & canis extantibus figuram trochleae constituens, inseritur.

Acumen, uel eminentiam, in nexu sui cum humero conspicuam, à Suida χεῖρ ὀστέον dictam.

Alter exterior est, & appellatur ὀπιόθεν. Osium autem metacarpi quinque ordo in formam aciei constitutus, à quibusdā φάλαγγες uocatur.

Tertia uocatur ἀγκύρον, uel composita uoce ἀγκύρον, siue ἀγκύρον, id est, extrema manus: Latini proprie manus dicitur, diuiditurque in tres partes, quarum

Prima pars cubiti coartulatur, & ex octo ossibus constat, dicta græcè ὑπερστέον, Lat: brachiale à Gaza, prima palmarum pars à Celfo: Carpus uulgo: Rasetta ab Arab: Rascha, ascam, ossa rasete, palma quibusdā.

Secunda pars carpo annexa lata, et ex quinque ossibus ad digitos tendentibus constans, uocatur græcè μετὰ τὰς ἑπτά, ὀπιόθεν, Altera interna est & uocatur βέναν, à Ruffo & Hipp: ὑπερστέον, uel ab alijs.

Altera exterior est, & appellatur ὀπιόθεν. Osium autem metacarpi quinque ordo in formam aciei constitutus, à quibusdā φάλαγγες uocatur.

Tertia pars continet digitos, de quibus in tabula de externis partibus: Verum

Ossa terna digitos constituentia mutuoque colligata, & ordine sibi succedentia, ueluti in acie disposita, uocantur φάλαγγες, id est, acies & agmina, quia eo ordine disposita sunt, ut ueluti in acie stare uideantur, et σκυταλίδες, id est, scutulae perticae.

Protuberantiae iuxta articularum commissuras gr: Primi προνόδυλοι. Medij μέσδυλοι. Extremi μετανόδυλοι.

Huc pertinent & ossa Sesamoidia, à Sesami seminibus dicta.

TABVLAE OSSIVM.

51

Primā à coxendice incipit & ad genu finitur, estq; os omnium in corpore maximum, non rectum, sed repandum, ab Hipp: γένυος τὸ ἐξωμενός: dicta Græ: μῆρος: Lat: femur femoris, os femoris, os coxae. huius autem

Superioris cernicis duo processus sunt, qui uocantur τροχαντῆρες, id est, cursive, eo quod femoris motus cursusq; per musculos his apophysis insertos perficiantur: Latini uocabulum à Græcis mutuati & trochanteres dicunt: quidam uocant eos rotatores, alij processus cursorios. Horum

Maiores & externus τροχαντῆς uel rotator maior item γλουτῶς, id est, natis uel à natum similitudine, uel quod natum musculi illi inferantur, uocatur malum granalli testiculorum, tharuca, trachametra maior.

Dearticulationis cum tibiae osse anterior pars γόνυ id est, genu dicitur: Galeno com: 2. in Hippocrat: de offici: Medici ἐπιγονῆς & ἐπιγονάτις.

Minor & internus τροχαντῆς uel rotator minor appellatur.

Dearticulationis cum osse tibiae posterior pars genu opposita, ἱγυὶς ἢ ἱγυῖον, item ἀγυῖον & ἱγυῖον, id est, poples uocatur.

Os rotundum, disci formam (ut Ruffus inquit) representans, quod femoris capiti cum tibiae osse articulatū adhæret, uocatur græ: μύλα, id est, mola ob similitudinem, quam cum mola pistinensi obinet: ab Aristotele πλανυτοῦ εἶδος, id est, mobile & uagum quiddā: ἐπιγονάτις ἢ ἐπιγονῆς, quia genu incumbit ab Hipp: ἐπιμύλας, quasi quiddam molare: ab Hippocrate μύλας: ab alijs etiam κόλχη & κόχης, id est, concha. Latine mola, palmula, patella, & genu rotula, scutiforme os, oculus genu, polus.

Restat nobis de crure agendum, quod οὐκῶς dicitur, diuiditurq; in 3. partes, quarum

Secunda à genu ad extremum pedē pertingit, & uocatur κνήμη, crus et tibia. οὐκῶς proprie tibia, eo quod in anteriori parte excarnis sit. Estq; crus, ut ait Aristoteles διῶς οὖρον, id est, ex duobus constans ossibus, quæ sunt ἰσομήκη μὲν, id est, æquæ longæ, ἀλλὰ οὐκ ἰσοπαχῆς, id est, æquæ densæ. Horum enim alterū

Quod interius est, maius existit, quod etiam uocant κνήμη, id est, tibiam: Arabū interpretes facile maius, arumdo et canna maior, siue domestica cruvis. Pollux πρῶτον μὲν & κατὰ δὲ uocat: Huius autem

Interna appendix prominens, et gibba σφῆρα, id est, malleolus dicitur, minime talus: nam talus sub hoc osse reconditur: πρῶτον & παρὰ κνήμην à Polluce, à quibusdam σφῆρα, id est, fulcrum, à σφῆρα, quod est finis, & fulcre, item insistere. appendices utræq; clauiculae et cauitas dicitur.

Quod exterius est, minus existit, quod uocatur πρῶτον, id est, sura: fibula à quibusdam: Ab Arabibus facile minus: huius tuber externum iuxta pedem etiam σφῆρα, id est, malleolus uocatur, qui tamen ad distinctionem interni, externus appellatur. Pollux uocat hoc os παρὰ κνήμην. alij arundinem & cannam minorem cruvis.

Angulus longus & acutus ἄγκυρα, id est, spina: quia uerò ueluti frons est τὸς κνήμης, ἀπὸ κνήμης uocatur, id est, anterior pars tibiae secundum Pollucem: nam posterior γαστροκνήμη dicitur, quæ est palpus quasi uentricosa crucis, Latine sura de qua alibi dictum est

Tria ossa peculiaribus nominibus prædita, quorum.

Tertia pars Græcè uocatur πῆξ, id est, pes, qui à Galeno diuiditur in

Primum uocatur Græ: ὀστέον & ὀστέον, Lat: talus, uulgo baliste os. Dicitur etiam τέτρονον, quia à 4. lateribus constat: quanq̃ hoc nomine pronā & orbicularis tali pars sursum uergens, cum pes terræ innititur, quod quadrangularis quodammodo existat, appellatur, Lat: quatrio cauita. Secundum πῆξ, id est, os calcis, siue calcaneum, calcamen, pedis calcer, calcaneus. Tertium οὐκῶς, id est, os nauculare, à schaphæ similitudine etiam os naui forme dicitur, hoc os in gibbosa parte habet 3. superficies planis proximata, tria innominata tarsi ossa excipientes, quæ cubicæ superficies dicuntur uel cubæ, nauculare.

Prima est series 4. ossium, ex quibus constat, & carpo in manu respondet. Vocatur ταρσός, tarsus lat: & raseta pedis. Horum uerò ossium

Tria sunt innominata, à nonnullis χαλκοειδῆ, à Fallopio, quod cuneum referant cuneiforma dicuntur. Quartum κυβοειδῆς, id est, cubicum à forma cubi uocatur, Lat: testis, quæ dratum, grandinosum.

Tres peculiariter partes, quarum

Secunda est illa pars, quæ ex quinque ossibus constans inter tarsum & digitos collocata est, & metacarpio in manu respondet, uocatur à planicie πῆξ, id est, planta: ab Hipp: πῆξ, id est, pedis ob costarum seriem, & ὄσος, id est, tertius, campus & finis: Item πολυόσος. Tertia continet digitos, qui numero ossium digitis manu um respondent, pollice excepto, qui in pede ex duobus tantum ossibus constat, & uocatur pollex & alula secundum Festum minime ἀντίχες, quod pollicis manus tantum competit.

HYMANI CORPORIS.

52

In capite, quarum

- 4. sunt palpebrarum.
- 2. in orbita oculi, oculi musculis implicitæ.
- 5. In navibus sunt, quarum 4. constituunt globulum siue caput: quinta diaphragmatis officio fungitur.
- 2. Aures constituunt.
- 1. In ore & est ἐπιγλωττίς.
- 2. Inter maxillam inferiorem & superiorem.

Sunt itaq; in uniuersum cartilaginee pertinentes ad caput 16.

In collo, quæ pertinent uel ad

Aperam arteriam, quarum aliæ constituunt

Caput asperæ arteriæ & sunt numero 4.

Aperam arteriam, cuius numerus est uariis. Hæc propriæ guttur apud Latinos uocatur.

Vertebrae colli, inter quas singulæ sunt cartilaginee, prima excepta: itaq; 6. sunt.

Cartilago clauem cum scapula copulans, Græc: ἀγκύριον.

Cartilago est pars corporis omnium post os maximè terrea & solida & uocatur Græc: Χόνδρος. Hic uero de ijs cartilaginibus agemus, quæ in adultis reperiuntur, à capite incipientes. Sunt itaq; aliæ

In thorace, quæ spectant tum ad

Vertebrae eius, nam hæc uerterbræ inuicem per cartilaginee conne-
ctuntur.

Clauiculas, quarum singulæ duas obtinent, unam qua cum scapulæ da-
cromio, alteram qua cum sternone coniunguntur.

Scapulam: nam basi scapulæ cartilago nascitur in hominibus mi-
nor, in brutis maior.

Costas: costæ enim singulæ suas cartilaginee appendicum instar obti-
nent.

Os pectoris, quod in fine quidem unam ensiformem dictam, alteram in-
ter primum & secundum os obtinet, quæ ligamenti uicem gerit.

In lumbis & lumbis annexis
quarum quædam pertinent ad

Lumborum uerterbras, quæ ut cæterarum uerterbrarum cartilaginee
sepe habent.

Os coccygis, quod unam quidem consequitur, ubi osi sacro nascitur,
alteram in fine.

Os ilium, quod unam in spina eius partis, quæ ilibus assignatur, adipia-
scitur: aliam ubi in medio pubis ossa pubis copulantur: tertiam, cox-
tylam coxæ ambientem.

In artubus, ut in

Manu generaliter sumta, in qua peculiare non reperiuntur cartila-
gines.

Crure, in quo duæ cartilaginee reperiuntur peculiare & semicircu-
lares, inferioribus femoris capitibus annexæ.

In quibuscumque articulis reperiuntur cartilaginee, quæ nullibi liberae sunt, sed articulos incrustant.

TABVLAE OSSIVM.

Palpebras & sunt in quolibet latere duæ, una suprâ, altera infrâ: græcè & latine τὰ ὀφθαλμοὶ ἀπὸ τῆς πύλης, quos ad similitudinem remorum in longis nauibus erectos continent dicti.

Oculum, cui simul cum musculis adheret cartilago trochleæ modo efformata, ideoq; à Fallop: trochlea dicta est.

Cartilaginem narium foramina dirimentem, quæ quasi paruum paries κίον διαφραγμα, & σπλῆν uocatur, alijs crista os.

Prima uocatur θυρεοειδής, id est, scutiformis, quia uelut scutum alijs preposita est, & scuti formam obtinet: uulgius eam uocat scutalem & peltalem.

Secunda innominata apud priscos est, sed quia conformis est anulo Turcarum, quem sagittantes dextro impouunt pollici, ut eius anuli ope neruum arcus robustius trahant, uocari anularis potest.

Tertia, quæ unica à priscis habita fuit, quamuis duplex sit membrana asperæ arteriæ obducta, quod uasorum quibus manus lauaturis aqua prebetur, orificijs respiciet, ἀπὸ τοῦ ἀνοεῖν uocatur: ἀπὸ τοῦ ἀνοεῖν enim tale uis significat, lat: gutturnium. Hæc cartilago uulgo arytænois uocatur.

Quarta est cartilago quoddam corpus, prioribus annatum, quod inter deglutendum, laryngem, instar operculi occludit, uocaturq; à laryngis rima quæ γλῶττις dicitur, ἐπιγλωττῖς καὶ ὑπεργλωττῖς, ab Hippocr: κλῆις ὀφθαλμοῦ, à claudendo: nam hanc rimam occludit, unde à quibusdam, lat: epiglottis, à quibusdam laryngis operculum uocatur.

Asperam arteriam, quæ Græcè ἀσπὲρ τετραχῆα dicitur, ἀσπὲρ quidem ἀπὸ τῆς τριῶν τῶν ἀσπὲρ, quod ærem trahat: τετραχῆα autem, id est, aspera, quod à anulis asperata sit. Dicitur etiam βρογχίτις, πρὸς τὸ βρέχειν ἐν τῇ στήθι, & πνεύματι, id est, quod inter edendum atq; bibendum humore quodam irrigatur. Huius autem cartilagines βρογχίτις dictæ sunt, latine etiam Bronchia,

Scapulam, quarum in quolibet latere, una est, quæ in clauicula cum acromio scapulae articulatione hæret, dicta κατὰ κλειδίον, quasi clausura: nonnullis etiam ἀκρομήριον.

Os pectoris, cuius fini adheret cartilago uocata ἐπίφρεα, id est, ensiformis cartilago, de qua in tabulis de ossibus dictum est.

Finis Tabularum de Ossibus.

Nunc agemus de cartilaginibus, quæ peculiaria nomina sortitæ sunt: harum alie pertinent ad

54

CHARACTERVM ET NVME- RORVM, QVI ADVLTORVM HVMANORVM CAPITVM VTPOTE IN ORDINE PRIMAE ET SECVNDAE FIGVRAE ADHIBENTVR INDEX: IN quo literæ & numeri duabus lineis inclusi, partes & foramina, numeri extra has, lineas collocati, figuras indicant,

- M** 1. 2. Circumscripção ofis occipitis.
uu 1. Aſterior pars ofis occipitis.
F. F 1. Partes ſuture ſquammoſe
C 1. Sutura lambdoidis termini.
N 1. Ofium temporum partes.
P 1. 2. Circumscribitur os euneale, & ſingula eius partes nu-
 meris ſingulis notantur.
Q. T 1. Primum os ſuperioris maxillæ.
SA 1. Quartum os ſuperioris maxillæ.
V. X. 1. Os iugale.
γ 1. Commiſſura duorum proceſſuum, nimirum primi ofis
 ſuperioris maxillæ, & ofis temporum, os iugale
 conſtituentium.
d 1. Congreſſus per lineam cuneiformis ofis & primi ſupe-
 rioris maxillæ.
e 1. Commiſſura communis ofis cuneiformi & primo ſuperio-
 ris maxillæ ofi.
h 1. Sinus ofis temporis inſculptus ſuperioris maxillæ caput
 excipiens.
i 1. Calcaris proceſſus.
k 1. Mamillarum proceſſus.
l 1. Coronæ ofis occipitis, quibus caput collo coarticulatur.
mm 1. Demonſtrant progreſſum ſuture lambdoidis.
nn 1. Congreſſus utriuſq; partis lambdoidis ſuture.
oo 1. Linea ſive ſutura ofi temporis et ſphinoidis communis.
pp 1. Ofis ſphinoidis principium.
qq 1. Sphinoidis ofis ambitus.
z 1. Decimum tertium os maxillæ ſuperioris uomer dictum
 ſive ſeptimum maxillæ.
x 1. Meatus auditorius.
αα 1. Quartum os ſuperioris maxillæ uel os palati.
ε 1. Pars ofis temporis præruptæ rupi ſimilis.
ππ 1. Sextum par ofium maxillæ ſuperioris

DE FORAMINIBVS CRA- NEI ET PRIMO DE OSSIS FRON- tis foraminibus.

- uθ** 3. Duo ofis frontis foramina, utriuſq; unum ad medium ſu-
 percilij, ramo minoris radice tertij paris neruorum
 cerebri deſtinatum.
x 2. Foramen ſupra ſeptum ofis iſthmoidis non in om nibus
 caluarijs conſpicuum.

DE FORAMINIBVS OS- SIS OCCIPITIS, QVORVM ALIA propria, alia communia ſunt, & propriorum ſunt ſeptem.

- f. 2** 1. Primum ofis occipitis ſpinalem transmittens medullam.
 Secundum & tertium hic non ſunt.
g. 6 1. Occipitis 4. & quintum in poſteriori parte coronæ of-
 ſis occipitis ſextum neruorum cerebri par trans-
 mittentia.
 Sextum & ſeptimum in quibuſdam non reperitur, à Val-
 uerda non deſcribitur, nos uero ſumemus duo alia

- 7. 8** 1. foramina occipitis 7. 8. in prima figura notata, quæ
 in paucis apparent.
u 2. Foramen ſextimo pari neruorum deſtinatum, in alte-
 ro latere tantum conſpicuum, ad radicem coronæ
 extrinſecus exitum habens.

DE COMMVNIBVS FO- RAMINIBVS OCCIPITIS QVAE quatuor ſunt.

- 9. 10** 1. 2. Primum & ſecundum foramen ofis occipitis & tem-
 poris commune, ſexto pari neruorum cerebri, ma-
 iori interne iugularis uenæ ramo minorisq; ſopora-
 lis arteriæ ſoboli exſculptum.
11. 12 1. 2. Tertium & quartum inſignia ſunt foramina maiori
 ſoporalis arteriæ excavata, et pituitæ ad os & pa-
 latum deſluentis tranſitum præbentia.

DE FORAMINIBVS OS- SIS CVNEIFORMIS, QVAE 17. IN terim 18. ſunt numero, ſed om- nia hîc non conſpicua.

- 13. 14** 2. Foramen optico neruo deſtinatum.
15. 16 2. Foramina ſecundo neruo motui oculorū inſeruienti pera-
 uia, in ſecundæ figuræ altero latere tantū conſpicua.
17. 18 2. Quintum & ſextum cunei formis ofis, inſculptum tertij
 paris ramo, & radice minime quinti paris.
19. 20 2. Septimum & octauum duo teretiſſima corpora inuicem
 membranæ connexa transmittunt.
21. 22 2. Ad nonum & decimum extremum foraminis ſuperioris
 lateris, multo minus exiſtit, et exactè orbiculare, quo
 interne iugularis uenæ portio à ſoporalis abſcedens
 arteria, caluariam intrat.
23. 24 2. Vndecimum et duodecimum ſunt in poſteriori parte of-
 ſis ſphinoidis, è regione finis ofis temporis, nempe
 ubi proceſſus auditui deſtinatus deſinit.
 Præter hæc foramina, Valuerda adhuc quinq; recenſet, quæ
 in baſi ofis ſphinoidis foris intra duas alas ſunt, duo
 à ſingulis lateribus, unum in medio. duo prima in
 paucis reperiuntur, illorum loco duo in medio ala-
 rum ueſpertilionum, quæ terminantur à lateribus
 ſellæ, in interna parte ſunt rotunda & ita exigua,
 ut uix ſexam porcinaſ admittant. in his figuris ana-
 notari nequiere. in numero erunt 25. & 26.
 Sunt & duo alia foramina foris inter duas alas in oculi
 centro reſpondentia, quæ & hic deſiderantur &
 erunt 27. & 28.
 Reperiuntur in quibuſdam caluarijs alia foramina para-
 ua, quæ cum omnibus non ſint communia, hic deſcri-
 gi nequiere de his alias per maius otium cum licet
 erit.
e 2. Sunt foramina non peruia.

DE FORAMINIBVS OSSIS VM TEMPORIS MANIFESTIS.

HH Offa

- Offa temporum singula, quinq; consequuntur foramina, foris absq; ostium lesione oculis sese offerentia. de foraminibus intus latentibus, in historia de auditu instrumento dictum est.
30. 31. 1. Primum est meatus auditorius.
2. Secundum est quod cœcum dicitur, & in exteriori parte sub processu mamillari conspicitur.
Tertium foramen est, quod ab aure in paulatim & navium cavitatem tendit, de hoc & alijs in tractatu de auditu.
34. 35. 1. Quartum insigne foramen est, maiori soporalis arteriæ ramo calvariæ ingrediendi excavatum.

DE FORAMINIBVS
OSSIS ITHMOIDIS.

- ff 2. Foramina ossis ithmoidis recte peruia expirationi, inspirationi, & expurgationi cerebri inferuentia, multa, & angusta sunt.
- Reperiuntur & alia foramina partim peruia, partim minime peruia, quæ hic notare non potui. alijs uero si otium & commoditatem maiorem consequutus fuero, de his latius ad plenorem intelligentiam legas Vesalium, Fuchsum, & Valuerdam.

DE MAXILLÆ SVPERIORIS FORAMINIBVS.

- Hæc maxilla consequitur foramina quatuordecim, 6. propria 8. impropria, siue communia.
1. 2. 3. Primum et secundum reperiuntur in quarto maxillæ su-

perioris ossis. transmittunt tertij paris minoris rades sobolem, ex oculo sedem in genas ad superius oris labri & alarum nasi musculos.

Tertium, quartum, quintum & sextum reperiuntur in prime figuræ sexto maxillæ superioris ossis ππ notato, iuxta processum alarem ossis sphenoidis. hic per incuriam literis signata non sunt.

DE FORAMINIBVS
COMMVNIBVS.

- Primum & secundum in his figuris annotare nequui, sunt autem in magno siue interiore oculi angulo, iuxta dorsum nasi collocata, & recta deorsum in narium cavitatem terminantur, in his generantur fistule lachrymales.
- 7 1. Tertium et Quartum collocata iuxta posteriorem dentium incisiorum sedem, ex palato in narium amplitudinem desinunt, quartisq; maxillæ superioris ossibus communia, hominibus unica, equis & canibus gemina.
- Quintum & sextum in his figuris non conspiciuntur. Sunt rime siue oblonga foramina iuxta optici nervi in oculi orbitam ingressum posita, transmittunt ramulum minoris 3. paris nervorum cerebri, & pituitam, communia sunt cuneiformi ossi, et quarto superioris maxillæ.
- Septimum & octauum sunt manifesta, nimirum ampliorum foramina, septo suo intermixta.
- Sunt & alia foramina huc pertinentia, de quibus alias latius & magis distinctè.

CHARACTERVM ET NVMERORVM
SECUNDÆ FIGURÆ, QVÆ ADVLTI HOMINIS CRANEI BASIM INTERNAM DEMONSTRAT, Index.

- aa 2. Squamose partes cranei.
bb 2. Spongiosa substantia medullium dicta.
c 2. Pars suturæ coronalis separans os frontis ab ossis sphenoidis.
d 2. Septum cribriformis ossis.
gg 2. Pars ossis frontis, superiorem partem orbitæ oculi constituens, quæ leues protuberantias habet.
P. P. 1. 2. Partes ossis sphenoidis hic notantur, quarum prima scilicet glandulam pituitæ excipiens est & in utraq; figura P. 2. signatur, huius posterior pars h. 2. habet.
P. 2. h. 2. 2. Secunda cuneiformis ossis pars nervis uisorijs destinata demonstratur i. P. 3.
P. 3. 1. Tertia & quarta alarem processum constituentes, in secunda figura P. 3. notantur.
nn ππ 1. 2. Congressus utriusq; partis lambdoidis suturæ.

- M 1. 2. Circumscriptio ossis occipitis.
kk 2. Squamose suturæ internæ facies, & suturæ separantes ossa temporum à cunei formis ossibus.
N
l. l. 2. 1. Partes ossis temporis.
l. l. 2. 2. Ostium temporum squamiformis pars.
l. 2. 2. Secunda pars ossis temporis uocata petrosa.
m. m. 2. Hic non sunt lineæ siue suturæ, sed ossium asperitates.
oooo 2. Canaliculi sinu duræ meningis excipientes.
p 2. Congressus sinuum, qui torcular dicitur.
q 2. Lambdoidis suturæ additamenta, ubi satis sunt raræ & late suturæ.
r 2. Ossis bregmaticæ partes.
Reperiuntur & in hac secunda figura foramina, de quibus in priore indice abunde satis.

CHARACTERVM ET NVMERORVM
TERTIÆ ET QVARTÆ FIGURÆ SIVE
VTRIVSQVE ADVLTI HOMINIS SCHELETI Index.

CAPITIS.

- A 3. Sutura coronalis.
 B 3. Sutura lambdois.
 D 4. Squamiformis sutura.
 α 4. Verticis ossa.
 β 3. Frontis os.
 γ 4. Occipitis os.
 δ 4. Temporum ossa.
 X 4. Linea quædam supra squamiformem suturam minimè peruia, sed leuiter ossibus uerticis impressa, non omnibus caluarijs communis.
 e 4. Stilois processus.
 z 4. Mammillaris processus.
 E 3. 4. Cuneiformis ossis processus.
 F 4. Os iugale.
 G 4. Maxilla inferior, hic mentum uocatur.
 1. 2. 1. 3. Primum & secundum maxille superioris foramen in quarto osse maxille superioris constitutum.
 d d 3. 4. Primum os superioris maxille.
 n. θ. 3. Prima duo foramina ossis frontis, animaduertendum, quod sculptor loco D. B. posuerit.
 i. u. 3. Secundum par foraminum mandibule in superiori & exteriori parte constitutum.
 d d 3. Quartum os superior: mandib: columbo & Fallopio tertium.
 e e 3. Quintum superior: maxil: os nasi dorsum constituens.
 f 3. Narium septum.
 g g 3. 4. Posterior pars mandibula dicta, que ex duobus constat processibus, quorum caput, quo articulatur cum osse temporis, litera b signatur.
 b 3. 4. Acutus mandibule processus corona dictus, cui musculus temporalis inferitur.

COLLI.

1. 2. 3. 4. 3. His numeris 7. colli uertebrae signantur. Sic & subsequen-
 5. 6. 7. quentibus thoracis, que ab 8. numero incipiunt & ad uigesimalam tertiam figuram terminantur. reliquæ quinque ad lumbos spectant, ubi numerus signatus est uertebrae corpora existunt.
 In quarta figura inueniuntur omnes uertebrae continua numerorum serie notatas.
 K. L. M. 4. Significent spinosam partem uertebrae que ex re-
 NN 3. 4. tis constat processibus.
 3. Processus transuersales ascendentes & descendentes.

DE COSTIS.

- Coste notantur in 3. et quarta figura suis numeris, harum
 7. superiores ueræ sunt dictæ, quinque inferiores no-
 the.
 Q 3. Clavicula notatur.
 R 4. Scapula.
 λ 3. 4. Superior scapulae processus angulosus dictus.
 μ 3. Anirois processus.
 v 4. Basis scapulae.
 o 4. Latera scapulae siue costae.
 R 4. Mensa scapulae.
 π 4. Caninae prominentiae scapulae, et gibba pars siue spina.
 p 4. Ale.
 σ 4. Humilis uallecula inter scapillum dicta.
 7 4. Cernix, unde duo superiores processus prodeunt.

DE STERNO.

3. Os Sternum. eius fouca sub numero nono uertebrae,

ingulum dicitur. Vestigia coarticulationum ossium sterni, quæ temporis successu coalescunt, signantur litera l. l. l. l.

- Γ 3. Cartilaginum ossium pectoris coactum & contumeliosum, in Vesalij & aliorum sceletis desiderata.

DE HUMERO ET
CVBITO.

- S 3. Os humeri.
 V. X 3. Tota hæc pars cubitus dicitur.
 X 3. Radius, superius cubiti os.
 y 3. Vlna, inferius os.
 V 4. Gibberus siue cubitus.
 V 3. Processus in gibbero corona dictus.
 f 3. Paulo infra f. est acutus processus stylois siue styloformis processus dictus.

DE MANV.

- 2 2 3. Carpi & carpi ossa suis numeris signata.
 G G 3. Metacarpi ossa quatuor numeris notata.
 X 3. Ossa sesamoidia.
 Δ Δ Δ 3. Digitorum ossa.

DE OSSE SACRO.

- N 4. Os sacrum.
 e 4. Os coccygis.

DE OSSE ILII ET PAR-
TIBVS EIVS.

- θ 3. 4. Os ilium & prima eius pars.
 o 3. Spina ossis ilij uel appendix.
 ω ω 3. Secunda pars ossis ilij ischias dicta,
 p p 3. Tertia pars ossis ilij os pubis uocata.

DE FEMORE ET
CRVRE.

- A 3. Os femoris.
 7 3. Exterior femoris ossis processus, maior trochanter uocatus.
 v v 3. 4. Internus processus trochantir minor dictus.
 z z 3. Patella.
 A. B 3. Totum crus à Celso.
 Γ 3. Tibia, siue focius maius.
 Δ 3. Fibula siue focius minus.

DE PEDE.

1. 2. 3. 3. Tria ossa, utpote primum os tali, secundum os calcis, tertium os naviculare.
 1. 2. 3. 4. 3. Tarsus ex quatuor ossibus conflatus, quorum singulis sua nomina indantur.
 1. 2. 3. 4. 5. 3. Sunt quinque metapedij ossa.
 Reliqua ad pedum digitos pertinent. Ossa sesamoidia signantur litera X. X.

FINIS.

Huic indici subiiciendæ sunt quatuor figure, ad adulti hominis ossa pertinentes, quarum prima crani humani externam, ea, qua est magnitudine, basim exprimit: Secunda eiusdem sed interna basim faciem representat: Tertia totius Scheleti anteriorem, quarta posteriorem & lateralem speciem demonstrat.

HH 2 OSSL

OSSIUM TVM HVMANI **FOETVS ADHVC IN VTERO EXISTENTIS, VEL IM-** **PERFECTI ABORTVS, TVM INFANTIS DIMIDIVM ANNVM NATI BREVIS HI-** storia atq; explicatio, in qua ossium prima origo, incrementum & discrimen inter tenellulorum ac grandiorum ossa aperte declaratur. animaduersione verò in his digna figuræ ad fi- nem adiectæ literis numerisq; signatæ, tibi monstrabunt. Nota quod prima signa marginibus ascripta, figuras, secunda verò partes singulas signent.

*Præfatio, in qua huius incepti operis ratio redditur, & quanam expe-
ctanda sint, aperitur, ultimo de ossium primo exordio traditur.*



MIRVM mihi multoties vi-
 sum est, Anatomicorum
 Chirurgorumq; neminem
 ad hoc vsq; tempus præter
 Fallopium & Eustachium
 in Anatomia insigniter ver-
 latum, sectionem tenellulorum puerulo-
 rum aggressum, eorundemq; ossium do-
 ctrinam tradidisse; siquidem frequentio-
 res membrorum contorsiones ac dislocati-
 ones nulli ætati magis, atq; puerili contin-
 gere (sunt enim in infantibus appendices,
 processus articuliq; admodum molles &
 imperfecti) quotidiana experientia docet.
 Vnde non minor commiseratio, atq; ad-
 miratio me incescit paruulorum, qui miseri
 ac infelices in imperitorum arrogantiumq;
 barbitonorum, carnificum & anicularum
 crudeles incidunt manus, atq; inde quidā
 monstrosi capitis, multi gibbosi, vari,
 valgi, scauri, id est, talis magnis maleq; ef-
 formati, compernes, id est, genibus plus
 nimio coniunctis redeunt, mirisq; modis
 contorta membra reportant. Deinde his
 de causis ante multos annos puerorum
 Scheleta Bononig mihi parauit, eorum verò
 ossa in scholis cum adultorum ossibus con-
 tuli & differentiam eorum auditoribus,
 tum explicavi, tum demonstraui. Nunc ve-
 rò, cum multi malitiosi, inuidi ac maledici
 optimæ meæ voluntati & ardenti indefes-
 soq; meo studio, quo semper conatus sum
 summa cum fide, industria ac animi integri-
 tate, sine vilo fuco vllisq; pollicitationibus
 vanis ac imposturis, in mea, quam exerceo
 arte, mortalium cuiq; prodesse et Inseruire,
 varijs dolis technisue maximopere obstet,
 atq; quominus plura præstem impedi-
 ab incepto negotio desistere meritò pos-
 sem; tamen quò misellulis consulatur, &

boni ad hoc studium excitentur aditumq;
 ad exquisitiorem cognitionem assequen-
 dam adipiscantur, quæ huc pertinent par-
 tim ab alijs tradita, partim à me deprehen-
 sa, tum scriptis annotata, tum iconibus ali-
 quot, oculis candidatorum subiungere volui.
 Aliàs nisi obstiterit temporis iniuria, homi-
 numq; malitia & iniquitas, de membroru
 luxatione atq; fracturis tractabimus. Has
 bebis hîc candide lector præter cætera, fi-
 guras duas, quarū altera Scheleti pueri di-
 midium annum nati anteriorem, altera po-
 steriorem faciem, repræsentat. Secundò
 eiusdem pueri duo capita separatim, quæ
 cuiusq; capitis ossis veram figuram atq; cir-
 cumscriptionem accuratius demonstrant.
 Quò verò ossium in vtero exordium incre-
 mentumq; & post generationem, ad gran-
 diorem ætatem augmentum rectè assequi
 queas, his figuris adiungere libuit abortus
 trimestris exiccati imaginem. Ad discrimen
 inter puerorum et grandiorum ossa discer-
 nendū, adulti duo Scheleta adieci. Vltimo
 vt Galenus, qui Simiarum maiori ex parte
 Scheleta in suis libris descripsit, intelligatur
 & cum eo eius assecla, qui in verba magi-
 stri iuravit, opere pretium esse duxi & Si-
 miæ caudatæ Scheleton (nam non cauda-
 tæ mihi defuit) adijcere. Quomodo singu-
 la sese habeant, nunc breuiter declarabo, et
 primò de ossium exordio. Hippoc; de na-
 tura pueri inquit, masculi 30. diebus, femel-
 læ 42. diebus primam coagmentationem
 & coarticulationem accipiunt, & vñ pluri-
 mum hoc tempore, aut paulò breuiori, aut
 paulò longiore. Fernel: die 27. partes om-
 nes dispositæ & conformatæ quodammo-
 do apparêt, sed perfectè in maribus die 30.
 in foeminis 36. Ita sese obseruasse dicit die
 40. ciecctum foetum semidigiti, aut vt Arist:

inquit

DE FOETVS HVM: ET INFANT: OSSIBVS.

58

Inquit formicæ maiusculæ magnitudine ve-
rè ac prorsus conformatum, & cuius partes
omnes albæ ac spermaticæ cernebantur.
Talem & ego Bononiæ in ædibus Docto-
ris Arantij vidi: porro Fernelius, caput par-
erat auellanae, & maius quàm pro reliqui
corporis ratione: oculi vt cancris exerti: na-
sus, auriculæ, brachia, manus, crura, pedes,
hisq; secreti digiti: penis conspicuus, sub
quo scrotum milij magnitudine, superiora
inferioribus maiora, nullo ossium robore,
sed flexibilia quocunq; ducerentur. Hipp:
inquit postq; articulatus fuerit puer specie-
bus membrorum augescentibus, tunc ossa
duriora fiunt, & cauantur, atq; hæc à spiritu
fiunt. Porro equidem in meis ædibus Bo-
noniæ demonstraui abortum, qui digiti lon-
gitudinem habebat, hominisq; integri fi-
guram vnde quaq; exprimebat, deprehen-
di conspicuè admodum ossa bregmatis, os-
sa syncipitis & occipitis pro temporis rati-
one admodum mollia. Ossa bregmatis val-
de à se mutuo dehiscabant. Omnes artus e-
rant suis figuris expressi, sic & penis, aurium,
manuum pedumq; digiti. In abortu recenti-
ori vidi primo spinæ dorsii obscurum vesti-
gium, à qua costarum paruarum delineationes
prodibant. artus verò tanq; informes fibre
à trunco dependere visi sunt. caput pro ra-
tione corporis, valde magnum eratq; sub
longa figura, simia capiti non dissimile.

CAPVT SECVNDVM DE OSSIVM PRODUCTIONE IN GRAN- dioribus abortibus.

In grandioribus, capitis, artuum, scapula-
rum, iliorum & sacri ossa in media secun-
dum longitudinem regione, & non ab ex-
trematibus generationis, siue ortus prin-
cipium ducunt: inde verò vtrinq; versus
principiorum extremitatumq; fines, cres-
cendo prolongantur dilatantq; donec
adiustam magnitudinem longitudinemq;
peruenerint. Quædā ossa non ab vno tan-
tum loco, sed à diuersis partibus inchoan-
tur, ita vt ante eorum perfectionem in plu-
rima diuisa appareant, huius generis est os
occipitis, syncipitis, os ilij, os sacrum, verte-
bræ omnes: in primis prima et secunda col-
li vertebra, nonnulla ossa vt pedij, calcis, ta-
li, carpi et sterni primò ligamentosa, deinde
cartilaginosa informataq; ac nulla figurā
discreta existunt. Processus in principio nul-

li, nullæ appendices, foetu crescente fiunt
cartilaginosa hæc extremitates ossium, ma-
gisq; efformantur, deinde certo tempore
post procreationem in ossa conuertuntur.
commutatio siue conuersio hæc processu-
um appendicumq; non incipit ab osse, cui
connectuntur, sed à centro, vbi primo os-
seam & spongiosam acquirunt substanti-
am. hæc substantia crescendo augetur in-
crementumq; sumit, ab interiori parte ad
exteriorem, siue à centro ad circumferenti-
am, vnde contingit, quòd ob cartilaginem,
qua vnde quaq; tecta ac inuoluta sunt, diffi-
culter cernantur, eodem modo etiam ne-
gotium in ossibus carpi & pedum sese ha-
bet. Notandum, quòd omnes appendices
per Synchondrosim ossibus in adultis con-
glutinata, primò cartilagine fuerunt. Hæc
de abortibus in genere. aggrediar nunc
singulas partes à capite exordiando, descri-
bā ossa pueri, cuius duas hic habes figuras.

TERTIVM CAP: IN QVO AGITVR DE SCHELETO PVERI DIMIDII dij anni, & plura habet capita, quo- rum primum capitis futu- ras tractat.

In capitis futuris obseruandum, quòd
non sint veræ futuræ, sed potius harmo-
niæ, præter futuras vel harmonias adu-
lorum caluarijs communes, pueri peculiarem
habent, quæ os frontis in duas æquales par-
tes diuidit, ingrediturq; in harmoniam dor-
sum nasi separantē. Sagittalis futura in in-
fantibus à Fallopio semel visa est per medi-
um ossis occipitis, vsq; ad spinalis medullæ
foramen peruenisse. Coronalis intercipi-
tur à membranosa caluariæ parte in pueris
pulsatili, quæ B tendick & font anella vo-
catur. Lambdois harmoniæ G processus se-
quuntur ossis occipitis partes, quas primò
H laxis latisq; membranæ ac ligamentis am-
plexantur. Temporum ossa, cum ex dua-
bus partibus in admodum teneris corpori-
bus constent, etiam C futuram consequun-
tur, quæ hanc partē ab alia diuidit. Superio-
ris maxillæ lineæ siue harmoniæ, adultorū
harmonijs respondent. Inferior maxilla in
medio, vbi mentum est, D scissura, siue li-
nea diuiditur.

CAP: SECVNDVM DE CAPITIS OSSIBVS.

HH 3

Capitis

- C**apitis ossa in recentem natum admodum tenuia flexibiliaque sunt, A latis futuris siue harmonijs, quæ membranarum expletæ e-
 3. A. rant, à se mutuo distant, B Vbi sagittalis in coronalem terminare debuit, satis amplo spatio calvaria osse caret, loco ossis membranarum impense crassam & densam, quæ temporis successu ossea fit, consequitur. Locust hic membranosus, vocatur fontanella.
 4. 5. A. A Occipitis os in pueris nuper natis ut plurimum ex quatuor conflatur partibus, numeris notatis, ad annum usque ut Fallopius inquit, primum, 1. Prima est tota ea ossis amplitudo, cui hæret cerebellum, quæ à veris Lambdoidis cruribus continetur, hæc semper una est, neque unquam in duas partes diuisa, Fallopius tamen semel diuisam vidit, apparet etiam in summo apice aliquando sectio quædam, huic additur 2. secunda
 4. 2. 3. & 3. tertia, quæ foraminis magni latera efformant, & continent coronas, ab lambdoidis additamentis describuntur, 4. Quarta & vltima pars ea est, quæ secundam & tertiam copulans, foramen anteriori in parte perficit. describitur hæc ab externis additamentis lambdoidis futuræ, atque etiam à linea illa, quæ additamenta coniungens, occipitios, à cuneiformi discernit. Diuisionis huius & laxarum coniunctionum, in primis occipitis ossis, & frontis beneficio contingit inter pariendum, quod caput in angustum compressum, facilius prorumpit, partumque reddat faciliorem: colligantur enim mollibus, latis, laxis, flaccidisque vinculis, futuris atque commissuris, ex hoc error fit conspicuus illorum, qui uolunt parturientibus ossa pubis à se mutuo abscedere, ac rursus post partum recolligi atque uniri.
 1. A. A Bregmatis ossa in pueris integra sunt, sed ubi in superiori capitis parte, ubi fontanelam puerorum esse dixi, congregiuntur in adultis, tantum desiderant, quantum spatium intermedium occupat. E Temporum ossa admodum pueris diuisa sunt in duas
 1. 2. 4. 5. E partes, quarum altera E squamosa est, 1. 2. 4. 5. F altera videtur constituit ossis petrosi, siue organi auditus magnam partem, in vitulis, agnis, & hædis hæ partes disiunctæ sunt. In adultorum caluarijs intus inter os petrosi & squamosum manifesta futura videtur, foris verò nulla conspicitur separatio. Meatus auditorius, siue canalis externus non vndeque in pueris osseus est, sed quasi omnino cartilagineus, & ad septi-

mum usque mensem post procreationem, se-
 iungi potest. Ossicula parua auditus, à principio ætatis, eiusdem quasi sunt substantiæ magnitudinis ac formæ, quæ in extremo vitæ, Basilare siue cuneiforme os quatuor in puerulis consequitur partes, per quatuor numeros distinctas in quinta figura, quarum duas constituunt 1. 2. alares processus, 1. 2. 3. tertiam sella glandulam pituitam excipiens, 4. quartam pars visorij nervi destinata, quæ non longe post natiuitatem coalescunt. Notandum quod cavitates in osse frontis supra nasi dorsum, sub sella in osse Sphinoidi, in osse mali, in mamillaribus processibus, alijsque in locis, quæ in adultis satis magnæ atque amplæ existunt, in pueris vel desiderantur omnino, vel minores sint, ut & processus omnes tuberaque intus vel foris prominentia, multis annis post primum crescunt, cavitates ossis mali cum generatur, tenuissima pellicula in interna facie vestitur, ac sæpius mucore repleta est. Superioris maxillæ ossa ossibus adultorum figura, & numero, et situ respondent, nisi quod alueoli à dentium radicibus necdum in pueris genitis efformati sint, D. Os cribriforme siue ithmoide, totum cartilagineum est in pueris, septum verò huius primò fit osseum, & longè post reliquæ partes indurantur. Inferior maxilla in D. duas partes est D. 1. scissa, ut harmonia, quæ post multos annos aboletur, demonstrat.

CAPVT QVARTVM DE DENTIBVS.

Infantium dentes, & dum adhuc in vtero sunt, & diu post, constant ex mucore quodam folliculo induso, dentis formam radicibus priuatam exprimente. Mutatio hæc exorditur ab extremis apicibus siue extremitatibus, inde ambitus dentescere incipiunt, ut mucor totus, siue rudimentum dentium incrustatum appareat. Sic semper ab extremo ambitu sensim pededentimque dentis substantia incrementum sumit, donec tota in dentem sit conuersa. hi dentes in vtero generationis primordium consequuntur, mense post natiuitatem primò prorumpunt, & 7. ætatis puerorum anno excidunt, & ab illo tempore inchoant noui dentes prioribus succrescentes, qui radicibus suis alueolos integros efformant. Postquam dentium procreatio longè diuersa est ab

est ab ossium generatione, siquidem ossa fiunt per intercessionē cartilaginum, dentes ex conuersione mucoris in dentium substantiam, nullo interueniente medio, opinor dentem non esse os, sed proprium aliquod corpus osse durius, candidius & solidius: reliqua cū ex instituto aliquando de dentibus agetur, exquisitius, nunc ad rem nostram.

CAPVT QVINTVM DE
OSSE HYOIDE ET VERTEBRIS.

Ossis hyoidis si quæ sint partes, sunt admodum molles, & vix ossis nomen merentur. Vertebrae omnes duabus primis colli exceptis, vnius anni spatio ex tribus partibus compositæ manent, quarum ^{1. 4.} prima ^{1. 5. 6.} corpus vertebrarum, & reliquæ duæ sacrae fistulae latera constituunt atque processus promunt. De prima vertebra Fallopius sic loquitur, hæc in pueris, qui maturè orti statim mortui sunt, mihi visa est ex 5, constare partibus: in aliquot alijs ex 3, tantum, cum ex 5, tales erant, Prima illa erat, quæ anterior loco corporis collocata cum dente ligatur, Secunda & tertia laterales sunt, in quibus cum inferiores, tum superiores sinus insculpti sunt, hæc partes multoties cartilaginosa sunt visa. Quarta & quinta illæ erant, quæ reliquum totum foramen perficiebant. hæc Fallopius. In his præsentibus figuris tres tantum conspiciuntur primæ colli vertebrae partes, quarum prima, quæ loco corporis huius vertebrae est, tota cartilaginosa existit, duæ aliæ latera efformant foraminis. Secunda colli vertebra præter tres partes reliquis assignatas, & tertiam acquirit, quæ dentem efformat. Tota vertebrarum spinosa pars à posteriori parte primò est omnino cartilaginosa, deinde ossea fit, appendicis modo reliquis partibus agglutinatur, in præsentibus figuris 2. 2. scissio per medium adhuc conspiciatur. Transuersi processus vertebrarum thoracis, antequàm indurescat animal, multa donantur in extremis cartilagine, qui denique ossei facti & tuberculum, & sinum cui inferitur, costæ efficit, estque appendix processuum.

CAP: SEXTVM DE OSSE
SACRO ET COCCYGIS.

Os sacrum conflatum ex quinque vertebrae à se mutuo per cartilagine, ut lumborum thoracisque vertebrae, separatis: hæc vertebrae, ut ceteræ etiam tres, consequuntur partes: spina verò ex rectis vertebrarum processibus conflata, in osse sacro magis cartilaginosa est, atque in vertebrae dorsique verò laterales partes, ubi in spina coniungi debent, latius dehiscunt, s. Coccygis os vni de quaque cartilaginosa est, & minimè diuisum. Succedente ætate, in quatuor separatur partes, quando os sacrum ex 5, conflatum vertebrae: in tres secatur, cum os sacrum 6. continet vertebrae. Cartilaginee hæc ad septimum usque annum naturam suam seruant, postea osse redduntur & consolidescunt in vnum os.

CAPVT SEPTIMVM DE
COSTIS ET SCAPVLIS.

In costis ut ferè in omnibus alijs ossibus, omnes appendices primò sunt cartilaginosa. Scapularum ossa cum præcipuis ossibus in vtero primò etiam generantur, in præsentis Scheleto satis perfecta sunt, nisi quod processus appendicisque cartilaginosa sunt, in primis & cervicis maior pars, mirum acetabulum humeri cum processu anciroidi.

CAPVT OCTAVVM
DE STERNO.

Sterni ossa omnia cum cartilaginibus, ad costas usque, vnam continuamque cartilaginem constituunt. Post, 5. ordines ossium sese mutuo in ordine sequentes generantur, in primo ordine est primus os, quod clauiculas excipit: primum os sequitur secundum & tertium, quæ multa cartilagine disuncta sunt in quarto et quinto duo sunt ossa, sed prioribus minora, hæc faciunt numero septem, Fallopius recenset octo. ossa in duobus ultimis ordinibus sensim concresecunt, & vnum efficiunt. Fallopius: quotidie inquit duriora ac solidiora redduntur, & spatio septennij distincta manent. Post septennium coniunguntur sensim paucioraque fiunt, ita ut sex tantum appareant vno facto osse ex quarto et quinto, & alio ex sexto & septimo. præterea vno hæc magis crescit, & quatuor tantum reperiuntur ossa, facto coalitu inter 3. 4. 5. 6. & septimum, ex quibus vnum ad extremum os

num os resultat. Nam quod latius & primum erat os, in hoc censu adhuc integrum manet, idem accidit secundo, & idem ultimo, cui haeret cartilago mucronata. Reliqua omnia media in vnicum os conflantur, numerusq; quaternarius resultat, qui etiam temporis cursu, ac durefcente corpore oblitteratur, cum facto coalitu inter secundum & tertium, tria tantum remanerent, accedente verò homine ad virilem aetatem, os vltimum vnitur secundo ex pluribus facto, & duo tantum remanent, primum scilicet illud, quod latius genitum est, & alterum quod ex illis septem est conflatum. Verum post consistentiae annos, quo tempore etiam capitis suturae oblitterari aliquando incipiunt, accidit, vt articulus, qui inter duo haec ossa continetur, per coalitum deleatur, et vnicum os fiat. Haec tenus Fallopius, Eustachius haec eo modo confirmat. Puerulorum sternum in prima generatione totum cartilagineum est, & prorsus continuum, nullaq; linea distinctum, vbi autem in os formari incipit, celerius ossium speciem superiores, quam inferiores, & mediae secundum latitudinem citius, quam extremae partes assument. vnde fit, vt cartilagine vnde quaq; comprehensa eiusmodi ossis partes, quasi plurimum in tabula nodorum speciem praeseferant. quando autem foetus in lucem aeditur, inferiores sterni partes adhuc cartilagineae sunt, & diuisionem nullam habent, deinde etiam ipsae eo modo, quo exposui, ossae euadunt, ac tandem ad summum sex tantum particulas transuersa linea à costarum cartilaginibus protracta incisas, sternum obtinet. quibus etiam antea numero illam quae mucronatae cartilagini praest, Nam cum inferiores costae semper minus distent insertione, quam superiores, sexta, qua ossi pectoris per articulum committitur, adeo septimae est vicina, vt quia ipsam tangit, nulla prorsus aut diuisione, aut linea eius gratia incisa in sternum, dum euadit osseum, remanere possit. Euenit frequenter, quod alij non animaduertant, vt haec ossa primo & vltimo excepto, omnia scilicet quae in medio sunt, aut certe eorum aliqua euidentissima linea, secundum eorundem longitudinis medium, modo recta, modo oblique protracta, diuidantur, quod fit vt sterni partes aut decem, aut nouem, aut octo, aut septem frequenter numerentur. Numerus ossium sterni in adul-

tis varius est, & modò quatuor, modò tria sunt. aboletur prius linea in infernis, quam in supernis partibus, & etiam quandoq; (quod alij non dicunt) sternum in medio lato foramine est peruium. Haec de sternum.

CAPVT NONVM DE HUMERO, BRACHIO, FOEMORE & CRURE.

In humero, brachio, femore, & crure ossium appendices sunt cartilaginosae, & non exquisitè forma propria circumscriptae, in humero processus corona cum sigmoidi cavitatem est cartilagineus: at citò conuertitur in os, atq; appendicis species citius, atq; alijs in locis aboletur.

CAPVT DECIMVM DE BRACHIO ET EIUS partibus.

Vlna posterior processus gibberus, vel cubitus dictus, ad septimum annum appendix est & quasi cartilagineus visitur, post septimum durefcere incipit, ac osseus penitus factus, reliquo ossi agglutinatur.

Carpi ossa dum foetus nascitur, ex vna cartilagine conflantur, postea ossa fiunt, ac à se mutuo disunguntur, primò spongiosa fit substantia, vt reliquorum ossium, quae ex cartilaginibus ossa facta sunt, octauum carpi os vltimò fit osseum.

In digitorum tum manuum tum pedum ossibus, processus siue capita coarticulationis causa facta, omnia sunt cartilaginosa.

CAPVT VNDECIMVM DE OSSE ILII.

Ilij ossa in pueris ad septennium ex tribus conflantur partibus, vnde antiqui hys rectè tres diuersas assignarunt partes, et cuiq; parti propria indidit nomina. harum prima & maior totam amplitudinem ilij in se continet, & cotylae etiam superiorem partem efformat. Minus est, quod ad pubem pertingit, & partem anteriorem cum cartilaginis satis magna portione in media portione pubis constituta, occupat: infra constituit partem dimidiam foraminis ilij, quod omnium maximum in hoc esse visitur, & à lateribus versus primum os cotylae an-

DE FOET: HVM: ET INFAN: OSSIBVS.

1.2. tylæ anteriorem efformat partem, in parte inferiori & anteriori iam dicti foraminis à tertio ossē, multa cartilagine dirimitur. Tertium quoad magnitudinem ipsam, mediū est inter primum et secundum, totamq; huius partis illij posteriorem & inferiorem regionem occupat, acetabuliq; in feriore, posteriore, & quasi totam mediam partem complet. Vnde factum est, quod cavitās ischij potius & coxæ, quam ilij ac pubis dicta sit. hoc item tertium os magni foraminis totum superiorem, posteriorem, & dimidium quasi ambitum in se habet,

CAP: DVODECIMVM DE FEMORE, TIBIA, FIBVLA & pede,

1. Femoris, tibiæ & fibulæ ossa nihil variant ab adultis, nisi in appendicibus, & processibus. Patella in principio tota cartilaginosa est, et pluribus mensibus talis manet deinde ossea fit.

1. "In pede omnia tarsi ossa ad plures menses, veluti carpi ossa, cartilagine sunt, calcis osse excepto, quod in medio quid ossei continet. In presenti scheleto ossa calcis, tali, cubiformia tessaræq; non vnde quæq; cartilaginosa, sed in medio ossea informiaq; existunt, attamen ita cartilaginibus impli-

cantur, vt visu discerni, nisi ablata cartilagine, detecta fuerint, nequeant.


CAPVT XIII. DE SESAMOIDIBVS OSSIBVS.


Sesamoidia cartilaginosa permanent ad ætatem quasi consistentem, duobus exceptis, quæ in pede sub pollicis primum articulum reperiuntur. hæc enim non longè post natiuitatem obdurescunt, sensimq; ossea euadunt.


CAPVT XIII. CONTINET EPILOGVM.

PVtandum hinc non est, naturam in his ad stabilem immutabilemq; normā astringi, cernimus enim magnam diuersitatem tum in numero, tum in duritie, tum in perfectionis tempore. vtpote mollia, humida laxaq; corpora à principio molliora, ac plura consequuntur ossa, eaq; tardius, atq; in duris perficiuntur, absoluunturq; immò quod magis est, in duris, vtpotè in rusticis, baiulis & similibus, item in senibus vidi ligamenta quædam, ac cartilagine aliquot, in primis verò laryngis omnes osseas esse redditas. At quæ superius de infantium ossibus annotavi, vt plurimū ita sese habent.


FINIS.







V.C.D.



63

ANALOGIA OSSIVM HV-

MANORVM, SIMIÆ ET VERÆ, ET CAV-

DATAE, QVÆ CYNOCEPHALI SIMILIS
est, atq; vulpis,

DE HVMANI COR-
poris & simiæ ossium con-
venientia traditurus, potius
sceleti simiæ imaginem, q̃
cynocephalis hîc adiungere
debuissẽ, at quia nunc mihi defuit, nequi-
ui, Simiam caudatam simiæ substituere pla-
cuit eouſq; quò veræ simiæ, quam indies
expecto, iconem nactus fuero, incitavit me
ad hoc primò similitudo, quæ vtriq; inui-
cem est, si non æqualis, tamen magna: de-
inde Galenus, qui multis in locis libr: Ana-
tomior: administrat: & de vsu partium
Simias caudatas cū non caudatis confert,
& ita legenti non leues tenebras offundit.
Quò itaq; & in Simiæ defectu quid habeas
simiæ quàm simillimum, & melius te ex Ga-
leni scriptis explicare queas, potius esse du-
xi caudatam adferre simiam (cuius copia
mihi est) quàm nihil, deinde quò discrimẽ
cognoscas inter animalia hominibus simi-
lia ac dissimilia, primò de simiæ & hominis
in ossibus affinitate ac discrepantia, deinde
quibus in ossibus cynocephalidis simiæ
vel similis, vel dissimilis sit, breuiter declara-
bo, pleraq; ex Galeno et Eustachio, qui soli
de his tradidere, mutuabor. mea verò (quæ
quàm tenuia sint agnosco) interponam.
Vltimò corollarij loco adiungam animad-
uersione digna in vulpe, cui magna interce-
dit cum canibus, lupis, et id genus alijs simi-
litud.

CAP: PRIMVM DE DIFFE-

RENTIA VNIVERSALI HVMANO,
rum, & Simiarum os-
sium.

Galenus 6. de vsu partium cap: 3. inquit,
qui anatomiam addiscere velit, primò
seſe exerceat in simijs & præcipuè in his ip-
ſis, quæ ad hominum figuram propius ac-
cedunt, deinde in animalibus simiæ confi-
nibus, quæ vocantur *ἰσθητόεσσιν* simijs simili-
ma, his succedunt vrsi. In simijs, quia nul-
lum animal est, quod hominis figuram ma-
gis exprimit atq; simia, vnde Galenus vo-

cat simiam, hominis ridiculam simulationẽ.
Ex actionibus, quas obeunt, & figura par-
ticularim, quam singula extrinsecus habere
videntur, nonnulla de structura ipsorum ti-
bi indicatio defumetur. nam particular, quæ
simili munere funguntur, & eandem foris
figurã obtinent, necesse est eandem quoq;
interius structuram sortiri, ità verò iſs, quæ
similem actionem obeunt, similemq; figu-
ram exteriorẽ repræſentant, similis nimi-
rum & interna particularum natura tota
exiſtit, quippe natura cuiq; animanti cor-
pus animi affectibus idoneum condidit,
atq; huius gratia simulatq; nata fuerint,
omnia particulis vtuntur tanquàm à magi-
stro edocta, quemadmodum simia, quæ
animam habet ridiculam, corpus ob id con-
ſequitur ridiculum: ità homo quod habe-
ret animam rationalem, ob id & corpus
ſolum inter ea, quæ ſupra terram ſunt, ha-
buit diuinum, atq; optimè ad animæ poten-
tiam ac facultatem comparatum. Quòd ſi-
mia operationes humanas exprimat Gale-
nus viſus teſtimonio demonſtrat, inquit ea-
nim, ſi quandoq; ſimiam conſpexeris ere-
ctam currentem, ſtatim ex longinquo hanc
ſimilẽ homini exiſtere cognolceſ, ſed cur-
rit hominis claudicantis modo, in princí-
palioribus partibus manca eſt. Partes in ſi-
mia humanis partibus ſimilitudine respon-
dentes à Galeno in genere recenſentur:
facies rotunda, dentes canini parui, col-
lum breue, latum os pectorale, ſed anguſti-
us homine, clauæ longiores, ſcapulæ hu-
manis ſimiles, coſtæ magis atq; alijs quadru-
pedibus, minus atq; in homine curuas, ar-
tus quatuor, quorum primis ſuè anteriori-
bus loco manuum & pedum fruuntur.
Galenus 13. de vsu part: meritò etiam ſimia
vt in cæteris, hominis ridicula imitatio in
pleriq; eſt, ita & in artubus inter vtrumq;
genus eſt ambiguum, neq; enim penitus
eſt bipes, neq; quadrupes. quatenus bipes,
claudum, quatenus quadrupes, mutilum ac
tardum. Porro verò vt & internarum par-
tium ſimilitudo intelligatur, huc adferam,
quæ Galenus primò de anatom: adminiſt:

II 3 scribit,

scribit. Quod in tentorijs præstant pali, & in ædibus parietes, id in animalibus substantia ossium, quippe ad huius imitationem cætera in animante solent effingi mutariq; ut si maxillæ fuerint parvæ, faciesq; tota existit rotundior, necessario quoq; ipsarum musculi parvi erunt, pari ratione si longæ, longa statim huiusmodi animali erit tota facies, eiusq; musculi tales erunt. Quapropter quidem & simia inter universa animantium genera, tum visceribus, tum musculis, tum arterijs, tum venis, tum nervis, (quoniam et ossium forma, quam figura corporis representat) homini est simillima, hæc Galenus. Nos fatemur partes ossibus colligatas, ita ut Galenus hic tradit sese habere, sed ob id & viscera simiæ hominum visceribus assimilandam, non sequitur, multo minus res ipsa demonstrat, nam simiæ intus, & partibus nutritorijs præcipue canibus potius, quam hominibus similes sunt: porci vero inter omnia animalia visceribus, hominibus quam simillimi, Galenus etiam libentius viscera in suis demonstravit, dicit enim, nam Simia in istiusmodi sectionibus nihil amplius obtinet, & Simia est in spectaculo odiosa: hæc de Simia in genere.

CAPVT SECVNDVM DE
DISCRIMINE SIMIÆ VERÆ
& caudatæ.

Nunc de Simia caudata, quæ cum hominibus siue feris in Æthiopia caninis capitibus præditis (vnde cynocephali vocantur) similis sit, quibusdam cynocephalis vocatur, nonnullis vero ob affinitatem, quam corporis figura cum simia habet, Simia: ob caudam, qua notabiliter à Simia differt, caudata nominatur, à nonnullis ob dentium caninorum longitudinem maiorem, & cum dentibus canum similitudinem, cynocephalis dicta, Gale: Quæ Simia cynocephalos imitatur, quoniam amplius simia & manifestius ab humana specie degenerat, evidentem quoque ossium dissimilitudinem sortita est, habent enim rostrum longius, & dentes caninos longiores, minentioresq; atq; Simiæ, deinde vix consistunt rectè, tantum abest ut ambulare, vel currere possint: vnde Galenus inquit: cynocephalim

natura, inter Simiam & canem medium esse animal. Nunc particulatim à capite auspicando, omnes partes ad calcem usq; quam diligentissimè expendam.

CAPVT TERTIVM
DE CAPITIS ET PHARYNGETRO.

Diante Simiam capite ob rotunditatem faciei, homini valde similem, cynocephalim longius habere caput, reliqua, ut vulpis, canes, lupi, taxi, quanto figura magis recedunt à capite humano, tanto & ossa capitis singula. Eustachius de futuris capitis ita scribit. Sutura, quæ duarum ferrarum congressum Galeno representant, aut confutis rebus similes apparent, aut varios littoris angulos multiformesq; geographorum lineas, in contracta pagina descriptas elegantissimè imitantur, in hominis cranio elegantissimè apparent, lineam siue harmoniam potius, quam futuram intrà referunt, in simiæ calvaria ubiq; adeo obscuræ sunt, ut magna ex parte futurae nomen, aut nullo modo, aut vix mereantur. hæc Eustachius. Equidem nihil certi de his futuris affirmari posse (saluo honore Doctoris Eustachij hoc sit dictum) opinor. Siquidem ut in humanorum craniorum futuris, quæ pro temperaturis, sexu & ætate, sese mutant, varietatem incomprehensibilem cernimus, ita & in Simiarum calvarijs vsuvenire credendum est. In hac caudata squamiformes futurae desiderantur omnino, aliæ parum ab humanis differunt. Frontis os in calvaria basis sede, qua ab ossis cuneiformis parte, quæ opticis nervis destinata est, transversa potius linea, quam futura distinguitur: ampla oblongaq; scissura homines divisum obtinent, in quam & aliud instar cribri perforatum, & anterioribus cerebri ventriculis prælocatum conjicitur, arctissimeq; constringitur, ea in parte in simia os frontis continuum omni ex parte existit, & qua nasus principium sumit, non longè ab ea sede, quæ frontem constituit, alto & rotundo foramine parumper à lateribus compresso, illo foramine, quod nervum visorium emittit, nonnihil ampliori, excelsius est. in eius humiliori profundioriq; sede quatuor

tuor aut quinque alia foramina recta & lata cernuntur. Colatorium os in simia caudata admodum profundè in nares descendit, nimirum paulo infra eam regionem, qua nasi dorsum incipit, harmonia per medium diuidi & ab osse frontis, quod tam profundè descendit, efformari videtur. Osis sphinoidis pars glandulam pituitæ excipiens sella dicta, in cynocephali multo profundior est, atq; in homine. Eustachius inquit in Simia non est superficies ab hac sella ad narium principium in osse frontis plana & æqualis, ut in homine apparet, sed hæc pars eminentissima, illa humilis admodum ac decliuus. In cynocephali eodem sese habet modo. In posteriori ovis sphinoidis sellæ eminentia glandulam amplectente, reperitur foramen exculptum, quod in præsentia caudata non conspicitur, sed eius loco lamina ossea, reliqua circumferentia tenuior, qua videtur hoc obductum. In sellæ huius substantia nulla latet cauitas, ut in homine, cauitates illæ, quæ in proceritatibus ovis sphinoidis, alis vespertilionum similibus exculptæ sunt, in simijs maximæ sunt & satis profundæ. Os frontis in cynocephali humanæ frontis ossi simile, nisi quod secundum faciei longitudinem sese magis atq; in fronte exporrigat. A Ossa bregmatis & temporum nec intus, nec foris ullam demonstrant diuisionem, vel separationem, sed ex unico osse constant. Temporis ovis petrosa pars in hac cynocephali, intus vndiq; linea ita circumscribitur, ut peculiare os separatum à squamiformi ovis temporis parte conspiciatur. in anteriori & superiori ambitu processum obtinet tenuem, instar alæ reflexæ. Foris verò distinctio vel separatio à squamiformi non ita, ut intus apparet, & vndeque diuersam ab humano osse petroso consequitur figuram, utpote non ut præruptæ rupes aspera inæqualisq; inuenitur, verum insigni tubere eoq; rotundo & æquali donatur, qui ab auditorio meatu vtrinq; exorditur, & inde oblique deorsum, antrosum versus descendendo extenuatur, quoad ad alares ovis sphinoidis processus terminetur. Hoc os petrosum in hominibus duas apophyses habet, quarum altera papillæ mamillarum similis est, altera verò stylum seu colum-

nam sua proceritate eleganter imitatur: in simia prioris nullum quasi vestigium cernitur, posterioris verò adeò obscura nota videtur, ut altero potius, quàm eo nomine digna esse censei iure possit. Occipitis os in cynocephale nihil peculiare, quo ab humano occipite differat, consistit, nisi quod multo minus sit pro corporis ratione, atq; hominis: coronæ eius vbiq; sibi similes sunt, & in homine et in simia cynocephaliq;.

Os iugale, qua parte à malis procedit, in Simia crassum & robustum est, atq; eius medium linea potius, quàm futura distinguitur. In homine verò tenue existit & futura dirimitur.

Superioris maxillæ ossa in simia vndeque respondent humanis, simia enim rotunda prædita est facie, in cynocephali propter faciei longitudinem exproductionemq; prolongantur, multo magis in vulpibus & canibus. Sutura verò harmoniæ siue rimæ sunt, & inter eas illa præcipue, quæ palatum per medium diuidit vel dissecat, deinde non longè à dentibus secatur & terminatur vtrinq; inter caninum & incisorem vicinum, hæc linea in simia caudata eadem est cum ea, quæ nasi ossa distinguit, & non parum ab ea distat. In Simia non caudata futura ossium nasi ad extremum ipsorum producta est, statim alia ei succedit, quæ inter caninum & proximum sibi incisorem ducta, palatum intersecat. Inferior maxilla in cynocephali longior atq; in simia & homine est, minime in medio menti diuisa. Mandibulæ autem finis siue caput, quo articulatur cum temporis osse in homine condyli modo, rotundum est, at in simia & cynocephali gynglimi modo efformatur, & mutua huius capitis & ovis temporis exceptione fit articulatio: in vulpe magis ad hominis figuram accedit. Os gutturis, quod pharyngætron vocatur, in simia gutturis caput ambit, & recta linea secundum colli longitudinem extenditur gibbisq; ipsius laryngis partibus inuehitur, ac deniq; propugnaculum cartilagini, scuto simili, efficitur, in illa enim lata oblongaq; apophysis inferiorem partem ovis alteram referentis efformat, quæ deorsum adeo producit, ut instar clypei gutturis cartilagini, quæ scuto similis est, obducatur.

CAPVT QVARTVM DE
COLLO ET COLLI VER-
tebris.

Simia vt homo collum habet breue, sic & caudata. Sunt enim vbiq; septem, eaq; pro ratione corporis vt numero, sic magnitudine æquales: in vulpe sunt quidem septem, sed superioribus tum figura, tum magnitudine, tum processibus inæquales admodum. Simiæ tam caudatæ quàm non caudatæ vertebrarum anteriori in regione, non vt hominum rotunda, sed e plana consequuntur corpora. Processus recti, qui spinam constituunt, non sunt in his duobus quadrupedibus, sicuti in hominibus bifidi & longi, sed simplices, breues, & acuti. Primi verò spondyli spinæ nullum vestigium in simia apparet, immo nulla asperitas sentitur in hominibus. Sedes illa aspera est, obtusum obtinet angulū, ac etiam in multis ea parte processus eminet illo maior, qui in eius vertebræ anteriori sede extuberat, atq; nonnunquam inchoatæ spinæ mucro apparet. In anteriori parte corporis primæ vertebræ cervicis humanæ obtusa quædam eminentia apparet, siue apophysis, in simia apophysis illa magis extuberat, & in acutum aduncumue finem producit. Processus transversos vtrq; simia, vice versa consequitur longiores, atq; ad anteriora magis, quàm homo reflexos, in primis verò sexta colli vertebra, quæ hunc processum præ ceteris insigniter obtinet, & magnum & bifidum, magisq; atq; cæterarum vertebrarum transversus processus, antè recurvum atq; aduncum à principio sui exortus tenuior atq; minor est, quàm in extremitate, siue fine.

Eustach: sexto spondylo colli in vtrq; simia transversæ proceritates duplices manifestè existunt, cæterarumq; omnium maximæ, sicut & ipse spondylus maximus est in simia, in caudata minor est sexta. Septimi spondyli transversus processus simplices & tenues, in caudata bifidi & satis longi existunt, qui tamè in homine, quàmvis simplices sint, sexto crassitie nõ cedunt. Prima simiæ vertebra cum caudatæ eadem vertebra, ad finem processus transversus ascendens vtrinq; consequitur foramen, ad nervum transmittendum, quo humana vertebra caret. Septima colli vertebra in ho-

mine venæ & arteriæ causa ferè semper est perforata, in simijs vt Gal: inquit, per quàm rarò, in presenti caudata minimè: vnde cœnit quòd transversales processus non similes sint processibus transversalibus colli vertebrarum, sed potius thoracis vertebrarum processibus transversalibus. In vulpe, canibus & similibus longius reperitur collum. Sunt autem 7, vt in homine & simia vertebrae colli, sed tamen tum forma, tum magnitudine, tum processibus differentes. videntur respondere, vertebri lumborū simiæ, Ascendentes et descendentes processus quo quomodo sunt similes, transversales nulla ratione, recti spinam constituentes vt in homine, & simia descendunt, sic hîc in vulpe ascendunt, & inter hos vltimi magis, quàm primi, primarum colli vertebrarum, recti processus nulli vel exigui sunt, vltimarum maiores, excipiuntur hi processus, si quando animal collum versus dorsum inflexerit, vel caput erexerit, à cavitæ siue scissura oblonga vertebræ superincumbentis.

CAPVT QVINTVM DE
THORACE ET PARTIBVS THO-
raci annexis.

Gal: & cum eo Eustachius inquit, homo pectus habet latissimum, costas admodum curvas, scapularumq; articulos longè à thorace abductos, ideoq; quatuor artibus incedere, ne si velit, quidem potest. Sed simia post ipsum habet latum pectus, et claves longiores, quæ vna cum scapulis humanas maxime imitantur: indeq; fit, quòd humeri articulus à thorace plurimum distet, vt & simia quadrupes mutila sit & tarda, Galen: 13, de usu part: inquit, quòd ad scapulas & claviculas attinet, simia homini maxime est similis, quamvis ea parte homini similis esse non debebat: nam quòd ad ambulationis celeritatem attinet, simia inter vtrumq; genus ambigit, &c. Clavicula in simia à pectoris ossè ad medium ferè costę procedit, inde ad acromium vsq; multum curvata intumescit, vbi verò curvata est, principio anciroidis processus adhæret, siue adnascitur. Os cartilaginosum clavem cum scapula connectens, & acromium vocatum, in pueris exactissima cartilago est: quæ licet procedente etate ossèa euadat, nihilominus ad 18, annū multū eius substantiæ retinet

tiae retinet & nunquam cum scapulæ spina adeo connascitur, ut in media ætate, parua occasione (ut Galeno in palestra cõtigit) luxari non possit, in simia nullum vestigium appendicis apparet, imò robustior illa proceritas censi debet.

De costis Galen: in Hip: lib: de articulis ita scribit: Homo ex omnibus animalibus costas curuissimas habet, propterea quod homini latissimum contigit pectus. Simia verò latius cæteris, sed homine angustius. Animalibus tamen omnibus commune est, quæ thoracem habent, ut costas ab exteriori parte, qua attingere eas possumus, in curuas et conuexas, ab interiore concavas habeant. Nam ad amplitudinem thoracis efficiendam, hominibus hoc necessarium fuit: quia enim ad pectus directæ esse debebant, in reliqua tota parte incuruari eas necessum est, si ad spinæ vertebrae eis erat deueniendum. In Simia æquæ caudata quàm non caudata 26. sunt in vniuersum costæ, cum in homine 24. tantum reperiantur. Harum vtrinq; 8. sunt veræ costæ, quæ sterno per articulum committuntur, quinque verò nothæ siue spuria, quæ non ut in homine, in quo in exactissimam finiuntur cartilaginem (cuius beneficio inuicem & cum septo transuerso vniuntur) sed ossæ magis, quàm cartilaginosa à se mutuo separata apparent, hic introsum versus sunt reflexæ: costæ in simia & caudata, & non caudata spatijs vertebrarum intermedijs inseruntur, in hominibus magis corporibus vertebrarum attexuntur. Vertebrae thoracis tota corpora non admodum inter sese sunt dissimilia, processus in thoracis vertebrae tui similes, tum hominis, parum vel nihil inter sese differunt, exceptis rectis processibus, et posterioribus ultimarum duarum vertebrarum, in quibus hi in simijs rectiores, atq; in hominibus sunt, in hominibus magis descendunt. In Simia caudata, non caudata, & cane postremis in thoracis vertebrae reperiuntur 4. inferne apophyses articuli gratia factæ. Sic & in lumbis: in humanis verò his vertebrae tantum dug. Vulpes angustius pectus habent, & clauiculis priuantur. Vtrinq; consequuntur costas 13. & in vnum redactis numerum 26. harum vtrinq; sunt nouem veræ, quatuor nothæ. Hæ costæ suas habent cartilagine rotundas, primæ verò breues, reliquæ longiores

consequuntur. Os sterni constat, 8. ossibus rotundis, quorum primum aliquantisper prominet supra cartilaginum duarum primarum coniunctionem, siue coalitum. Duæ hæ cartilagine videntur amplecti in superiori parte hoc primum os sterni. Cartilagine costarum commissuris ossium sterni accrescunt, duæ ultimæ concurrunt simul in articulationem ultimæ, & penultimæ ossis sterni. Vltimum sterni os ensiformem cartilaginem referens impensè longum est & teres. Thoracis in vulpe primarum vertebrarum longi processus admodum longi sunt atq; lati, sic & trium primarum vertebrarum recti, reliqui descendentes & minores & angustiores redduntur. Undecimæ rectus processus incisus incipit ascendere, sic deinceps & lumborum vertebrarum processus. Scapulæ ossa vtriusq; simia, humanis scapulis vndiq; similes sunt, vulpis scapulæ carent processibus, & figura non parum discrepant ab humanis scapulis.

CAPVT SEXTVM DE LUMBIS.

Lumbi in Simia sunt longiores, atq; in homine, nam homini duntaxat quinque, Simia & cynocephali 7. contingere vertebrae, eæque longiores. Harum vertebrarum processus differunt admodum inter sese, siquidem Eustachius inquit, transuersi vertebrarum lumborum processus in homine teretes sunt, & nonnihil in exteriora conuersi. In Simia sunt amplius intro spectantes & instar squamæ tenuis, figura verò aut caudam hirundinis referunt, aut cornu retortum, quod oblongo acutoq; mucrone erigitur, ac sursum vergit, eodem modo sese habet negotium in caudata. At tertia lumbi vertebra primò incipit transuersum consequi processum, qui brevis est, reliqui subsequentes longiores fiunt, quare discrepant lumborum vertebrae admodum à thoracis vertebrae, descendentes processus in caudata duplices existunt, & in medio subiectæ vertebrae ascendentem processum, qui vnicus est, excipit. Posteriores processus spinæ constituentes non sunt recti, sed sursum spectant, acutiq; sunt atq; excipiuntur à superius incumbentibus vertebrae, quæ hiatus siue scissura triangulari inter duos transversales processus existente, dum ad

dum ad posteriora animal spinam inflectit, eosdem processus excipiunt. obseruandum venit in homine, circa radices infernas transuersarum proceritatum spondylorum lumbi, atq; etiam duorum, qui vltimam thoracis partem constituunt quædam tubercula magnitudine figuræq; melpilorum nucleos referentia, sæpè ac sæpius reperiri: quæ cum in Simijs & canibus non habeantur, suspicarer vicem illarum, quas paulò ante descripsi, proceritatum in homine tenere. In vulpe etiam lumbi vertebræ sunt numero septem, non admodum differentes à Simiæ vertebris, sunt tamen pro ratione corporis longiores & maiores.

CAP: SEPTIMVM DE OSSE SACRO, COCCYGIS, ET ILIJ.

Basis siue fundamentum spinæ constat in hominibus ex tribus primis ossis facri ossibus, siue vertebris, quæ cum reliquis subiectis, totum os sacrum constituunt. In Simijs verò hoc fundamentum ex duabus conflatur vertebris, sic et in caudata. In vulpe vnicum os sacrum, quod duos processus longiores habet. Simiæ os coccygis longius, atq; homines habent, caudata animalia eo osse priuata, eiusq; loco caudam obtinent. Simiæ etiam ossa coccygis iuxta syn-taxim perforata habent, medullam continent, atq; nervos à posteriori & anteriori parte emittunt, at ossicula coccygis in homine nihil tale habent, his ossiculis in hominibus in extremitate multum cartilaginis adhæret, in simijs minimè. Vulpes vnicum os sacrum habent, & duos processus longiores. **L** Ossa ilij in vtraq; tum caudata, tum non caudata admodum ab humanis discrepant, dehiscunt etiam eo in loco, in quo ossa pubis esse debebant, valdè à se mutuo, vt in hac præsentī figura conspici licet, omninò priuantur osse pubis, hinc ad velociter currendum ineptæ sunt Simiæ. In vulpe ossa ilij ab hominis & simiæ tum figura, tum magnitudine valdè multum differunt. Sunt enim longa, angusta, & in anteriori parte beneficio ossis pubis, vt in homine per synchondrosim conglutinata, vnde quaq; similia existunt canū, equorū, atq; plurimorum quadrupedum ilij ossibus.

CAP: OCTAVVM DE ARTIBVS ET PRIMO DE ANTERIORIBVS.

Simiæ et cynocephalis nullis partibus æq; atq; artubus, hominis repræsentant figuram, Galen: inquit, simia semper inter vtraq; nimirum gradiendum & apprehendendum ambigit, nam ad vtraq; est constructa, tum vt manibus obuiaprehendendo non aliter, atq; reptilia scandat, tum vt in securo vestigio instar pueri currat, non enim poterat ad vtraq; rectè construi. Primo agam de anterioribus cruribus, quibus loco manuum aliquando vtuntur. Humeri os Simiæ non admodum humano dissimile existit. In caudata differt ab humano iuxta inferius caput, quo cum cubito articulatur: hac enim in regione reflectitur ab exteriori parte introrsum, atq; in illa flexura canaliculum acquirit ex opposito latere pernium. Cubiti tum radius, tum vlna in vtraq; simia humanis respondent, sic et carpus vtriusq; humano non admodum dissimilis existit, consequuntur tamè non os in carpo, de quo Eustachius ita loquitur. Hoc ossiculum non in prima brachialis acie est locatum, sed tertio eiusdem aciei ossi incumbit, atq; inter ea, quæ indicem & medium sustinent, seipsum inserit, vocatur à Galen: *os quæ & cecrops*, hoc osse videntur carere simiæ caudatæ, sed eius loco adipiscuntur fos peculiare, quod carpi ossi, cubiti ossi substrato annectitur, et satis longè protuberat, deinde instar cornicis versus manus volam incuruatur, atq; cum processu ossis carpi radio articulati in carpo magnam cavitatem musculorum ad digitos tendentium, tendinibus efformat. Metacarpj digitorumq; ossa Simiæ tam caudatæ, quàm non caudatæ ab hominum ossibus parum admodum discrepant. Galen: Simia magnū manus digitum, qui totum functionis firmamentum ipsi est, mutilum obtinet. In manu solum magnum digitum habet curatum, Manus digiti sunt multò minores digitis pedum. Pollicem in manu omnes simiæ, quæ cynocephalides vocantur, exiguum admodum habent. In vulpe, lupo, & cane, hæc ossa valdè dissimilia sunt superioribus. In carpo hoc os vltimum volam concavam constituens, satis est longum, et magis, atq; in simia caudata, incuruatum. digiti verò satis respondent simiarum & humanis.

CAP: NONVM DE CRVRIBVS.

Gale-

Galenus inquit, homo in cruribus quid peculiare obtinet, nam horum beneficio solus rectus incedit: Simia eò quod sit ridicula hominis simulatio, ob id hominis modo graditur sed in ipsis principalioribus partibus manca est, ut quæ minus recta staturam sortita est, Alio in loco ita: aliæ partes humanis positura similes sunt, atque eius gratia duobus cruribus ingrediuntur, & currunt, Itaque simiæ vel maxime homini similes, exiguo aliquo intervallo, perfectam illius rectitudinem non assequuntur. Nam & femoris caput obliquius quodammodo cum acetabulo coxæ committitur, pedes ipsi calce magis angusta constant, digitis insigni spatio inuicem discretis, Item, & Galenus alio in loco, crurum natura non est omnino recta ad spinam, ut hominibus, neque ipsius genu flexio similis est humane, hac et musculorum de causa non modo sedere belle, neque stare, sed ne currere quidem potest simia, Eustach: Galen: explicans, sic loquitur, ab humanis simia ita discrepat, ut omnium hominum syntaxim eiusmodi habeat, quæ eam stare rectam non permittat, præcipue verò ob id altè instar hominis erigi non potest, quia femoris caput obliquius in articulo coxæ committitur, in homine ceruix rotundi capitis femoris oblonga est, & sensim oblique deorsum ducitur: in Simia verò brevis & propemodum transuersa visitur. Quæ Simiæ cynocephalos imitantur, vix consistunt rectè, tantum abest, ut ambulare, vel currere possint. Sub femoris ceruice apophyses duæ, trochanteres dicuntur in simia eque, atque in homine sunt, verum in illa, ut & in caudata maiores, In alijs ossis femoris partibus nulla inter hominum et simiarum est differentia. Patella siue mola vtriusque simiæ manifestum discrimen ab humana demonstrat, Nam oblongum est, & non rotundum, & quamuis extrinsecus gibba sit atque intus caua, nihilominus longe aliter sese habet, atque in homine cernitur. nam secundum ipsius longitudinem recuruat excauatque adeò, ut nihil propemodum in medio emineat, curuo aduncoque eius sinu nauiculam quandam elegantissime referre videatur. In caudata, patella videtur ex duobus constare ossibus sibi mutuo adunatis, Adiungam hic duo ossicula, quorum Eustach: mentionem facit his verbis: Quidam Anatomi describunt duo ossi-

cula magnitudine ciceris, quæ supra vtrunque femoris tuberculum reperiuntur, quæ nimirum duo primi pedem mouentes oriuntur musculi: Nam si ea in Simijs & canibus semper occurrant, in hominibus tamè adeò raro inueniuntur, ut non modò (quod posteriores addiderunt) sepius alterum, nunc nimirum internum, nunc externum deficiat: verum etiam vtrunque ipsorum desit, & non mediocri diligentia adscribam, si post multorum cadauerum sectionem, alterum illorum quis inueniat, miraculum existimabo, si duo simul occurrant. Tibiæ vtrunque os in vtraque simia hominum ossibus simile est vndequeque. In vulpe ossa femoris similia sunt ferè vndequeque tum hominum tum simiarum, Tibiæ & fibule os valde dissimile existit, ad medium ut & in canibus & multis auibus, inuicem conuascuntur.

De simiæ pede Eustachius ex Galeno ita loquitur: Simiæ pes ab humano maxime discrepat non modo communioribus differentiis, verum etiam proprijs. oblongum enim latumque pedem ideo hominibus tribuit, canibus verò & Simijs angustum & pro cæterarum partium magnitudine, quibus firmitudo accepta refertur, breue, quia singulorum pedis ossium commensurationem diligenter intuitus, ad pedem firmandum digitorum longitudinem ac discretione parum prodesse cognouit, ideoque iunctura tarsicum planta, quæ in simijs tertiam pedis longitudinis partem vix explet, & in canibus etiam breuior existit, in homine verò medium ferè pedem adæquat, Galen: sic loquitur: Simia velocissime prensans obuia recta & leuia, manibus ascendit, sicuti mures, mustele & feles, eò quod concuum sortita est pedem & digitos plurimum fissos, istiusmodi constructio circumplicari curuis omnibus corporibus probe cum possit, et vndeque ipsa tuto comprehendere idonea est his, quæ alta perreptare nata sunt, Propterea quod concua sit planta, tuto omnino non est basis siue pedis vestigium.

CAVTV DECIMVM DE
SINGVLIS PEDVM PARTIBVS,
& ossibus sesamoidibus.

Eustachius de humano calcaneo ita scribit: Humanus calcaneus (ut Galen: animaduertit)

KK

nimaduertit

nima duertit) crassus est, sed in anterioribus partibus magis magisque grandescit, retrò longior, aut breuior existens dimensionis tertiam partem pedis metitur. At simie calcaneus angustior est, & anteriori in parte, nimirum qua cum osse cubum referente committitur, latior euadens, magisque inibi longus, quam retrò effectus, ad quartam pedis longitudinis portionem non accedit. Sic et in caudata, et vulpe negotium sese habet. Talus Galeno tenuis non efficitur, sed manens sublimis ossi naviculæ referenti coniungitur, quod certè Simiæ repugnat, quia in ea astragalus humilem, oblongam, atque tenuem cervicem habet.

Eustach: planta in Simia ex 4. ossibus componitur, pollex ex tribus, in homine planta ex 5. ossibus conflatur, pollex ex duobus, equidem in hac caudata nullam vidi, qua discreparent ab homine, differentiam.

Digitorum notissima est discrepantia, in homine enim ut Galenus inquit, omnes una serie disponuntur, breuissimoque spatio discreti, multo minores sunt, quam qui in manu habentur, nam quanto pes summa manu maior est, tanto illius digiti huius digitis sunt minores, accedit quod pollex longitudine indici æqualis sit, quæ dupla crassitudine superat, talisque est 4. digitorum com

mensuratio, ut ab indice ad minimum semper deficiat longitudo, & secundæ aciei ossa, si indicem exceperis, breuiora sunt istis, qui in tertia phalange reponuntur. Hac omnia in simia utraque aliter sese habent, in hac enim omnes pedis digiti insigni spatio discreti sunt, multoque longiores, quam in manu existunt, pollex cæteris digitis breuior tenuiorque est, atque diuersam ab alijs positionem sortitur, dehiscit etiam ut pollex in manu valde ab indice. Digiti pedis simie, et humanæ manus digitorum serie comitantur, est enim pollex in pede Simie omnibus digitis breuior, inter reliquos 4. digitos, ut in manu, medius omnium longissimus. In vulpis pede os calcis Simiæ simile, sic & os tali. Reliqua tarsi ossa dissimilia sunt. Vulpis pes quatuor digitos, & non quinque habet, horum singuli tres articulos non longe à se mutuo abscedentes. In homine ossa sesamoidia pauca sunt, magnaque ex parte cartilaginea: & si ea, quæ pollicis applicantur, exceperis, inconstanti sede firmata: in Simia verò, echino terrestri, vulpe, lupo & canibus multa atque magna occurrunt, et ossa perpetuò sunt, singuloque primo 4. digitorum internodio, & secundo pollicis gemina ferè semper annectuntur.

FINIS.

71

PARADIGMA IN EXPLI-

CATIONE PARTIVM NOSTRI CORPORIS

SEQVENDVM, AD OCVLVM AG-
commodatum.



VM MEDICVS SVMMI RERV
conditoris legem ordinemq, quo eum in procreandis, conseruandis, & gubernandis corporibus humanis pro nostra imbecillitate vti intelligimus, considerans, ad imitationem ipsius Dei suum studium, omneq, opus dirigere debeat: necessum est, vt quibus in corporis partiumq, functionibus integris conseruandis, lapsis restituendis vtitur, iisdem etiam tanquam per media & causas efficientes agat. Hoc Galenus exemplo cuiusdam artificis ædes extructas conseruantis, atq, dirutas vel collapsas restituentis luculentissimè in lib: de consti: artis demon-

strat. Siquidem vt talis artifex ædes fabricatas integras conseruare, collapsas restituere nequit, nisi omnes ædium particulas nouerit, qua substantia, qua figura, qua magnitudine, quo numero constent, atq, etiam quam inuicem compositionem habeant, per hæc enim media construuntur: ita & Medicus corpus humanum integrum conseruare, atq, à sanitate delapsum restituere, nisi partes sigillatim cognorit, quali scilicet substantia, magnitudine, quali figura, quo numero præditæ sint, quamq, inter sese compositionem habeant, minime poterit. Itidem Galenus in lib: de voce, vbi sic scribit: omnes qui ratione curare velint, ij causas actionum humanarum, quæ secundum naturam sunt, & affectionum, quæ præter naturam adueniant, illas vt tueantur, has vt è corpore extrudantur, tum verò quibus modis fiat actio, & loca in quibus obeatur, & instrumenta, quorum opera vtatur, nosse debebunt. Nam si modus actionis nobis erit perspectus, cum naturam ducem imitemur, promptiores ad opem ferendam efficiemur. Hæc cum ita sint, consideremus naturæ humanæ media. Humana verò natura interim essentiali, & propria similariū substantia, interim qualitatibus secundis, similariū substantiam sequentibus agit, veluti in ossibus duritie ad corpus sustentandum, in oculo ad videndum, coloribus. Verum vt actio concinnior redderetur, & illæsa integraq, conseruaretur, rudi similariū massæ diuersas formas, magnitudinem impressit, alias partes digessit diuisitq, in certum numerum, cuiq, suam tribuit sedem, has cum illis connexit, atq, ita interim natura ad edendas perfectas operationes vtitur substantia, siue massa hoc modo formata, tali magnitudine, & positu, ita vicinis partibus coniuncta, ita diuisa. Hæc Galenus in libro de vlu part: hisce paucis comprehendit verbis. Actio per se competit similari- bus, quarum quædam tanq, principes, quædam coadiuuantes sunt, improprie per acci- dens, & secundario, dissimilariis. Forma organicorum accidentibus ijs circumscribi- tur, quæ compositionem sequuntur. Quamuis accidentia ipsa per se non producant actiones (hoc enim formæ similariū conuenit) tamen easdem promouent, vel impe- diunt. Hinc itaq, Medicus naturæ minister, vtendi causa iisdem naturæ tanquam instru- mentis, & operationum causis, ad earum conseruationem & correctionem, superius e- numerata quam exquisitè scire debet. Sed postquam eorum præcipua & plurima intus latent, atq, sensus nostros, nisi dissecantur, fugiant, necessum est, quò in cognitionem partium substantiæ, formæ, situs, connexionum cum vicinis partibus veniat, singula quæq, per dissolutionem, & sectionem anatomicam quam exactissimè excutere, atq, in- uestigare. Oculos multis de causis, pro paradigmate in historia omniū partium sequen- do proponam. Sunt enim oculi summo artificio, si cum multis alijs conferantur parti- bus, compositi: Secundo non, nisi summa cum diligentia curari possunt: tertio dignita- te atq, vlu præstantia reliquis sensuum instrumentis longè præstant, vnde animæ fenest- ræ dicuntur, atq, hinc Philosophiam, qua nihil melius atq, maius hominibus à dijs tri- bui potest,

hui potest, partam esse inquit Plato: Cicero secundo de finibus inquit: oculorum sensus in nobis acerrimus, mirifice solet affici animus ijs, quæ per oculos ad se deferuntur, hac amor, hac odiū notatritaq; via commeant. Adde, quod oculorum inexplicabile, singulareq; artificiū, nos in admirationem summi creatoris stupendam trahat. Quis, n. si solem eiusq; lumen (omitto nunc reliquas suas facultates) intueatur, nimirum quod eo suo splendore vniuersum terrarum illustret orbem, non extrema afficietur admiratione? at si quis deinde consideret nostro in corpore ex putridis elementis soli quid simile, ne dicam eo quid præstantius efformatum esse, quis non attonitus mentem suam in cælum eriget, atq; diuinam illam potestatem sapientiamq; non reuerabitur? splendidus quidem sol suis radijs totum mundum, quod ea, quæ in mundo sunt, conspiceremus, illustrat, & ita nostris famulatur oculis, nihil tamen videt, nihilq; inde fructus consequitur: ex oculis verò nostris luminis radij emittuntur, qui permixti cum lumine externo, atq; reuerberati ad oculos, deferunt externarum rerum tum colores, tum figuras, tum magnitudines, tum distantias, quo nomine tum Sole, tum alijs sensuum instrumentis (ut ante dixi) præstare videtur. Siquidem nullum sensuum instrumentum oculo excepto, eius, quod sentit, percipit magnitudinem, formam & distantiam.

TABVLÆ OCVLORVM HVMANORVM.

73

1. Nomen siue etymologiam, oculus nimirum Græcè $\pi\alpha\rho\alpha\ \delta\ \delta\pi\tau\acute{\alpha}\nu\epsilon\pi$, id est, à uidendo $\delta\ \phi\theta\alpha\lambda\mu\acute{o}\varsigma$ uocatur.
2. Visum, qui duplex est, alter hominibus & brutis communis, alter hominibus peculiaris, utpote cum animæ humane in-
plantatum sit cognoscere singula quæq; natura illi oculos dedit, ut eorum beneficio in rerum exactam cognitionem uenire
posset: brutis communis, quò longè ante pericula euitemus, & necessaria ad uitam sustentandam cernamus. quare oculi
inter eas partes, quæ ad meliorem uitam degendam conducunt, recensendæ sunt.

3. Substantiam, sub qua comprehendo id, quod præcipuè in oculis abundat idq; est humiditas, uisus autem instrumentum
cuiusq; rei coloris, & cum his figuris & magnitudinem, situm atq; distantiam subito admittere debuit, quare natura illi
tribuit molle aliquid, quod humidum & pellucidum exiit.

Mollities & lubricitas, quò præter priorem usum, aspectum quocunq; cupiat animal facillimè conuertat,
si enim oculus non esset uolubilis, cum ea solum uidet, quæ pupillæ opposita sunt, cogeretur inter uidendum
totum caput & collum contorquere. hac etiam de causa natura in circumferentia oculos pingues fecit, per-
tinet & huc colli motus.

Splendor & perluciditas, etenim si quid uerè à coloribus immutationem recipere debet, lucidum sit opor-
tet, parum ac splendidum, simile enim simili notum ac familiare est. Anima nostra undequaq; sibi similis,
omnia munda, quamuis diuersissima sint, peragit omniaq; inter noscit, minime tamen per se agit, sed
proprijs suis instrumentis, quibus tanq; ministris & nuntijs utitur, ad res externas percipiendas. At res ex-
terne sensuum instrumentis imprimi nequiverunt, nisi hæc instrumenta cum rebus externis quandam societas
tem & similitudinem, uel (ut rectè dicam) aptitudinem, quæ ex similitudine prodit, habeant. Visus subie-
ctum est color, res lucida, cum qua per accidens rei percipimus magnitudinem, figuram, distantiam, quare
uisus instrumentum lucidum esse debet. Plato uocat uisum flammam, non mentem, quæ in oculis reperitur,
& oculis lucem præbet. quidam putant flammam oculis implantatam, quæ ex oculis aliquando emicat, &
in quorundam brutorum oculis nocturno tempore apparet.

Color oculorum diuersus est, respondet enim primo oculorum & capitis temperamento, deinde humorum
unicaturumq; compositioni.

Magnitudo, quæ oculo ad cernendum conueniebat, tanta uidelicet, quanta ad externarum rerum imagines
percipiendas sufficiebat.

Numerus duplex, natura enim ob maximam necessitatem ubicunq; potuit, duo fecit, quò uno deficiente, al-
terius defectum compleret, quare ob uisus maximam necessitatem, duos oculos nobis meritiò dare debuit.

Forma, sub qua com-
prehenditur

Figura rotunda, quæ difficilior afficitur, & omnium figurarum particeps est.

Leuitas, quo faciliè in omnem partem circumuolui possit, & ne inæqualitas in ante-
riori regione uisui quopiam obesset.

5. Ad per-
fectiorem
operatio-
nem perti-
nentia, ut

Altitudinem, oculus edito loco collocatus est, ut quemadmodum speculatores ex
muris, speculis, turribus longè ante præuident hostium incursum eiq; resistent,
sic & oculus in editiori loco collocatus, uidet notummenta, quò ea in tempore
euitet, hinc natura dedit locum editum eiusq; causa caput ceruicemq; fecit.

Anteriore re-
gionem, quam
oculi adepti
sunt duabus de
causis, &

Primò, cum animal antrosum mouetur, facile in noxiū quod-
dam impingere posset. ut uerò hoc euitet, in anteriori, et non
in posteriori regione sunt collocati.

Secundò, omnia sensuum instrumenta molles neruos deside-
rant, qui à cerebello produci nequiere. nam longum iter per
osseas partes facientes compingerentur, ac condensarentur,
ita ut ad motum quidem, sed minime ad sensum apti forent.
præterea à cerebello cerebro multo durtiore, molles nerui ad
sensum idonei produci nequiere, sed potius à molliori parte,
quippe anteriori.

Positu, qui
differt se-
cundum

Profunditatem caui, nempe in antro concauo reconduntur, & latent. homo
enim est animal malacodermon, quare duram & testaceam cutim externis of-
fensionibus resistentem, habere non debuit. hinc natura oculos humanos collis
longis non infixit ut in ostracodermis, sed in cauum intrusit, hoc modo ab exte-
ris periculis tutiores sunt, hæc tamen profunditas uisui non obest.

Cōpositio,
quæ uersa-
tur in

Copulatio naturalis cum partibus
uicinis, oculi uero alligantur cum

Cerebro à posteriori parte per neruos opticos, uel po-
tius cerebrum ei alligatur, ne priusquam neruus opticus
ob recessum à cerebro, atq; transitu per loca ossiosa in-
duratus, ad usum ineptus redditus, oculū ingrederetur.
Alijs uicinis partibus, de quibus in cornæ tunica des-
criptione.

Particulatim omnes eius partes quætas
in sequenti A.

KK 3

TABVLAE HVMANORVM

Extrinfecus uis
sui obiectas &
apparentes, ui
demus autem

Album λευκὸν dictum, quod uocatur id album & candidum, quod iridem cingit, & ita album ob pericranium, seu adnatam tunicam, quæ ad iridem usq; oculum cingit, uel inuestit.
Iridem Lat: & Græ: est circulus pupillam ambiens. Gal: inquit nihil aliud hunc circulum esse, atq; concursum omnium tunicarum oculi, singuli isthic singulum promunt circulum. Si enim probè quis dissectuerit oculum, & nihil confuderit, in iride septem uidebit circulos sibi mutuo insidentes. Vesalius dicit esse tunicam uicam, quæ tali colore prædita per corneam lucidam apparet. eundem semper deprehendi esse uicam tunicam.
Pupillam, quæ ὀφθαλμὸν dicitur, & est circuli, uel iridis medium, per uicæ tunice foramen, per quod spiritus uisui egrediuntur, & figuræ rerum externarum in oculum inrant, uisum ministrans. per idem ipsum foramen humorem crystallinum conspiciunt.

A. Particu
latim om
nes eius
partes, in
quo mem
bro uidebi
m9 partes

Humores,
qui tres
sunt ut

Internas,
id est, sin
gulas sepa
ratim dis
tinctas, dis
tinguunt
tur in

Tunicas
quæras y.

Partes externas uel ad
conseruationem oculorū,
uel ad meliorem operati
onem factas, de quibus in
fine.

1. Humor
Crystallinus,
pars
principa
lis & pro
prium uis
us instru
mentū, in
quo consi
deratur

2. Vitreus
quæras α.

3. Aqueus
quæras β.

1. Nomen, uocatur humor crystallinus Græ: κρυσταλλινός, id est, glacialis à similitudine, quam cum glacie habet, non consistentia, sed colore. albus enim, clarus, lucidus, et splendens est. ab ὀφθαλμῷ, id est, lenticularis à figura, item ὀφθαλμῷ à disci similitudine, à nonnullis ὀφθαλμῷ, id est, lenticularis.

2. Vtus est, ut uideat. per hunc enim uidemus. siquidem ut in omnibus instrumentis una est pars actionis causa, sic in oculo hic humor uisionis. Nam in

Toto corpore nihil crystallino humori simile reperitur.
Suffusionibus cum aliquid ante crystallinum humorem uenit, uel cum aqueus humor turbidus, uel crassus est redditus, uisus impeditur.

3. Essentia siue substantia propria, quæ est humor concretus & condensatus, qualis nulli in corpore reperitur.

4. Essentia
sequē
tia, quæ
sunt

Durities mediocris,
tribus de causis.

Tanta tamen mollitudo
es ei adiuncta, quanta
sufficit ad altera
tionem colorum excipiendam.

Claritas, perluciditas atq; splendor crystalli instar,
mutari possit.

Figura, quæ non exactè rotunda et spherica est, sed
in superficie aliquanto depressa, in inferiori spherica,
in medio circulariter rotunda & asperum circuli
quoquomodo exprimens, idq; duabus de causis

Magnitudo tanta, quanta ad formas externas excipiendas,
& luminis quantitatem sufficit.

Numerus, in singulis oculis unus humor crystallinus,
ne una res duplex uideatur.

Primò, ut admitteret claritatem interstitium.

Secundò, ne in motu uisionis, uel plaga ex uitro humor exturbaretur,
nam connexiones in rotundis sunt fallaciores,
quàm in planis, nō enim
debit huc illuc fluere

A lumine externo nimium
difflaret, lumenq; externum
difficiliter ad eū pueniret.

Lumen et splendor crystallini nimis cogeretur, et non
facile cum externo confusceret, propinqua non rectè
uideremus, longinqua optime.

Non est in medio collocatus, nam duo se querentur incommoda aut

Nec proximè ad corneam, nam lumen internum confusceret nimium cū
externo, hinc spiritus uisui citò
dissoluerentur & dissiparentur, unde

Propinqua quidè
uideremus.

Remota difficiliter
aut nullo modo.

Itaq; positus est in anteriori parte magis, atq; in posteriori, ita tamen remote à cornea tunica, ut splendor quoquo modo refringi possit.

Primò à lateribus, ubi circulus asper continetur, intercedente ligamento ciliari (quod Vesalius tunicam ciliis similem uocat) uicæ tunice annectitur, & per accides corneæ, ita enim ex sua non exturbatur sede.

Secundò, in anteriori parte humori aqueo, quo in eo lumine & splendore refractio non offendatur (luminosum enim dissipat) & ut semper humectaretur. impedit etiam hic aqueus humor, ne choroidis tunica innatans in hoc aqueo humore, positi supra corneam labi.

Tertiò à posteriori, uitro humor innatat, uel firmissem inhaeret, quò eo, tanq̃ uentriculo, ad sui nutrimenti preparationem uteretur.

Positi, siue
stitum, &
ita crystal
linus hu
mor

Cōpositio,
sub qua
comprehē
dimus

illa quæ ad crystallini cō
seruationem conducunt,
de quibus in fine.

Conne
xio cū
uicinis
parti
bus &

Nomen, uocatur enim { Græ: ὕαλος ὄψις } { Consistentia, fuso uitro similis est. }
 { Latine uitreus } { quia } { Colore & luciditate, refrigerato & formato uitro respondet. }

Vt crySTALLINUS humor, tanquam in aqua huc illucue fluere, itaq; fulcri munus subit.
 Vt crySTALLINUS nutrire, à sanguine nutrirī nequiuīt, simile enim à simili nutritur,
 unde natura parauit crySTALLINO humori quid medium inter sanguinem et humorem cry-
 stallinum.

Substantia, quæ est uitro liquefacto similis, non autem colore, representat enim colore uitrum refrigeratum & con-
 densatum. quanto est crySTALLINO humori tenuior, tantò sanguine est crassior. siquidem si preparari debuit ad nutria-
 tionem crySTALLINI, medium quid inter utrumq; habere debuit. aquosus esse etiam nequiuīt, nam crySTALLINUS in eo solu-
 eret, & firmam non haberet sedem.

Substantiam sequentia, sunt candor & perluciditas, quanto enim sanguine est candidior, tantò est crySTALLINO nigrior,
 ueluti si intellexeris nigri parum, multo albo per totum esse permixtum, & albedinis perfectionem esse adulteratam.

Humoris uitrei quantitas, quæ tanta est, quanta ad nutriendum humorem crySTALLI-
 num (cuius causa totus est factus) sufficit, atq; quanta implendo spatio ab iride pos-
 terius lat erat. admiranda hic uenit summi opificis, iustitia siquidem si plus con-
 cessisset, spatium inter corneam tunicam, & humorem crySTALLINUM nimis angustum
 foret, quod si minus, nimis profundus foret crySTALLINI humoris situs.

Posteriori regione rotundam adeptus est
 figuram.

Anteriori uerò non undequaq; semiglob-
 bo similis existit, nam plus, quàm mediâ
 oculi regionem occupat, ita ut tantum à
 rotunditate ei adimatur, quantum in an-
 teriori regione occupat aqueus humor,
 iris, & pupilla.

Medio anterioris regionis ita concavus
 est, ut dimidiam crySTALLINI humoris ad-
 mittere queat.

Figura huius humoris dum extra oculū
 est, nulla est, in oculo uerò talis, qualis ei
 à uicinis partibus imprimitur. itaq; in

Illæ quæ ad meliorem perti-
 nent operationem, sub quibus
 comprehenduntur

Compositio sub
 qua comprehenduntur

Situs, qui à posteriori crySTALLINI parte est, quò cum absq; ullo in-
 commodo nutriat, in anteriori sede etiam eam nutrirī potuit,
 uerum obscurus fuisset, quò minus rerum externarum crySTALLI-
 nus humor quiuerit commodè excipere figuras, quare posteri-
 orem regionem oculi usq; ad iridem occupat.

Connexio
 cū uicinis
 partib9, ut

In anterio-
 ri parte, ut

Excavatus est cum crySTALLINO, be-
 neficio suæ propriæ tunicæ, cuius
 Fallopius mentionem facit.

Non excavatus est, à lateribus cum
 ciliari interstitio, uel ciliari ligamē-
 to.

In posteriori parte tunicæ amphikulitroidi an-
 nitur, ut inde, tanquàm per anadofin nutriatur.

Ad sui conseruationem consequitur tunicam propriam, de qua Excel: Fallopius; deinde ne cum aqueo misceretur,
 uel confunderetur, ciliare adipsam interstitium.

α. Vitreus humor, in quo hæc
 consideranda sunt

TABVLAE HVMANORVM

Græcè { ὕδωρ, id est, tenuis.
 { καθαρός ὁ ὕδωρ ἐν τοῖς ὄφθ. ὄσθ. id est, purus, qualis in oculis reperitur.

1. Nomen, vocatur autem

Aqueus.
 Latine { Tenuis.
 { Albugineus.

Primus principalisq; ut impediatur crystallini humoris siccitatem, illumq; in continuo motu, siue actione existentem humiditate reficiat.

Secundus, ne uvea pars interna exsiccaretur, quæ uersus crystallinum humorem spectat, hæc enim madida spongie similis est, exsiccata indurefcit, & suum usum, quem ex mollietate consequitur, perderet.

Tertius, ut uvea tunica absq; uisionis impedimento iusto spatio à crystallino distaret, si enim uvea confideret super crystallinum, crystallinus à colore uveæ non reficeretur, unde dissipatio luminis oculi, à splendore rerum externarum prodiret.

2. Vfus, qui multiplex est, &

Quartus, ut cornea tunica semper distenta maneat, corrugata enim (ut in senibus, & in ijs, qui ex uulnere aquei partem amiserunt) uisum impedit.

Quintus, ut splendor rei externæ, priusquam ad crystallinum peruenit, quoquo modo infringatur, atq; spatio conuenienti, intrinsecum lumen cum externo confuescat, & ob id est quasi munimentum crystallini, quo uisus ad sustinendum lumen externum, atq; subitum luminis externi occursum prohibet, oculus enim splendorem lucis absq; noxa non patitur, præcipue si repentinus sit.

Sextus, ne spiritus uisui nimia copia effluant, & dissipentur.

Aqueus humor, in quo considerantur hæc quinq;

3. Substantia est aquosa, paulò crassior aqua ipsa, ne ob nimiam tenuitatem, plus incommodi, quàm commodi sequeretur, id est spirituum uisuiorum nimium effluuium. ita tamen in crassitie temperauit natura hanc substantiam, ut spiritus uisui absq; impedimento exire possint, lumenq; externum ad crystallinum humorem peruenire queat. quanto uitreus crystallino est liquidior, tanto aqueus uitreo tenuior.

4. Substantiam comitantia, utpote

Color aqueus, qui aptus est omnes colores admittere, nam si aqueus aliquo infectus est colore, eodem inficitur & uisus, quare talis color confertur ad singulorum uerum colorem percipiendum.

Luciditas, ob causam iam dictam.

5. Illa, quæ ad meliorem operationem pertinent, sunt autem hæc

Quantitas exigua, nimirum 4. uel quinq; guttarum, nam spatium illud, quod est inter corneam, & crystallinum humorem, non tantum humore aqueo, sed spiritu repletur, est enim hoc spatium maius, quàm aqua repleri queat. Vesalius uoluit hanc aquam dimidium oculi occupare, at ne tertiam quasi partem obtinet, nimirum eam, quæ in regione iridis, & pupillæ contineri potest, distinguitur hæc regio à cornea tunica. At si uero fuisset

Plurimus, non penetrasset lumen.

Paucus, imò tantum lumen non defenderetur, & dissiparetur luminis uehementia.

Situs est in eo spatio oculi, ubi iris & pupilla continentur, septum ciliare annectitur principio corneæ, ubi iris incipit, inde ab hoc ciliari intersitio, spatium antrorsum uersus spectans occupatur ab aqueo humore.

Vocabuli significatio, vocatur $\alpha\chi\upsilon\alpha\sigma\epsilon\delta\alpha\varsigma$ à retis piscatorum similitudine, quod uni baculo accommodatur. legas priores tabulas.

Vsus est duplex, alter ut

CrySTALLINI alterationem percipiat, eamq; ad sensum communem, tanquam iudicem deferat.
Humori uitreo nutrimentum adferat, siquidem pluribus uenis & arterijs, atq; sua fert moles, referta est.

Substantia quæ refert

Cerebri substantiam aqua dilutam, idq; necessariò, quanto enim sensibile subtilius, & exactius est, tanto instrumentum propius ad cerebri naturam accedere debuit: oculus uerò habet sensibile ethereum, quod omnibus alijs subtilius est, quare potius cerebri substantiam, atq; nervosam requisiuit, nihil enim aliud est hæc tunica, quam cerebri substantia cum optico nervo delatæ ad oculum, dilatatio.
Narium mucorem, & minime tunicam.
Venosam, nam uenis & arterijs referta est.

Prima est reticularis ad quæ spectant

Substantiam cõsequentia

Mollities maior est, quam in cerebro, & id, quò facilius impressiones suscipere.
Albedo, non tamen ita candida est, ut cerebrum, sed quia multis uenis & arterijs scaturit, ad fuscum tendit colorem.

Ad melius operandum, est

Magnitudo tanta, quanta ad uitrei humoris comprehensionem sufficit, hunc enim undequaq; amplecti debuit, si nutriendus ab ea erat.
Figura, quæ illi nulla extra oculum est, nam ut mucor, in sese collabitur: in oculo uerò obtinet formam piscatorij retis, unde etiam nomen inuenit. in posteriori parte nervo optico, tanquam baculo, annexa est, inde in latum extenditur finitq; ad ciliare septum, uel ad iridem.
Cõformatio, quæ consistit in
Positu, sita est in postrema uitrei humoris parte, eumq; ut nutria at obducens, definit ad iridem.
Connexione, annectitur in posteriori parte nervo optico, ab anteriori choroidi tunica, ubi hæc uicem de sese promit.

Sine quibus non, sunt uenæ & arteriæ per hanc tunicam dispersæ.

Significatio, vocatur $\alpha\chi\upsilon\alpha\sigma\epsilon\delta\alpha\varsigma$ ob similitudinem, quam tenuitate & non duritie atq; robore cum telis aranearum habet.

Vsus, qui triplex est

Primus est, unitum conseruare humorem crySTALLINUM, ne diffusetur & propriam perdat figuram, alia enim præter rotundam, apta non est omnes formas excipere.
Secundus, ne cum humor uel albugineus, uel uitreus malè affectus est, crySTALLINUS humor per consensum afficiatur, impedire.
Tertius, ut crySTALLINUS dura tunica, per septum ciliare commodè annecteretur, quòd difficillimè fuisset factum, si hic humor crySTALLINUS fuisset tunica priuatus, humori enim nihil adherere potest.

Substantia, quæ membranosa, tenuis, sed densa est: in posteriori regione tenuior atq; in anteriori esse uidetur.

Substantiam propriam sequentia, utpote

Tenuitas insignis, ne ob crassitatem uisui obesset.
Color perlucidus, quali præditus est crySTALLINUS, & id, ut splendor transire possit.

Ad meliorem operationem pertinentia, & sunt

Figura e a, quæ humor crySTALLINUS præditus est, utpote in posteriori parte rotunda, in anteriori parum depressa.

Situs, qui manifestus est, ambit enim crySTALLINUM.

Conformatio sub qua

Connexio cum uicinis partibus

In anteriori regione contingit aqueum humorem.

In posteriori tunicam uitrei, non autem prodiit à uitrea, nam

Diuersa est à uitrea tunica.
Inferuit crySTALLINI humoris.
Vitrea in cauitate habet propriam tunicam, quare cum nullâ cum uitrea communicationem obinet, ad uitream non pertinebit, ut quidam putarunt.

Sine quibus non: uenas peculiares non conseruitur ad nutritionem, etenim nutritur per diaphragma ciliare, quod uenis plenissimè est.

A lateribus diaphragmati ciliari.

Tertiam & reliquas in sequentibus inuenies paginis.

II


Tunicarum oculi non idem apud omnes auctores est numerus, ego præcipuas enumerabo, mittamq; quæ fusi in tabulis internarum partium annotata sunt: à plurimis anatomis septem recitantur, quarum

Secunda est arachnoidea, in qua considerabitur

TABVLAE HVMANORVM

73

Nomen & uocatur	Latine uocatur	χοροειδής	Nam uas folliculo, ex quo pedunculus cum acinis extractus est, similis existit, habet enim foramen in anteriori parte, quemadmodum folliculus pedunculo priuatus, qui parum confidit. uel etiam quod tali colore uidetur intus prædita, quali folliculus uas nigra. Ruffus uult illa parte tantum, qua corneæ tunica subiicitur, rhagoidem non cari.
	Græcè dicitur	χοροειδής, id est, speculundina, tum quia	
Vasa tunicæ, in qua hæc specula sunt	In anteriore parte, ubi propriè χοροειδής uocatur, tres præbet usus, quorum	Primus est, ut corneam nutriet, at, cornea enim tunica	<p>A longinquo alimentum trahere nequit.</p> <p>Venas et arterias habere non potuit ob</p>
		Secundus, ut uisui esset medicamentorum spectaculum, colore namque nigro et cæruleo, quo intus prædita est, disgregatos spiritus à lumine externo, recolligit.	<p>Splendorem, quo carne non debuit.</p> <p>Densitatem.</p> <p>Duritiam.</p> <p>Tenuitatem.</p>
		Tertius, ut defendat crystallinum, ne offendatur corneæ duritiæ, si cili enim supra crystallinum procideret.	
		In posteriore regione, ubi dicitur χοροειδής, etiam triplicem consequitur usum, et	<p>Primò nutrit amphibiostroidem, quemadmodum pia mater in capite cerebrum, simili fungitur munere in oculo.</p> <p>Secundò, suo colore cæruleo & nigro colligat spiritus, quo coacti efficaciores reddantur.</p> <p>Tertiò, cooperimentum est amphibiostroidi.</p>
Substantiæ consequentia, quæ sunt duo, ut pote	Color	Craffitiæ, quæ maior in oculo huius tunicæ, atque choroides in cerebro. Debet enim choroides in oculo partes subiectas defendere ac stabilire, posterius uerò, ubi succingitur dura tunica, aliquantò durior existit.	
		<p>In anteriore parte, qua pupillam spectat, est</p> <p>Intus communiter fuscus, quo spiritus disgregatos recoliget, interim impenit nigricans.</p> <p>Extrinsècus, ubi pupillam & iridem constituit, interim cæsius est color, interim cæruleus, interim niger pro tempore (ut multi putant) cerebri & oculorum. Neoteris corum nonnulli hoc minime temperiei, sed colori interni uasæ superficie affribunt.</p>	
	In posteriori ori	<p>Intus uarijs intersinguitur coloribus, ubi enim primo pronascitur subalba est, mox uiridis, deinde cærulea & in modum iridis afficitur.</p> <p>Foris, qua spectat duram tunicam, fusca uel nigra, hi colores ubi oculus à splendida luce laborat, maxime oculum consolantur, lucidum disgregat, obfcurum congregat.</p>	
Ad perfectiorem operationem in sequenti.			



TABVLAE HVMANORVM

80

Nomen, vocatur autem uocabulo

Græco, κληροτός.

Latino, dura.

Vfus inferuire choro-
di tunica, idq; dupli-
citer &

Primò ad tutelam choroidis tunica, nam ut chorois tunica ad defensionem subiectarum partium satis erat robusta, ita ad seipsam sustentandam tuendamq; illi satis roboris non fuit. propter mollitiem enim facile concidisset atq; oppressisset facili subiectas partes. Secundo propter tenuitatem eandemq; molliem facile fuisset passa à rebus externis. quò autem robur consequeretur ad partes sibi subiectas sustentandas, natura ei circumdedit fulcimentum aliquod, cui alligata fibrosis nexibus tueretur, alias partes. Deinde hoc uallum uel munimentum est aptum ad excipienda omnia externa, ne ab ijs choroides & alie partes afficiantur. Secundo ut chorois tunica circumiacentium osium duritiem citra noxam tollerare posset, hinc (ut Gale: uult) amicitia uinculum posuit inter os & choroidem, utpote duram hanc tunicam. ut in cerebro pia mater siue chorois tunica à dura matre inuestritur, atq; in omnibus locis, solis uasorum productionibus sibi mutuo annectuntur, ita & hic in oculo uisuenit inter choroidem & duram. Posteaquam uerò multa pinguedo, multi musculi sint inter oculum & osseum uallum, interpositi, qua ratione hic usus duræ conueniat, ignoro.

Substantia, nempe quò hisce perfungi possit muneribus, atura illi indidit substantiam membranofam, ad inuoluendum munientumq; totum oculum, aptam.

Dura, in qua
sunt considerā-
da

Substantiam sequen-
tia, utpote

Durities insignis, nimirum maior ea, quæ est duræ membranæ cerebri, ita oculus ab externis periculis tutior est. in aubus cartilaginea est, & in noctuum oculis ex laminis osseis sibi mutuo annexis dura tunica constat.

Craffior dura matre ob causam dictam, craffissima uerò in posteriori parte, ubi nervus uisorius inseritur, deinde sensim magis magisque extenuatur, ita ut iuxta corneam, quam ex sese depromit, omnium sit tenuissima. Pellucida per sese, nempe abstracta tunica adnata, non multò obscurior atq; cornea, uisitur. Vesalius in magno opere uult eam cerebri membranæ modo esse opacam, atq; minimè pellucidam.

Magnitudo, tanta uidelicet, quanta est tunica choroidis, choroidis enim tunica causa, hæc est facta. cum chorois tunica posteriorem oculi orbitam ad iridis principium usq; inuehit, & hæc similiter consq; pertingit, quidam & duræ addunt corneam, & ita totum ambit oculum.

Figura sub qua
comprehendi-
mus

Formam, quam si-

Duræ adijcere uelimus corneam, dicemus esse rotundam. Separatim absq; corneæ adiectione intelligere uelimus, tantum formam recedit ab exacta, rotunditate, quantum illi demit iris cum pupilla.

Cauitatem, qua erit, ornata si corneam uelis excindere, sin minus, nullam habebit.

Aperitatem, in

Externa superficie, qua connectitur cum adnata, impense aspera est, quò inuicem optime connecti queant. ubi etiam musculi ei applantantur, etiam inæqualis existit.

Interna, non tanta ei inest asperitas, nam paucos obinet nexu ligamentosos, quibus choroidi alligatur, præter hos nexu in posteriori parte asperitas in dura & choroide uisitur, quo membranæ hæc duæ mutuo contactu colligentur.

At si adijcere uelimus corneam, dicemus hæc in regione, ubi cornea est, foris & intus esse æqualem.

Ad perfectiorem ope-
rationem peragendā
apta, huc pertinet

Cōpositio que
habet

Situm siue positum, qui satis est manifestus, nimirum extrinsecus circum oculum, nam omnium partium oculi, adnata & musculis exceptis, est extrema.

Connexionem,
annectitur in
parte

Posteriori quam firmissimè nervo optico, qui primò ibi dilatatus, duram ex sese producit membranam

In interna parte, ubi choroidem inuoluit, fibris quibusdam ligamentosis illi annectitur.

A lateribus In externa parte exasperata tunica adnata quàm arctissimè colligatur, quousq; sese adnata extendit, ubi uerò musculi sunt, etiam musculis alligatur.

Anteriori, si uelitis corneam huc referre tunicam, unde quaq; est libera.

Partes sine quibus
non, quæ sunt

Venæ & arteriæ, quas consequitur à partibus uicinis, quibus adhæret, primò ab interna regione à choroide, ab externa ab adnata, in quibus sit ophthalmia.

Nervi, qui etiam à uicinis adherentibusq; partibus oriuntur, si qui in dura sint tunica, nulli quasi reperiuntur in illa, nam tota nerua (siquidem ex nervo optico dilatata uidetur produci) est.

Nomen, nam uocatur { *κερτοειδής*, id est, cornularis, quia similitudinem cum cornu habet, quod in laminas diuisum & exacte leuigatum uitri alicuius loco, lucernæ accommodatur, perlucidumq; est.
Cornea uocatur Latine.

Vfus, utpote { Defendere crystallinum humorem ab externis iniurijs, nam si nihil crystallino humori esset oppositum, quippe qui præ sui mollietate nulli rei externæ resistere poterat, ne minimum quidem temporis durasset, & ita animal statim uisu priuaretur, ne id fiat, natura crystallino humori præposuit tunicam talem, quæ externum frigus, calorem, & ictus excipiendo, ab omni offensione externa tueretur humorem crystallinum.
Fallopianus credit albuginei humoris gratia esse factam, nimirum ut aqueum humorem contineat, hoc ex eo, quod ueluti aliam spheram cavitatemq; constituit. Vesalius in examine inquit, hæc pars extra reliquam oculi rotundam globosamue figuram non, nisi contra naturam, nulli animali eminet.
Vesalius inquit cornea cum uniuersa dura tunica, omnes humores & molles tenuesq; tunicas ipsis obductas uel inuetericatas tunicas complectitur: ac quantum ad continendi munus usumq; attinet, à tota tunica dura nihil discrepat, & cum illa uniuersa, exactum nullibiq; eminentem globum conficit.

Substantia est cornu modo dura, & ut cornu in laminas diuidi radiq; potest, ita etiam hæc tunica pars secantibus non minus radi diuidiq; ualet, quam si ex laminis siue squamis compactis constitueretur. quidam assimilant hanc substantiam unguis substantiæ.

Substantiam sequentia { Densitas, quo robustior foret ad resistendum rebus externis, nempe in medio densissima at tenuissima simul est.
Tenuitas, minime crassities, crassities enim uisui fuisset obfutura, nam imagines rerum externarum ingredi, spiritus uisuius exire nequiuisset, tenuitas rursus non potuit rebus externis resistere: natura itaq; uisui transmittendo corneam fecit tenuem, resistendo duram, crassitiem euitauit natura, ne perpetuæ tenebræ oculis obuersarentur.

Cornea in qua consideramus

Perlucidum, si enim fuisset tenuis, dura, & minime translucida, instar operimenti uisum obscurasset. Vesalius inquit in examine, non est in modum uitri aliquo colore infecti perlucida, ne crystallini humoris officio ita obset, atq; uisum ledit, si quando calidissima aqua perfusa, aut ignita pelui (uti Turcas apud Mahometis sepulchrum obsecari nouimus) opposita, aut ob cicatricem, sui uel ulceris, aut uulneris curationem non amplius perlucet, sed proprio ueluti colore, perinde ac reliqua dura tunica pars, alba iam, ac quodammodo membrana in colore rededitur: ne quid dicam, qui etate durior et ueluti glauca calentesq; aqua ambusta perficitur. eodem colore est prædicta, quo dura, cui adnata detrahta est.

Magnitudo tanta, quanta ad tegendum crystallinum continendumq; aqueum, ad formas externas admittendas spiritumq; uisuum emittendum sufficit: ea enim oculi sedes, qua oculi nigrum, uel iris consistit, hæc tunica à dura abscedere, atq; ex dura, cornea perlucida fieri uidetur.

Conformatio { Forma, quæ est rotunda undequaq;
Aequalis intus & foris, instar cornu leuigata, id enim ad rectitudinem spiritus uisui transmissionis confert, asperitas & inequalitas obest.

Compositio, ad quam duo referuntur, quorum { Alterum est situs, cornea posita est anteriori oculi parte ante humorem crystallinum in medio oculi, & aliquantisper eminet extra duram, unde peculiaris esse creditur à Fallopio.
Alterum connexio, nulli aliæ parti connexa est, nisi duræ, singas in medio duram excisam, & parti excisæ impositam hanc corneam perlucidam, estq; ita connexa duræ, ut utrum sit processus, utrum eadem sit cum dura, discerni nequeat.

Sine quibus non, sunt uenæ, arteriæ, & nervi, his caret uisus iudicio, nam uisui admodum fuissent obfutura, deinde & propter duritiem tenuitatemq; hæc uasa admittere nequiuisset. quare proprijs his non sustentatur uasis, sed ex uicinis mutuatur nutrimentum, uitalem spiritum & sensum, à longinquo trahere non potuit, unde natura corneæ principio apposuit uenæm tunicam, unde illi nutrimentum & uita accedit, est enim uenæ uenis arterijsq; plenissima, à dura uis sentiendi (qua prædicta est exquisitissima) impartitur.

TABVLAE HVMANORVM

Græcè ἐπιπεφυκός, id est, adnata, nam non est propria oculorum tunica, sed à uicinis partibus uariis ob usum oculis concessa.

Nomen

Latine
 Coniunctiuæ, quod oculum uicinis partibus coniungat, siue colliget.
 Adnata ob causam dictam.
 Adherens.
 Alba à quibusdam.

Vfus, qui tres sunt

Primò inuestit & colligat totum oculum cum osibus, ne in uehementissimis motibus & ne ab externa uolentia, ex sua sede excutiat, uel contorqueatur magis, atq; par est. unde oculum in sua sede conseruat.
 Secundo impedit, quò minus ab osibus uicinis admodum duris ob contactu offendatur totus oculum.
 Tertiò omnes oculi musculos tegit, operit, atq; sedibus proprijs firmat.

Adnata, cui hæc attribuuntur
 ut potè

Substantia est membranosa perioftio similis, nam nihil aliud, quam perioftij processus est. at ob uolubilitatem motus, natura sub palpebris suffulcitur hanc membranam uiscosa & unctiosa pinguedine, qua caret, ubi oculum inuestit.

Perfectioris operationis gra-
 tia duo consequitur

Magnitudinem, qua posteriorem oculi partem non undequaq; amplectitur, sed illam partem tantum, qua palpebris colligatur, oculus ad iridem usq; nimirum id totum, quod albo colore de oculo uisui nostro sese offert, id ad adnatam spectat.
 Connexionem cum uicinis partibus, nimirum natura hanc adnatam membranam à superciliorum labijs adducit ad palpebrarum extremitates (ubi ut & inferioris palpebræ in inferiori parte tarsum, sic superioris cartilaginem tarsum ambiit) rursus hæc perioftium, siue hanc adnatam tunicam per palpebrarum internas partes reducit, sed non ad principium, unde emerfit, sed ad musculorum fines. inde ad anteriora trahitur uersus reflectitur, oculum inuestiens ad iridem & corneæ principium terminatur. Eodem etiam modo sese habet in inferiori parte, oriatur ibi à perioftio ossis mali, & in longitudinem tantum producit, quantum palpebras extendi oportuit, rursus per palpebræ infernam partem internamq; reducit, illamq; non ad principium, unde emerfit, sed ad subiectos tali principio musculos oculorum applicuit, indeq; ad iridem reducit, ubi ipsam in corneam inseruit.

Præter hæc consequitur uenas, arterias et nervos à uicinis locis, quæ in sanis latent, sed in ophthalmia uenas arteriasq; conspicuas fiunt.

Præter has tunicas iam enumeratas à Galeno & octaua recensetur, quæ nihil aliud est, quam aponeurosis musculorum: ubi enim musculi in tendines desierint, & oculo implantantur, iam uidentur omnium musculorum tendines unam aponeurosim constituisse, quæ membranæ modo oculum amplectitur, hanc membranam numero tunicarum ascribit.

Fallopium hæc addit & aliam uitreo humori peculiarem atq; propriam, quæ undiq; illum humorem amplexatur: quidam dicunt in anteriori atq; posteriori parte uitrei, tunicam eandem existere cum arachnoidi: Sed id tum Vesalius, tum Fallopius negat, difficilimè tamen separantur. Ruffi sententia appellari quoquo modo potest υαλοειδής, id est, uitrea.

Habemus itaq; hic tunicas ad
 summum nouem, quarum

- Prima est amphiblastroides, id est, retina.
- Secunda, arachnoides.
- Tertia, choroides.
- Quarta, ciliare interstitium.
- Quinta, dura.
- Sexta, cornea.
- Septima, adnata.
- Octaua tunica ex musculorum tendinibus conflata.
- Nona, uitreo humori familiaris, uitrea dicta.

Notandum, quod Galenus interim has omnes reducat ad quinque, interim ad quatuor, cum ad quinque, omittit corneam, ciliare interstitium, et ultimas duas. cum quatuor recenset, præter has dictas præter adnatam, tanquam impropiam tunicam.

Nomina & appellationes in tabulis meis de partibus externis habebis.

Vfus, ut corporum maioris molis supernè ad oculos decidentium incurfus excipiant.

Propria, quæ cutanea est multis fibris carnosæ à musculo frontis illi im-
partitis, ac pinguedine dura uscosaq; perfusa.

Substantia
in qua duo
ueniunt cõ
sideranda
utpote

Pili ex cu-
tanea sub-
stantia ena-
ti quorum

Vfus est, ut instar murorum propulsarent oculis aduersa,
eag; præcipue, quæ à capite & fronte defluunt, cum super-
cillorum corpore exciperent.

Aequalitas in longitudine, numero, & densitate semper, hoc
enim ad usum conduxit. Siquidem si minores, pauciores, rari-
oresq; eos efficeris, influere permitterent, quæ prius de-
fendebant. Si uerò longiores, densioresq; non amplius uala-
lum aut murus oculis, sed carceri cuidam simile foret id ope-
rimentum, pupillas enim occultabunt & obscurabunt, quas
tamen omnium instrumentorum minime obscurari oportuit.

Galenus ut ethnicus huius rei causam aptitudini subiecti as-
signat, at nos contra Galenum summi creatoris, qui rei uni-
cuiq; certos constituit limites, præscripto ac iussui ascribere
mus.

Obliqua insertio, siue ductus obliquus à cantho maiori ad
minorem, comitando rotunditatem siue protuberantiam su-
percillorum tendens. Sic deflectit omnia ab oculis & præ-
sertim pupilla, cuius etiam gratia, hi pili in medio supercilia-
rum omnium densissimi, ac frequentissimi sunt. incumbunt
sibi mutuo, & non ut cilia palpebrarum ordine collocati à
se mutuo conspicuo spatio distiti sunt. Rectitudo ualde fir-
misset incommoda, nam cum grauiora desuper decidentia à
pilis supercillorum excipi debebant, facile perlapsissent, de-
niq; ferocitatis aspectum attulissent.

Substantiã
sequentiã
quæ sunt

Craffitiæ insignis comparatione uicinæ cutis: ob craffitiem enim in con-
tractione uersus nasum tumidiora redduntur, ac hoc modo melius umbria-
camenti instar, oculos muniunt.

Durities pro ratione cutis insignis, debebant enim (ut Gal: inquit) ex ea
prodire pili exiles ac nullius incrementi, æquales longitudine & numero.
ex humidis autem & mollibus partibus emergunt multi & prolixi, ut etia
am contingit in terra, ex terra enim humida ac pingui herba & planta
alissimè crescunt, ex petrosa ac squallente parua, durag; ac exiles manant,
quare ex necessitate Galenus supercilijs duram tribuit substantiam, atq; in
tenuissimo hoc negotio D. O. M. diuam suam potestatem omnipotentia
amq; impie adimere conatur. Et alia causa huius duritiei reddi potest, ni-
mirum ut pili fixi, ac stabiles in supercilijs manerent, conduxit enim ut sem-
per eundem situm conseruarent.

Mobilitas prompta, quam consequitur ex pinguedine fibrisq; laxis, atq;
mollibus, quibus subiectis partibus laxissimè colligantur, unde in munijs
obeundis expeditiora fiunt supercilia.

Magnitudinem tantam, quanta ad defendendos oculos à superiori parte
sufficit.

Figuram
quæ conti-
net

Formam, quæ singularis illis non contigit, at iuxta nares
craffiora atq; latiora sunt, sensim tamen à naribus ad can-
thum minorem abscedentes ac descendentes attenuantur,
quemadmodum pilorum circumscriptio tibi demonstrabit.
Protuberantiam leuem, usus enim causa extra frontis cutem
parum prominent.

Ad melius
operandũ
consequun-
tur

Conforma-
tionẽ, quæ
comprehẽ-
dit

Situm, qui satis conspicuus est.
Connexionem, laxis ac mollibus uinculis subiectis connecti-
tur partibus, siquidem promptè & laxè moueri debuit. Luxa-
ta nares uerò alligantur musculo cuidam peculiari, qui dor-
so narium incumbit, earumq; dorso inferitur. Huius musculi
beneficio supercilia mouentur, ad narium dorsum attracta
corrugantur oculisq; magis superinducuntur. contingit etia
am huius consensu, ut cum quis supercilia conetur contrahere,
& simul narium alas ad exteriora sursum trahat.

Huc pertinet et musculos
sa caro sub supercilijs, atq;
que frõis musculo latens, immediatè osi adnata, quæ si laxa esset et mobilis, musculorũ ala-
bo à me ascriberetur, at quàm firmissimè osi adheret, atq; undequaq; immobilis existit.

Partes tutelæ destinatas, quas Ga-
le: 10. de usu part: corneæ tuni-
cæ assignat tantum, equidem
credo corneæ siue pupillæ gratia
per se se, at per accidens totius os-
culi ergò à Deo fabricatas. inquit
autem Galenus hoc modo: corneæ
tunica prima omnium ac sola os-
mibus iniurijs est exposita, sumis
quæ ac pulueris & frigoris & æ-
stus & contudentium atq; inci-
dentium incurfus excipit, ut quæ
à crassa menynge est procreata.
ideo quamuis ob robur subiectas
partes defendere quierit, tamen
ne ex huius offensione & ipse
oculorum partes (quibus corneæ
præficta est) lederentur, deus
corneam uariè muniuit, palpe-
bris, cilijs, circumpositis osibus
et cute ipsa, de quibus ordine &
primò de supercilijs, quorum

Præter oculorum par-
tes hæcenus oculis
proprie assignatas, for-
is & intus quædam
adherent, quæ uel ad
defensionem, uel ad
operationes iuuandas
excitandasq; condu-
cunt, deniq; sine quib-
us non distinguimus
itaq; hæc in tres, ni-
mirum in

Partes ad melius operandũ fa-
bricatas, de quibus post.

Partes sine quibus non, de his eti-
am post.

TABVLAE HVMANORVM

Primò uocabula, de quibus in tabulis meis de externis partibus.

Secundò usus, qui unicuique est, nepe ut pro nostro arbitrio et necessitate pupillae gratia, ad perti et oclusi sint oculi. at oclusio tres habet usus, quorum

Primus est, ut omnis iniuria, ea tum sit corporum in oculos incidentium, tum calor frigidusque, tum laetitia splendorisque extrinseci, ab oculis per palpebrarum complicationem et corrugationem, arceatur Gal: 10. de usu par: palpebrae datae, ut simul coirent ac complicarentur oculumque clauderent, si quid forte corporum maiorum in eum incurrat.

Secundò cum oculus apertus extra tenebras nolit uelut, cogatur suo fungi munere uel uidere, ne spiritus uisui ex continua actione nimium dissiparentur, ac per accidens uisus ualde hebetaretur, si nunquam à munere cessaret, necessum fuit oculum interim spiritus dissipati recolligendi, ac quiescendi gratia operari. eadem hac opera, sensus uariis modis dispersi refocillantur, mensque ad uaria meditando sese recolligit.

Tertius somni gratia, etenim somnus uisus rerum externarum impeditur atque perturbatur, hinc benignissimus D. O. M. insigni commodo nobis palpebras concessit. adde quòd tempore somni quo somnus sensus conpositi sunt, si oculi aperti manerent, magis atque dum uigilamus offendi possent. unde animalia palpebris priuata, ut ostracodermata similiaque foueas habent, in quibus oculos recondunt, atque in quas tempore somni eos, tanquam in cubicula, retrahunt.

Primò est cutanea, substantia tenuis, mollis et laxa, contrahi ac corrugari debere, quare leues paruorumque spatium occupant. Hinc maior substantia palpebrarum in primis inferiorum portio ex cute, reliqua cute multò tenuiori ac flaccidior consistat. Quò utique à nulla externa causa duriores fierent, spatium inter duas periosas portiones (quas à uicinis ossibus ad palpebrarum extremitates descendere diximus) medium uiscosa atque unctuosum cum membranis quibusdam, à musculis externis, occupant. hoc loco affectus procreantur, quos uisores uocant, unctuosus nimirum his corporibus supra modum auctus.

Secundò postquam palpebrae praecipue ad corneae tutelam animalibus sint concessae, ex molli, pingui et carnosa undequaque, ut omni ex parte constari non debuerit, nam facilius atque cornea afficerentur essentque, quiduis potius, quam propugnaculum. Quòd si constitissent ex dura admodum et ossa, neque mouerentur facile, neque sine dolore corneam contingerent, proinde ex dura quidem substantia, sed quae moueri facile et uersari cum ea sine noxa posset, palpebras fieri consentaneum fuit.

est autem hac cartilaginosa, cuius utraque, sed non aequaliter particeps est. haec cartilago uocantur Graecae et Latine: tarsus quòd (ut Vesalius uult) ferriem remorum in longis nauibus, quas galeras uocant, expriment et in ijs considerabimus.

Tertiò est substantia musculosus tenuis et flaccida cuti palpebrarum immediate substructa ad oculi oclusionem palpebrae utrique concessa, de qua postea, ubi de oculorum musculis agitur.

Palpebrae, in quibus consideratur

Substantia quae triplex est et

Vsum, qui triplex est

Substantia sequentia quae sunt.

Primus (quemadmodum nunc dictum est) ut propugnaculum munusque bident.

Secundus, ut palpebris attractis aequabiliter oculus aperiri queat, haec enim cartilaginea substantia ob suam duritiem et commodè musculorum actionem excipit, et attractionem eorundem aequabiliter facilius, atque ciliis mollis flaxilisque comitatur. uice uersa ut ad aequalem apertionem, sic ad aequalem oclusionem conferri haec cartilago tarsos.

Tertius ut cilia siue palpebrarum pilos erectos, neque ceterorum pilorum modo flaccidos dependentesque, continerent, atque etiam eos pilos procrearent, ex sicco enim (ut ante demonstratum est) nasci oportuerit.

Mollities pro ratione cartilaginum, nam cum in aquis, sumis, ac pulueribus oculi palpebrarum beneficio quam exactè ocludi oportuerit, necessum fuit tarsos simul cum uniuersis palpebris uehementer contrahi, ad quòd mollities conduxit. Secundo ne duritie oculos offenderent.

Tenuitas insignis, ut flexiles et leues forent. Conferret et haec tenuitas pertinet ad candelitatem ac candori conuenientiam ad luminis externi exiguum umbram, dum oculi oclusi sunt, transmittendam.

Magnitudo tanta, quanta ad oculum et in primis pupillam tegendam sufficit, atque utrique non est aequalis, siquidem in hominibus et brutis, quae manifestius superioribus palpebram mouent, superioris maior existit: uice uersa in quibus animalibus (ut in plerisque auiibus conspicitur) inferior mouetur, inferior maiorem cartilaginem continet: nam quae palpebrae oculum magis tegunt, maiorem ut consequantur cartilaginem necessum est.

In superiori tarsos in medio est latior atque in principio et fine, nam cum pupillae (quae ut plurimum tempore, ita praecipue in somno semper media regione oculi tenent) causa sit facta, eo in loco latius est. adde quòd haec forma accommodata sit ad superiorem orbis oculi regionem, quae dimidiata sphaerae formam exprimit.

In inferiori nullam latitudinem undique obinet, sed instar fulcimenti secundum totam longitudinem sustinere uidetur hanc palpebram, oram eius undequaque ambit. Siquidem latitudo superioris, tegendo pupillam sufficit, quare parum adiuuamenti inferiori requiritur.

Huc etiam spectat, quòd tarsi paruis quibusdam ramis, ciliorum causa, perforati sint.

Situ, qui satis manifestus est, nempe ubi palpebrae inter ocludendum se mutuo contingunt, et cilia sunt intus membranula, foris cute uehementius, ligamentorum uice arctius contrahuntur.

Conformatio quae comprehendit

Connexionem cum uicinis partibus, haec cartilagineae ab ossibus liberae sunt, nam absque ostium adiuuamento moueri debebant ut in

Parte intus uergente oculi aperitur, musculi calligantur. Cantho maiori ligamentis laxis narium ossibus, ut adducantur.

Huc pertinent puncta lachrymalia in singulis palpebris singula. haec puncta perforata sunt, ita ut in mortuis setam porcinam admittant. Fallopius putat transmissioni lachrymarum inferuire. habent meatus: sub caruncula quae in yng. vidi: dicitur: uniuertur in quendam communem sinum in narium cavitatem desinentem per canalem proprium in osse squammoso, quòd internum angulum occupat, in sculpum. Sinus interim exbulceratur, et fistula lachrymalis fit, tum sanies manifeste per ea foramina exprimitur, uocantur lachrymales meatus.

Ad perfectiorem operationem pertinet ut

Forma, quae inaequalis est nam

Protuberantia in toto ambitu pilorum excipiens dorum gratia aliquando sunt crassiores atque in reliquis partibus.

Figura, quae consistit in

Conformatio quae comprehendit

Appellationes, quas in tabulis externarum partium habebis.

Vfus, qui duplex est,
utpote.

Primus, cilia uallum quasi quoddam corporibus exiguis propulsandis, ne facillè apertis oculis inciderent, suis pilis constituunt: atq; ita paruis corporibus arcendis, ut superciliorum pilis maioribus, perfecta sunt.

Secundus, ut uisum quoquomodo dirigerent spiritumq; uisuum non permitterent admodum disgregari uel dispergi, quòd in ijs, qui morbo gallico laborarunt, & casum pilorum passi sunt, liquet: illi enim non rectè possunt uisum ad rem uisilem dirigere, sed sese in latissimo liaberoq; loco uersari opinantur, atq; uisum dissipatum habere dicunt.

Cilia siue pili palpebrarum,
in quibus considerantur.

Substantiam sequen-
tia ut

Durities & rigiditas, quæ satis magna est pro ratione pilorum in cilijs, rectitudo enim quam ex necessitate consequuntur, hæc postulabat.

Molliores sunt in extremitatibus, ne cum maiora corpora in oculum impelluntur, frangantur, sed leniter cedendo, illa repellant.

Ad perfectiorē ope-
rationem pertinentia

Longitudo tanta, quanta ad usum desiderabatur, eaq; perpetua atq; immutabilis, quod Galenus cartilagini tarso ob siccitatem tribuit, nos uerò præcipuè summi Dei creatoris iussu ac imperio ascribimus. in medio pupillæ gratia sunt longiores, atq; in principio, & fine.

Rectitudo cum duplicis usus causa, tum ut hac ratione exciperent parua uolatilia ac c. oris cula, quæ rectè ex obiecto in oculos irruunt, uel inuolant. attamen superioris palpebræ cilia sursum uersus leniter inflectuntur, nam si undiq; recti essent, umbram oculis inducerent, imò pedirentq; quo minus sursum uidere possemus, quod apparet in magna oculi apertione, dum sursum spectamus uel cernimus, tum enim ob curuationem dictam ciliorū extremitates adæquant corrugatam cutim. Si autem deorsum flecterentur, uisui obessent. Inferioris uerò palpebræ cilia ipsam de causis deorsum incuruantur. Galenus inquit: sursum undequaq; minime tendunt pili superioris palpebræ ad supercilia, neq; inferioris deorsum ad mala, nam uisum, cuius gratia existerant, labefactassent. Neq; tendunt intus in oculos mutantes, siquidem oculis incommodassent, continuitatem obiectorum spectandorum intercedentes.

Intervallum ciliorum tanta æqualitate adæquatum, ut ne ob longam à se mutuo distantiam aliquid perlabi permittant, nec ob arctam coniunctionem umbra quasi obscurare oculos possent.

Situs est manifestus, nimirum ex ora extrema in ambitu tarporum cartilaginum palpebris comprehensarum prodeunt duplici de causa, primò ne plurimum nutrimenti assumerent, secundo ut rigidi & recti persisterent.

Ne D. O. M. oculis ulla in parte deesset, aduersus maiorum corporum incursum, ut Galenus inquit de usu part. 10. cap. 6. superne supercilia constituit, inferne mala, ad maiorem angulum nasum, ad minorem osis iugalis productionem, à quibus omnibus maiorum corporum occursum prius excipientibus oculus ipse in medio locatus nihil leditur, cutis motu ad patiendi difficultatem non mediocriter ipsi etiam conferente, undiq; enim hæc contracta, oculum intrò comprimit, in angustissimum ipsum compellens. ipsa uerò in multas plicas corrugata una cum palpebris, si quid offendi conuexitatem prætergressum intrò in oculos feratur, prima uim omnem excipit, prima patitur, prima periculum sumit, ac prima labefactatur: Secunda uerò post ipsam cutem palpebræ contunduntur, inciduntur, rumpuntur, ac modis omnibus commota patiuntur, uelut scuta quædam ante oculos. Cutis frontis ac faciei, oculorum causa non solummodò mobilis est, uerumetiam glabra siue pilis priuata.

TABVLAE HVMANORVM

Colli & cum ea totius capitis motus, ut antè demonstratum est.

Caruncula siue caro glandulosa, & ynguis dicta, in interiori angulo oculi, uel cantho maiori, ubi utriusq; palpebrae congressus est, constituta: quæ anteriori sede, membrana oculis et palpebris communi ita laxa, ut lacrymæ inde emanare appareant, tegitur. huius usus duplex est.

Primus, ut impediatur, quominus lacrymæ, uel alius salsus, acrisue humor in genas profusatur, cernimus. n. eos, qui hanc carunculam à fistula, uel aliq; de causa exesam habent, semper lacrymas effundere uideri.

Secundus, ut munimenti instar hunc canthum tueatur, ne lacrymarum ac sordium in hoc angulo collectarum acedo offendere possit, siquidem cum palpebrarum contractione oculos à pulueribus, musciculis paruis, uel acri quodam humore liberare conamur, attractione palpebrarum ad nases, omnia ad internum angulum, & non ad externum protruduntur. quare externus angulus tali glandula priuatus est.

Ad melius operandum nobis concessa sunt subiecta, utpote

Glandule in oculi orbita sitæ humiditatem à capite ad oculorum lubricitatem conseruandam eò defluentem excipientes, atq; oculos irrigantes mobilioresq; reddentes. Harum glandularum

Fallopia unica est, & ita in observationibus eam describit. una tantum manifestata, ac perpetua satisq; insignis à me reperitur in parte oculi superiore, prope angulum exteriorem: præter hanc uerò nulla aliq; adest, quæ perpetuò appareat, ita ut alicuius momenti uideatur. At in reliquorum brutorum oculo, quæ nictari uidentur, & præcipuè in bouino reperitur quædam alia callosa, ac durior in interno angulo collocata, quæ ob lacrymas ibi (ut reor) minimè posita est, sed ratione illius membrane, qua nictitant. nam in his animalibus membrana quædam latitat interno in angulo ungui similis, quæ cum cartilagine uel corneæ tunice naturam sapiat, tenuissima est. mouetur motu uoluntario ad canthum minorem. reliqua in Fallopia.

Vesalio plures, in observationum examine ita scribit ac sese purgat. Ego in offsea cavitare, qua oculus continetur, latam quandam & rotundam carneamq; recensui glandem, superiori sedi lateris externi oculi incumbentem: & deim carneam ueluti glandem in interno oculi angulo descripsi, neq; in presenti cavitare aliud quid glandulosum aut cognosco, aut descripsi. Sic itaq; lata illa carneæ glans, uti præterdidi, musculi cuiusdam mihi uice habetur, quo palpebram attollimus. Pars autem in interno angulo reposita, illa est, quam anteriori sua sede membrana illa, quæ oculo & palpebris pariter communis est, & laxè in interiori angulo conuoluta iacet, integri, & in bobus ab hominibus in hoc differre iam scripsi, quòd his quidem tota quodammodo mollis sit, illis autem anteriori suo extremo in cartilagineum, & ueluti unguem sic finiat, ut telis ideo corneum quid inglutinari cernimus, quò minus ab arcu neruo promptè findatur.

Musculi, de quibus in sequenti pagina.

Oculorum, qui numero apud Fallopium sex, apud Columbum quinque, apud Vesalium in magno opere septem. At Vesalium in examine suum errorem fatetur & hos musculos breuiter recte describit. horum itaq;

Postquam oculi soli uident ea, quae pupillae opposita sunt, ex oculorum immobilitate cogemur collum & caput ad rem uisibilem conuertere, ne id fieret, natura oculos circumduxit pinguedine, ijsq; concessit musculos motus uoluntarij instrumenta, agemus hic de musculis, tum

Superior peculiares duos, horum

Palpebrarum quatuor

Quatuor primi, rectis motibus nimirum sursum, deorsum, ad internum angulum, ad externum cantum attractioni praesunt forma exortusq; sibi respondent. sunt oblongi & rectis fibris praediti, oriuntur a cono orbitae, siue radice uisorijs nerui, inde optico neruo oculoq; atque tenfi, carnosius, ductu recto ad corneam tendunt, sed antequam eo peruenerint, desinunt in latum tendinem, qui cum aliorum musculorum tendinibus coniunguntur, ac propriam uidentur membranam, oculum totum ambientem constituere. membrana haec tendinosa dura ante iridem inseritur. hinc fit quod omnibus simul operantibus musculis, oculus sistatur ac firmetur.

Quintus hoc modo à Vesalio in examine describitur. Quintus quatuor superioribus gracilior, ad internum latus foraminis neruum uisorijs transmittentis, a cono orbitae cavitatisue oculi initium ducit iuxta latus musculi oculum sursum ducentis. Deinde secundum frontis os antrorsum ueluti recta repens, circa superiorem sedem interioris lateris oculi in transuerso, quod hic ab osse exoritur ligamento continetur, in illoq; ueluti habena in annulo retorquetur, & carneus adhuc existens, sub tendine musculi oculum attollentis fertur, inibi tandem in nerueam tenuitatem cessans, quae superiori sedi exterioris lateris oculi, oblique satis et uersus anteriora inseritur. Membranula in qua musculus ueluti in transuerso ligamento uehitur, cartilagineum quid ad musculi reflexum (idq; in bobus praecipue) ostendit.

Sextus primis quatuor etiam gracilior, ad foramen illud carneus enascitur, quod insigne in interiori anguli orbitae semper proximus, inter os & musculum illum repit, cuius beneficio oculum deorsum agimus. Vbi uero sextus musculus externum latus oculi attingit, in membrana cessat tendinem, illi lateri oblique tam alte uersus anteriora insertum, ut quinti musculi tendinis externum latus ueluti attingat. His duobus ultimis musculis circumuertendi munus ascripti, illisq; oculum uersus minorem angulum ualide etiam agi existimo.

Alter apertioni oculi seruit, à Vesalio oculo ascriptus est cum primis quatuor oculi musculis. oritur ab ingressu optici nerui in oculi orbem, & recti latus carnosiusq; superiorem regionem oculorum transcendens, pinguedini implicatus, deinde lato tenui ac tendinoso fine in cartilagineum superioris palpebrae, secundum latitudinem inseritur. ita trahendo hanc cartilagineam ad suum principium, oculus aperitur. Gale: & Vesalius duxerunt musculum palpebram sursum trahentem à fronte prodire, quod fieri nequiuisset.

Alter oculi clusioni dedicatus est, qui ut sphincteris cuiusdam munere fungitur, ita et similem cum inferioris palpebrae musculo formam nancisci uidetur, unus enim in orbem oculum ambiens cernitur, operatio idem demonstrat, nam simulatq; quis oculum artissimè uelit ocludere, & palpebra inferior etiam ad internum oculi angulum, utpote ad musculi huius principium trahitur, ac leuiter sursum ad palpebram superiorem adduci manifestè satis conspicitur. enascitur ex interno angulo & sutura capiti & maxillae superiori communi acuto principio, & uniuersae palpebrae cuti orbicularibus fibris subternitur, & latus carnosiusq; in citho minori cum palpebrae inferioris musculo, si alioqui peculiaris sit musculus, ita commiscetur, ut unus cum inferiori appareat. talis etiam confusio est cum musculo frontis, at cognitu facilius est haec separatio.

His adiecit columbus tertium eodem principio, quo primus, exortum, qui oblique uersus magnum cantum palpebrae tereti tendine inseritur, huius munus est primi musculi motum innuare. uidetur primi portio esse.

Inferiorem sane opinor satis conspicuo motu moueri, ut unusquisq; in semetipso deprehendere poterit. conficitur enim ad hunc motum peculiarem ac satis manifestum musculum, qui paulo supra lachrymalem meatum carnosus et gracili principio ortum ducit, hinc ad palpebram inferiorem tendens, ei semper substratus, totius carnosus ita dilatatur, ut totum mali os tegat. ad medium os mali uidetur in duos scindi, qui tamen uno lato carnosiusq; sine iuxta cantum minorem fini superioris palpebrae musculi immiscetur. huius munus est leuiter trahendo palpebram inferiorem, superiori adducere: firmiter trahendo oculum ex alio ocludere, & ita obit medij sphincteris munus. cum utraq; palpebra ad cantum maiorem trahitur, cantus minor ualde stringitur isq; etiam ad maiorem adducitur, ex quo motu constrictioneq; si quid pulcrum, uel muscarum, uel humoris in oculo sit, ad internum propellitur angulum.

Partes sine quibus non, sunt nerui, uene et arteriae, nerui duplices, quorum alij uisui inservientes et sunt optici, siue uisorijs: alij sensui et motui ex secunda coniugatione exorti. Haec satis nota sunt, & ad proprias tabulas pertinent, quare eorum historiam non attingam. unum tamen tibi animaduertendum de optico neruo alij forsitan ignotum, uenit. Opticus neruus minime ut Galenus alijq; eius affectu uoluerunt, ex solido corpore eoque perforato constat, uerum non aliter, atq; ceteri omnes nerui, ex multis neruosis fibris siue filamentis sibi mutuo membranarum beneficio commatis conflatur. hoc in bouino optico neruo luce clarius est, nam si medullarem frustis cuiusdam nerui optici humiditatem digitis expresseris, filamenta neruosa conspicies. idem attestatur Eustachius in examine osium, ubi sic inquit, neruus uisorijs ueluti tenuissimum matronarum interum in innumeras rugas aequales, & pari serie distributas complicatus, tuniculaq; illas ambiente coactus, hac eadem incisa euoluisse peremittebat, & in amplam membranam totum explicari atq; extendi. De his alijs, si Deo placuerit in proprijs tabulis accuratius prolixiusq;.

Finis Tabularum Oculorum.

PRAEFATIO, QVAE CON-
TINET HVIVS OPERIS CAVSAS, ET
SVMMA PRAECIPVAQVE CAPITA.

PARADIGMA ANATOMICVM BENIGNE lector, quod tabularum forma in oculo ordinis ac memoriae gratia Anatomiae candidatis, ac studiosis imitandum proposui, dignum mihi visum fuit, vt & continua orationis serie, eadem methodo observata, ad auditus organum accommodaretur. Siquidem plurimi meorum olim auditorum (quod absq; iactantia sit dictum) quos Bononiae ac Perusiae habui, sese anatomiam hoc modo traditam facillime comprehendisse, & ad artis usum aptatam esse existimarunt. Adde quod in auditus instrumento multa cognitu non minus iucunda & utilia, quam difficilia, admirationeque ob stupendum nobis, per obscuram quandam nebulam vix notum D. O. M. artificium, quam dignissima sint. Introductionis siue generalioris methodi loco huc adferam procemium, quam breuissimum & elegantissimum, quo Galenus fragmentum illud de vocalium instrumentorum dissectione exorditur, atq; quod nostrae methodo etiam includitur, inquit autem hoc modo: Omnes, qui ratione curare velint, ij causas humanarum actionum, qui secundum naturam sint, affectionum, quae praeter naturam adueniant, illas vt tueantur, has vt e corpore extrudant: tum vero quibus modis fiat actio, vt loca, in quibus obeatur, & instrumenta, quorum opera vtatur, nosse debebunt. nam si modus actionis erit nobis perspectus, cum naturam dyceim imitemur, promptiores ad ferendam opem efficiemur, locus vero nobis monstrat, vt affectas partes curemus, ne partibus valentibus, tanq; affectis molestiam sine causa adferamus: & aegrotis tanq; valentibus non auxiliemur, instrumenta porro suam cuiusq; curationem ostendunt. siquidem alio modo nervus affectus, alio cartilago, alio deniq; caro curari postulat. Cum igitur necesse esse videatur, vt actiones earumq; causas itemq; instrumenta & loca, & modos cognoscamus, nobis compertum esse debet a quibus fiat auditus, cum autem omnia in hac vita efficiantur a tribus, vt artificibus, instrumentis atq; materia, quemadmodum faber aenarius est artifex: instrumenta malleus & incus, materia aes, opus effectum est lebes, vel concha: eadem in operibus, quae in nobis sunt, sunt, ratio sit, necesse est. Causae & artificis rationem obtinent facultates nobis innatae, quarum aliae naturales, aliae animales sunt, audiendi vero potentiam ad animales, & non ad naturales facultates stirpibus communes referri satis est notum. Siquidem cerebrum spiritus animales, facultatum instrumenta ac vehicula, per nervos auditorios ad aures auditui accommodatas transfundit, quoniam vero auditus externo quodam instrumento administratur, inter sensus exteriores recensendus erit, Materia auditus elegantissime demonstratur a Fernelio, qui ita inquit: E sensibus externis alij contrectando munere suo funguntur, vt tactus & gustus, qui non nisi coniuncta percipiunt, alij medij cuiusdam corporis interposito sentiunt, vt visus, & auditus & olfactus, corpus id medium intercedens, aut aer est, aut aqua: vtrunq; enim elementum ad inuentionem eorum, quae sentiuntur, idoneum est: nam colores & sonos per aerem percipiunt, quaecunq; terrena gradiuntur aut serpunt animantes, per aquam vero aquatiles, in hac obscure, in illo vero magis conspicue, materia itaq; auditus est vel aer, vel aqua.

CAPVT PRIMVM DE AVDIENDI MO-
DO ET DE IIS, QVAE AD AVDIENDVM
pertinent.

Adin-

AD Instrumentorum auditui inferuentium historiam anteq̃ peruenero, operę precium esse duxi Galeni p̃cepto, actionem actionisue modum declarare, sic fores ad sequentia rectius assequenda aperientur. inquit enim Galenus, cum aliquam partem explicare volumus, totius instrumenti actio oportet vt sit cognita, ita demum particularum, quę ipsi instrumentis insunt, vtilitates exponere semper conuenit, omnes enim vsum habent constructionis scopum, totius scilicet instrumenti actionem. Actionis modus nobis innotescet ex definitione auditus obiecti, quod sonus est, & modo communicationis aquę vel aëris per sonum alterati, cum aëre interno.

Primò de sono, Sonus est qualitas prodiens ex aqua, vel aëre à duris solidisq; corporibus ijsq; leuibus, concauis & amplis affatim magnoq; impetu inuicem collisis & concurrentibus, percussio. Hęc est soni definitio, quam nunc latius explanabo, quòd ad sonum desideretur aëris reuerberatio, antra, specus, sylug, montes cauernosi, putei locaq; caua atq; angusta, quę non tantū sonos, verū etiam voces articulatas exceptas reddunt, attestantur. Aërem oportere maxima vi, ac confertim in rem renitentem ac duram impelli indeq; repelli, in tympanis conspicuum fit, siquidem in his si corium, quod per tympanum expansum est, fuerit humidum laxumq; sonus redditur obtusus, vel nullus, sic & in omnibus instrumentis Musicis fidibus obductis, vsuuenit. Quantum ad rei reperiutientis aptitudinem pertinet, desideratur primò durities, mollia enim cedunt & non resistunt rei impellentis vi. Secundò est amplitudo siue latitudo, p̃cipue quę cum æqualitate coniuncta, nam acuta corpora tenuiaq; aërem scindunt minimeq; aëri in reperiutendo vim inferunt. Tertiò si accedit concauitas, iam aër per sonum alteratus à labris siue lateribus rei concauę congregatus, vnitus, & minime dispersus redditur, maioremq; sonum efficit. Aëre iam per impulsū rei durę fracto, siue sono affecto, proximus continuusq; aër alteratur atq; commouetur, ex eo successione vicinior, donec perueniat ad aures, hoc non aliter contingit, atq; in aquis, fluminibusq; cernitur, in hęc si iniicias vel lapillos, vel glebas terreas, statim videbis circulos siue gyros excitari, quorum alter alterum excitat, quoad ad aquarum riuulorumq; siue flumium ripas, vel ora impulerint, vel in amplis aquis sponte soluti fuerint. Simili modo in aëre putant Philosophi à sono circulos generari, atq; ad aures peruenire. Quòd si lapillus siue gleba aliudue magnum sit, atq; magna vi iniiciatur, ita vt suos gyros vehementer in ripas siue labra amnium fluminumq; impulerit, circuli repelluntur atq; geminatim recurrunt ad primum gyrum. Simili ratione fit, si aduersus loca concamerata & testudinibus obducta, syluas atq; montes loquamur, vel clamitemus, nam in ijs vox duplicatur, ac echo generatur. Hinc accedit, vt non simul ac corporum allisio conflictusq; inciderit, sed aliquanto post ictum sonus audiatur, priusq; à propinquo, quàm à longinquo. hęc de natura atq; generatione soni, nunc de communicatione aëris percussu cum aëre interno particulisq; internis. Primò notandum est, quòd in aure sit spiritus quidam inclusus siue implantatus, cuius beneficio percussu aëris qualitates cum communi sensiterio communicatur, hoc Plato primus inter Philosophos docuit, dixit enim aërem, qui auribus insidet, pulsari, pulsū in principem animi sedem mitti, sicq; auditum effici. Nunc pergamus ad reliqua. Ad sentiendum quippiam, oportet vt sit mutua actio ac passio inter sentiens & sensibile, ad mutuam actionem passionemq; mutuus contractus requiritur, vnde sequitur, quòd cum aër externus agat, internus siue implantatus patiatur, internum alterationem aëris externi excipere cumq; tangi ab externo. Sed hoc non fit immediate, sed interposita membrana, intercedentibus ossiculis quibusdam stupendo naturę artificio, hoc modo. Aër externus soni qualitate affectus in membranam myringam incurrit, myrinx pulsata ossicula membranę colligata commouet, ossicula porò neruum quendam per transuersum membranę expansum percutiunt, ex illa nerui siue funiculi percussione ipse neruus in membranam reperiutitur, vnde aër inclusus alterationem & sonos excipit, soni verò per aurium tortuosos & flexuosos anfractus circa villam turbam fertur, peruaditq; ad neruum auditorium, hoc demum exploratore & ministro, strepitus imago ad sentiendi principium transmittitur. Vesalius eiusq; affectu ita auditum fieri tradidere, neruus quinti paris per meatum quendam tortuosum procedit, & in

membranam aurium foramini obductam sese explicat, ea quoniam tenuis, sicca et valde tensa est, ab aëre pullata accedente ossium durtiē, quæ antrum cochleamue æmulari sonum efficit, nullum aliud artificiorum addunt. Antiquitas in anatomia imperita, atq; rudis aliter sensit vt ex Empedoclis sententia liquet, putat enim auditum fieri, quod aër intimam aurium partem impellit, cum enim ea in cochleæ morem conuoluta sit, ac tanquam tintinabulum edito in loco appensa, omnes aëris ingruentis appulsus percipit. Alcmeon ideo nos audire ait, quod aures intus sint vacuæ, et vacua resonare omnia, cum in ipsa vox incidat. Diogenes esse in capite aërem, eumq; percuti vocibus, & commoueri putat, Platonis sententia omnium verissima est.

CAPVT SECVNDVM DE INSTRV-
MENTIS AVDITVI SVBSERV-
entibus.

Nunc verò, quò intelligatis qua ratione singulæ partes ad hanc functionem absolute & perfecte administrandam à D. O. M. efformatæ sint, ad instrumentorum explanationem me conuertam. Exordiar ab eo, quò oculis nostris primò occurrit, nimis ab aure. Attamen totum negotium in quatuor partes partiar, quarum prima continebit quomodo & per quam viam aër externus permeet ad membranam myringam. Secundò quomodo generetur percutiaturq; aër implantatus in propria sua sede. Tertiò per quas vias, & qua ratione aër implantatus suas qualitates nervo auditorio communicet. Quartò & vltimò nonnulla de nervo acustico adijciam, & ita tota de auditu absolute ueritas, præstabo hæc per partium his functionibus subseruentium explanationem.

CAPVT TERTIVM DE AVRE.

Nunc de aure, de qua Galenus II. de usu partium sic loquitur: Natura omnibus sensuum instrumentis operimentum fabricatur, alijs quidem, ne cerebrum, quod eis est propinquum, lædatur: nonnullis propter securitatem propriam. hoc videmus in plurimis sensibus externis, olfactui præfectum est os ithmoide, oculis palpebræ, nasus, maxillæ, supercilia, cutis circumfusæ motio. Linguae nullum contigit propugnaculum, siquidem in ore quasi in specu est conclusa. quid de auditu instrumento, quod propugnaculo caret, minimè munimentum requirebat, siquidem nervo auditorio, & cerebro præfectus est meatus admodum tortuosus & anfractuofus, atq; etiam inuolucrum aliquod, quod impedit, quò minus, quæ extrinsecus incidunt, ipsi nocerent. Quapropter auris non potest hac de causa à Deo esse fabricata, vt cerebrum ab externis iniurijs tueatur, sed in alium usum, in quem, nunc audietis.

Cum auditorius meatus à lateribus, non in anteriori parte, vt nares & oculi sit collocatus, facile sonus auditorium meatum præteriret. Secundò cum à posteriori parte antrorsum vergit meatus auditorius, & nos antrorsum mouemur, nos difficulter audire contingeret, si nihil à posteriori parte obstaret, quod sonum repelleret, siquidem appulsæ voces meatum auditorium præterlaberentur aberrarentq;. Natura itaq; in illum usum præfecit auditorio meatui à posteriori parte aurem cauam ac prominentem, quæ non solum sonum illabi non sinat, verum etiam sonum repellendo fundit, vt à posteriori parte sonus percussus antrorsum versus auditus meatum ingrediatur. Hoc testatus est Hadrianus Romanorum Imperator, qui cum hunc sensum læsum habebat, manus cauas, quò audiret facilius, à posteriori parte auribus obtendebat. Hinc etiam bruta aurita naturæ instinctu aures ad sonos vocesq; circumagunt.

Quò his vsibus commodius inservire possent, & ne, cum nudæ eminentesq; sint iniurijs externis, quibus sunt expositæ, offenderentur, vel contunderentur frangerenturq;, dum multis varijsq; modis inter cubandum, in impositione galearum pileorumq; contrectantur, ex dura ossisq; substantia, quæ ad externarum rerum vim ac impetum ferendum

INSTRUMENTO.

91

ferendum aptior est, atq; mollis, componi debebant. Caterum ossæ partes rebus foris ingruentibus non cedunt, earundemq; vim exoluere nequeunt, deinde facile rumpuntur, mollis substantia, vt caro, sonum non repellit, ac facile contunditur, quapropter aures medium quid inter extremè molle & extremè durum consequutæ sunt, quod nimirum ob mediocrem duritiem vsui aptum est, & ob mediocrem mollitiem cedere, ac offendentium impetum absq; contusionis ruptionisq; periculo refringere quibit, & hoc est cartilago, constant enim vnica flexibili cartilagine, tenui cute, eaq; pertinaciter cartilagini adherente, obducta, Cartilagini ab inferiori regione appender substantia molli carni similis, fibra vocata.

Ab inferiori loco vbi aures ab ossibus temporum, tanq; ex profundo eductæ, principium sumunt, crassiores atq; duriores ob vicinitatem ossis temporis, vnde prodeunt, existunt.

Porro consideremus, quàm egregiè vsui inferuiat aurium figura, situs & magnitudo. Quantum ad formam spectat, primò rotunda est, nam rotundum ab iniurijs omnium est remotissimum, ad eundem vsum etiam multos habet flexus, magis enim eo modo complicari possunt, atq; in se ipsas duplicari, quàm si simplex tota vniusc; figuræ vtraq; fuisset. Extrinsecus sunt conuexæ, intrinsecus cauæ existunt, & id, ne quid exinopinatò intrò irrueret, neue aures facile afficerentur.

Ab exortu ad auditorium meatum magis sunt concauæ, quò melius aëri percusso obiectæ cum ad meatum auditoriū repellant. Non temerè etiam ab anteriori regione & posteriori ad ingressus principium processibus cartilagineosis protuberant, nimirum vt interiores partes tantò forent à rebus externis securiores. Notandus quoq; venit sulculus inter fibram & processum anteriorem, per quem, tanquam per riuulum, auris pure, & alia quauis fluxili materia sese egregiè expurgat.

Magnitudo aurium homini cum brutis non contigit, siquidem caput pileis, galeis, aut alijs tegumentis tegendum erat, qua in re magnitudo plurimum obfuit, tam magnæ tamen sunt, vt ad sonare, meatum operire simulq; minime impedire possint, quominus quiduis capiti iniiciatur.

Animaduertendum etiam quòd in hominibus parum vel nihil moueantur ratio est, quòd etiam si mobiles versatilesq; essent, cum paruæ sunt, parum vel nihil nos iuuissent. De aurium situ Cicero 2. de natura Deorum, ita loquitur: Aures cum sonum recipere debeant, qui natura in sublime fertur, rectè in altis corporum partibus sunt collocatæ.

CAPVT QVARTVM DE SEDE AUDITVS IN GENERE.

POSTquam hanc materiam de auditu ordine resolutiuo, qui ab vniuersalibus ad particularia procedit, tradere constituimus, antequam ad partes singulas perueniero, in genere de sede auditus, quæ interna processus petrosi parte, de qua in tabulis de ossibus, comprehenditur, prius agendum esse duxi, vocatur ossis petrosi processus, sedes auditus, auris, & meatus obliquus, causas ex tabulis ossium intelliges.

Sedes hæc nihil aliud est, quàm ossis petrosi portio intus in caluariæ regione protuberans, quæ collocata est inter processum mammillarem & processum ossis iugalis. Sic totus hic processus petrosus, magis in interna caluaria conspicuus est. In brutis ossi temporum ita assidet, vt non solum in iuuenis, verum etiam in prouectioribus facillimè separari diuidiq; in duas partes poterit. Cum per hanc sedem externarum rerum sonis integra forma transeundum erat, ita hæc sedes extrui debuit, vt nihil in transitu amitterent, aliquid verò sonis abscederet, si sedes, in qua sonus intus generatur & per quam sonus transmeat, ab aëris impulsu impetu desiceretur. hoc conspicuum fit in rebus externis, siquidem si in vesica loquaris, nullus edetur sonus, vel admodum obtusus, si in æneū canale, ingens fundetur sonus: eadem est ratio in fistulis musicis, organis & campanis. quare hæc pars constat ex solidissimo ac durissimo osse, huius rationem ex præcedentibus mani-

bus manifestius intelliges. At si vnde quaq; solidus esset hic processus, sedem auditus nimio pondere grauasset, hinc maior processus huius pars est spongiosa, in qua elaboratur atq; excoquitur aër implantatus, atramen viæ, ductus atq; canales crusta dura densaq; ob causas dictas, obducti sunt. Forma rotunda, quò maior aëris implantati copia excipi quiret, conduxit: si exigua copia sufficiebat, etiam rotunditas vtilis foret, sic enim paruo angustoue in loco contineri potuit aër implantatus, & minimè necessum erat ossis onere, atq; loci magnitudine vicinas molestare partes. est quidem rotunda quoquomodo, at oblonga, idq; alio modo vix melius contingere quiuir, nervus enim auditorius post opticum omnium mollissimus, absq; sustentaculo vel coniugatione vlla sine rupturæ periculo longè à cerebro recedere non potuit. Vnde Deus exproduxit hoc os eousq; introsum versus, vt statim atq; nervus auditorius extra cerebri substantiam proruperit, eum excipere tutò possit. Cur verò Deus non propius nervo auditorio aures apposuit? primò aures, ob commoditatem excipiendi aërem externum, foris agglutinare quasi oportuit. Secundò hæc sedes secundariò desert vel venam iugularem, vel arteriam aliquam ad cerebrum, vt autem tutò ad cerebrum peruenirent, prolongata est hæc ossis pars, & canalem huius venæ transitui accommodatum consequuta, exproductio huius ossis est, vbi venæ optimè pertingere possent ad cerebrum, vt rete mirabile constituent, Vbi primò hæc sedes ab osse temporum prodiit, latior & crassior est, sic gyri anfractusq; multi ad auditionem illi imprimi queunt, sensim magis exacuitur ad extremum vsq; vbi vena iugularis, vel arteria in cerebrum ingreditur. Forma in finia propè ad humanam accedit, in alijs brutis quàm longissimè distat. Est omninò vt vniuersum temporis os à vicinis partibus separatum, nam ob suam duritiam cum reliquis ossibus mollioribus coalescere nequiuir. situs eius sedis est inter os sincipitis & os cuneale, tendit à posteriori parte antrosum versus descendendo, oblique versus nervi auditorij exortum, quoniam hic processus propter amplitudinem capitis homini propriam, magis, quàm in cæteris animantibus introsum, protuberat, longior etiam est factus. Postq; musculi nec ei inferi, nec inde pronasci debuere, asperitatem externæ faciei similem non consequitur, sed leuem quandam inæqualitatem crusta leni obductam.

CAPVT QVINTVM DE MEATV AV- DITORIO SIVE OSSEO CANALI.

Absoluta iam in genere historia de sede auditus, singulas partes aggrediar. diuisa est hæc sedes in tabulis de ossibus in quatuor meatus, quos hic ordine pertractabo, & primò de primo, qui propriè vocatur meatus auditorius. Per hunc aër per sonum alteratus atq; ad aurem delatus impulsusq; in auris concauum, à posteriori parte antrosum, obliquo ductu transmeat ad pelliculam myringam. Duplex autem huius est vsus, quorum primus est, vt si aër in aurem ingressurus vel frigidior, vel calidior, vel ingenti sono affectus fuerit, ea omnia remittat, antequam ad membranam siue neruum auditorium peruenerit, & simul hac ratione internæ partes forent ab externis rebus tutiores. Siquidem experimur frequenter myringam acutissimo sono, bombardarum ingentissimo stridore, item campanarum maximarum pulsatione, deniq; à frigore intollerabili affici dolore, immò rumpi, vnde subsequitur surditas, vnde myringæ & nervo auditorio hic canalis siue meatus prepositus est. Secundus est vsus, aërem percussum in angustum colligere, quò tantò distinctius audire queamus, nam si aër percussus transierit per locum amplum, diffunditur, dissipatur, & multum de sua vi amittit; at per angustum transmeans, in vnum colligitur, atq; ex illa collectione maiorem vim acquirit. Angustia hæc non solum ad auditionis intentionem sufficit, verum etiam Deus addidit soliditatem et duritiam, nam sonus in transitu vehementius in meatus siue canalis parietes impulsus vi & efficacia magis intenditur, si ambitus fuerit osseus atq; durus, atq; si esset membraneus mollisue. Osseus hic canalis distinctus est à reliquis subiectis temporum ossium partibus in puerulis, ita vt ad septimum mensem per cocturam sciungi possit, & id, quia cartilagine, vt multæ aliæ appendices, in crustatus est, deinde membrana myringæ mollior ex cartilagine,

cartilagine, atq; ex osse adipiscitur principium. est etiam in puerulis totus quasi cartilaginofus, in adultis media ex parte cartilaginofus, & media ex parte osseus. cartilago verò oritur à cartilagine auris, quæ ab osse temporis ad illius meatus circumferentiam, veluti ex profundo, auris corpus potissimum efformat auræmque sustinet. Ductus minimè re-ctus, verum obliquus est quatuor de causis, quarum prima est, vt aëris vel frigiditas, vel caliditas intensior, antequam ad myringam peruenit, exolueretur. Secundò prohibetur ingressus paruorum animalculorum ac corporum, quæ in aurem ingressa, aliquando ingentes cruciatus adferunt. Tertio obliquitas concessa, ne sonus, qui in aurem ingreditur, rectà membranam petat ipsamq; lædatur, n. obliquus minus, quàm qui rectè fertur, offendit. Quarto, quo sonus ingens affatimq; in aurē immisus, ex obliquo ingressu frangatur, anteq; in membranā impellatur. Obliquus hic ductus non oblique deorsum, sed oblique à posteriori parte antrorsum sursum versus tendit, quò tantò difficilius vel puluis, vel aliud quippiam in aurem ingreditur. Secundò, vt si quid ingressum sit, facile elabi queat. Si verò deorsum deflexisset, ex diuturna hæsiōe rerū externarū, in maxīma mala atq; incommoda myrinx incurrere potuit. Tertio, vt respiciens cavitatem cochleam, cum ea coniungeretur. At enim paulò ante myringam est quædam decliuitas eaq; tamen talis, vt si aqua aliudue quippiam in aurem ingressum fuerit, id leui capitis ad latera flexione excuti possit. est & hoc in loco aliquantò latior, quò capacitas aliquantulum dilataretur, terminatur ad tympani vel cochleæ principium, vbi myrinx satis ab externis periculis tuta est, vestitur hic canalis aliquò vsq; cute auris, quæ ab aure intus procedit, sed sub ea tamen continetur meo iudicio membrana à perioestio producta, quæ ab Aristotele *μυρινξ*, ab Arabibus myrinx vocatur. Hæc de primo meatu siue canali sufficiunt,

CAPVT SEXTVM DE COMMVNICATIONE

NE AERIS EXTERNI CVM IMPLANTATO, ET

Myringa siue timpano.

Absoluta iam historia de auditu parte, vtpote qua ratione ac quibus medijs sonus ad myringam perueniat, sequitur vt agam quomodo communicetur cum aëre interno, & qua ratione aër innatus ab aëre externo afficiatur: incipiam hic à membrana myringa, tanquam mediastino, siue septo, inter meatum primum & secundum. Ad auditum requiri aërem tranquillum, quietum & purum, aër ventorum agitatione turbatus, aurium tinnitus, sibilus et sonitus demonstrant. deinde aërem implantatum tenuem, subtilemque citissimè facillimèq; aëris externi alterationes excipere, satis est notum. At si hic aër implantatus communicaretur immediatè cum externo, propter permixtionem & confusionem cum ambiente (qui in perpetua agitatione existit, & satis crassius caliginosus et impurus est) conturbaretur crassiorq; præsertim cum in aëre nebuloso, pulueru lento, ac fumoso versamur, per consequens ad auditum ineptior fieret, deniq; dum sub aqua sumus, in auditorium meatum ingrederetur aqua, quæ nos omnino auditu priuare posset. adijciatis irruptiones animalculorū minimorum ac aliarum rerum externarū. Vnde D. O. M. aërem externum ab interno, septo membraneo seiunxit, huius præcipuus vsus est, noxia externi aëris inuitabilia excipere, atq; internas partes ab externarum iniuriarū tueri. At quamuis substantia externi aëris cum interno communicari nequeat, tamen necessum est ad auditionem, sonum cum aëre implantato communicari, id verò fieri nequiret, si hoc septum ex osse substantia dura & flexioni inepta constitisset. Siquidem pulsari atq; sua tenuitate sonum transmittere debuit. Caro verò ob nimiam raritatem multa noxia & mala admitteret, quæ membranosa substantia propulsat, ob laxitatem etiā foret inepta ad sonum transmittendū. Hinc itaq; septum hoc à Deo factū est ex substantia membranosa, eaq; tenuissima ac pellucida, verum densa, nullis poris conspicuis prædita, ob densitatem externa mala propellit, ob tenuitatem sonum aëremq; subtiliorem transmittit, deniq; ob eandem tenuitatem pulsationem ad auditum necessariam perferre potest. Hippo: in lib: de carnibus inquit, pellicula in aure iuxta os durum, tenuis est, veluti aranearum tela, & omnium pellicularum siccissima, id enim auditui conduxit,

NN

tui conduxit, nam quod siccissimum est, maximè resonat. Quidam volunt hanc membranam à pia matre prodire, quidam à ramulo quintæ coniugationis neruorum cerebri, at anatomica administratio hæc falsa esse demonstrat, sed potius originem trahere à periosio, quod sub cute meatum auditorium inuestit: tandem in meatu aliquantisper dilatatur, petens leniter deorsum ad timpani principium vsq; ibi paruus processus oblique rotundus ex osse petroso erumpit tali figura, qualem calamus scriptorius, cum prima obliqua incisio illi est indita, exprimit. Hic processus factus est caula annexionis membranæ cum osse petroso, quod verò firmior & tutior foret hæc insertio processus, circumcirca in medio leuiter excauatus est, marginesq; duas consequitur ossæ eminentes, sic vtrinq; myringam melius amplecti potest. myrinx ab ipso processu recedit & se interponit inter poron acusticum, & timpanum, separans alterum ab altero. Situs eius est non transversus, sed obliquus, non aliter, atq; si scriptorium calamus, ea parte, qua densus & attemperatus est, tensa membrana obducamus. Situs autem causæ sunt duæ, prima, vt membrana magis recta respiciat cavitatem primam, quæ meatu auditorio elatior existit. Secunda impedire, ne sonus impetuofus, ær prauus, aut aqua, aut quicquam aliud auditui noxium, in aurem ingrediens rectà membranam petat, ipsamq; lædat, ictus enim obliquus minus offendit, quàm qui rectà fertur. hæc de myringa eiusq; operationibus, nunc de modo generationis æris implantati eiusq; alteratione, deinde de vero meatu, ijsq; quæ in eo reperiuntur. sunt autem hæc ossicula tria, chorda, musculi, fenestræ duæ & meatus ad palatum tendens,

CAPVT SEPTIMVM DE AERE IMPLANTATO.

Aër implantatus ex eo nomen consequutus est, quòd priscis Philos: ac Medicis in secundo meatu visus fuerit ita conclusus, vt vbinam ingrediatur, nulla ratione inuestigari potuerit. Vnde existimarunt multi, à primo animalis ortu hunc aërem à creatore huic meatui immisissum. at antiquos scriptores in hoc deceptos esse, rationes manifestæ anatomicaq; administrationes testantur. Primò, quòd si ær inibi implantatus esset, nec alium aërem, nec aliud quiduis foris admitteret, nec etiam ingressis in eam cavitatem exeundi viam præberet. cæterum deprehendimus ore, naribusq; oclusis, cohibito spiritu, ac inflatis buccis, aërem ab ore in aurem impelli, & auditus organa percutere, ær verò impulsus ex transglutitionis conformatione vel simulatione regreditur. Secundo, multoties flatu, siue halitu crassus tinnitum excitans, per masticationem educitur. Tertiò, est manifesta satisq; ampla via à secunda cavitare in os, per quam viam, illa cavitatis masticatorijs alijsue medijs expurgatur. Quapropter opinandum aërem implantatum non esse in secunda cavitare conclusum. Vndenam prodeat, & à quonam foueatur, cognitu admodum difficile est. A cerebro per neruos (vt scriptorum maior pars opinatur) eò transfundi vix potest, nam nullus neruus (vt in oculo alijsq; nonnullis sensuum instrumentis contingit) in aure terminatur. Est quidem via aperta ab ore & naribus, per quam ær externus in secundam cavitatem immitti possit, sed num hic ær sit ad audiendum aptus, non ita liquet. Cæterum cum hic spiritus nihil præter æris in sono mutationem pati debet, consiendum est per os, & nares aërem externum immitti in secundam cavitatem, indeq; generari, vel saltem foueri aërem implantatum. Immo etiam si aliunde, quàm ab externo prodiret ær, tamen sine dubio non erit sincerus, purus, & impermixtus. Aër hic qualiscunq; sit, est primum & præcipuum audiendi instrumentum, pars scilicet animæ. Secundaria autem instrumenta sunt eæ omnes partes, quæ ad audiendum aliquod adiumenti præbent. Quidam scribunt, cavitatem ossis petrosi aërem implantatum continentem, ea ratione habere ad auditum, qua crystallinus humor ad visum, nimirum quòd primum sit auditus instrumentum, at hoc falsum esse quisq; facile iudicabit ex eo, quòd os sonum ita excipere nequeat, vt crystallinus humor colorum diuersitates splendoremq; at ær verò hoc facit, quare ær

re aër erit principale audiendi instrumentum. cur autem aëris beneficio audiamus, in prima parte tractatus de auditu satis clarè docuimus, quare ad reliqua,

CAPVT OCTAVVM DE SECVNDA CA-
VITATE, VEL SECVNDO MEATV, ET IN EO
contentis, in genere,

HÆc cavitata non vno nomine à scriptoribus appellatur. Aristoteles autem, sententia multorum Philosophorum vocat hanc cavitatem cochleam, sic & Eustachius cochleam & antrum. Fallopius verò tympanum, Vesalius peluim. Equidem opinor eos, qui hoc ex Aristotele sumpserunt, Aristotelem non rectè intellexisse, ipsiq; vsuuenisse, quod his, qui neglecta rei inspectione, rerum naturalium scriptores pro proprio iudicio interpretantur. Aristoteles nulla ratione quiviit hanc cavitatem cochleam appellare, siquidem nec in brutis, nec in ratione præditis vllam cum cochlea similitudinem obtinet. Secundo ex Aristotelis verbis id elici non potest, inquit enim hoc modo primo de natura animalium cap. 11. Pars auris interior anfractui cochleæ similis definit in os, quod auriculam imitatur, & adjicit, hinc meatus nullus ad cerebrum est, at in oris meatum semita pertendit, quod & nos deprehendimus. ex his verbis non licet colligere, quod pro interiore parte solummodo secundum hunc meatum tympanum intellexerit. Equidem opinor Aristotelem voluisse hic intelligi tertium cum secundo, nam in tertio meatu cochleæ forma conspicitur, & non in secundo, quod si vocasset concham à similitudine conchiliorum, iam brutorum aurium secundo meatui hoc vocabulum ascribi posset, quòd dicat Aristoteles definire in os auriculæ simile, in brutis, & non in hominibus verum est.

Quòd Fallopius vocarit tympanum, ex brutorum & ruminantium præcipuè aure sumpsit, siquidem ea meatum hunc instar mediæ conchæ, vel tympani turcici formatum habent. Homines toto cælo à timpano discrepantem formam consequuntur, quapropter puto hunc meatum potius vsus, quàm formæ causa, tympanum appellandum. Nam quemadmodum in timpano aër contentus pulsatus, proprium suum edit sonum, sic putant aërem implantatum percussum à myringa, ossiculis & neruo, sonorum differentias in secundo meatu exprimere, quò inde ad auditorium meatum deferantur. Potest et tympanum dici, eò, quòd super hanc cavitatem extendatur membrana, vt in turcicis fit tympanis. Tertius meatus potius cochlea appellandus venit, quàm secundus. Hic secundus internus est & propria sedes auditus, habet duos alios per successuum ingressum sibi mutuo coniunctos. Destinatus est hic secundus aëri implantato, vt nimirum in eo fieret sonus, tinnitus, & susurrus. Quò autem sonus optimè fiat, oportuit hunc meatum substantia dura atq; ossæa circumduci, ad quam aër vehementer impulsus repercuteretur. Substantia hæc non est reliquis ossibus similis, sed omnium durissima & lapidea. Situm est tympanum inter radices mammillaris processus, & sedem illam, cui caput maxillæ inferioris inseritur iuxta articulum, constituiturq; in principio processus petrosi, cuius intimis partibus insculptum est & statim post myringam. Hinc fit, quòd inflammata intima auris regione circa secundum meatum, vel exhulcerata illa parte, ex commotione inferioris maxillæ, dolor in aure excitetur.

Cavitas hæc cæteris duabus sequentibus eò, quòd multum aëris implantati in se continere, atq; aër per pulsationem alterationes externi aëris excipere debebat, multo maior est. Videtur quasi duplex, nam post myringam statim in superiori parte sursum versus anteriora prodit cavitata primò angustior, deinde sese dilatans, ad superiora retrorsum tendit, vt alia cavitata, ad inferiora deorsum producit. Hæc pars cavitatis secundæ est spongiosa & fungosa, assimilariq; potest & respondet cavitati magnæ in vitulo, quæ assimilatur marsupio aurigarum: in hædis & agnis peris mercatricum, in homine vesicæ formam consequitur. Spongiosa substantia videtur sanè communicari cum mammillaris processus interno spatio: tot enim inibi sunt foramina, tot cauernæ, vt coniiciendum sit inibi spiritum implantatum elaborari, atq; ad perfectionem perducì.

cum verò mammillaris processus basis secus, atq; in brutis sit, forsan cauericula hæc, loco cauarum, ad meatum spectantium in brutis, inferuiunt. Vesalius in obseruationum examine hoc antrum assimilat fodinæ amplæ sedi, à qua plures cuniculi, & viæ principium habent, & in eandem circulatim huc illucue incedentes regrediuntur. Fallopius dicit figuram timpani habere, sed equidem id videre nequeo, intus enim ob fenestras, foramina anfractusq; timpano nulla ratione conferri potest, vt antè docui. Hactenus de timpano, nunc de ijs, quæ in timpano continentur, demonstraturus sum hîc necessitatem horum omnium. Meatus vel cavitates timpanum vocata, destinata est aëri implantato, qui cum sonum, vel aërem externum alteratum à sono excipere debet, necesse est vt percutiatur, cæterum hic meatus separatus est beneficio membranæ à meatu externo, quare externi aëris alterationem, absq; alijs medijs excipere nequit. Hinc Deus artificium inuenit per pulsationem, quæ fit per propria ossicula & chordam, quamuis nunc per pulsationem interni aëris alterationem excipiat, nihil homini conferret, nisi ad neruum auditorium deferatur, idcirco canales sunt facti, tanquã aëris latores ad acusticum neruum. Postquam implantatus, qui purissimus, nullo excremento, vel superfluo infectus conseruari in propria sede debet, per aërem ex ore in secundum meatum immisum fouetur sustenteturq; requiritur necessariò, ne turbido & auditui inepto spiritu implantatus afficeretur, via ad expurgationem idonea, per quam & eadem opera, nouus aër ad ingenti enutritionem nouus succedit. Quæ itaq; in hoc meatu reperiuntur, triplici de causa inibi existunt, vel pulsationis gratia, vel implantati delationis, vel expurgationis simul & noui admissionis causa, quartò reperitur etiam canalis, siue aquæ ductus neruum transmittens. Pulsationi inferuiunt tria ossicula, neruus vel chorda, & vt Eustachius vult, musculus vnus, vt alij, musculi duo. Delationis causa duæ fenestræ meatusq; in labyrinthum deinentes. Ad expurgationem meatum apertissimum in palatum terminantem, de his nunc sigillatim,

CAPVT NONVM DE CONTENTIS
IN SECVNDA CAVITATE, ET PRIMO DE
tribus ossiculis.

Horum ossiculorum vt plurimorum in aure existentium historia, non ita necessaria videt; vt inuestigatione ob reconditum in ijs artificium digna est, eò, quòd vsus officiaq; incerta coniectura assequamur. Tria sunt in hac cavitare ossicula præcis Anatomis ignota, à recentioribus primùm inuenta, quæ à similitudine, quam cum rebus externis habent, nomina consequuntur, veraq; auditus sunt instrumenta: æquè enim in puerulis recenter natis, atq; in adultis perfecta conspiciuntur, cæterum quemnam præbeant vsus, vel quidnam ad auditum conferant, non liquet. Columbus inquit, nobis à Deo esse concessa, vt fiat ab ijs aëris repercussio, nam cum ab aëris motu fiat auditio, aëris ictus in meatu ad hæc deferretur ossicula, fitq; ibi repercussio ad eum sonitum ciendum, qui percipitur. hæc igitur ossicula membrana cedente moueri, atq; inuicem confricari necessum est, vt cum primum os aëris ictu in alterum impingat, illud feriat. Hunc vsus tribus ossiculis attribui posse non opinor, siquidem si ex mutua confricatione sonus hic fieri debebat, inutilis foret chondrodis copulatio, quæ illum impedit attritum. Quapropter credendum est alio quopiam modo auditui conferre. Equidem duos conijcio modos, quorum primus est, vt sonus melius ad neruum auditorium deferatur, auditio enim fit per successiuam communicationem. nam videmus solida corpora aptissima esse ad soni communicationem, vel delationem, cuius rei experientia fieri potest. Inuenias tibi trabem vel ferrum, quam potes longissimum, colloques aliquem ab altero fine, tu vero stes ab altero, ferias digitorum condylo partem tuam ita leniter, vt ictus vix à te percipiatur, alter verò ex altero fine trabis collocatus, si aurem propius ad trabem admouerit quamuis longissimè à te distitus, exquisitius tamen ictus percipiet, atq; tu, sed aliquo post tempore, siquidem per lignum sonus non ita citò, atq; per aërem permeare

permeare potest: idem attestantur Musica instrumenta. Attribuo itaq; ijs, vt sonum per myringæ commotionem ijs participatum foraminibus, per quæ sonus ad neruum auditorium deferatur, & ossibus vicinis communicarent. Secundus vsus est, vt ex horum ossiculorum commotione neruus, siue chorda pulsaretur, & deinceps nerui motus aërem implantatum commoueret ad sonum percipiendum, à membrana enim non ita vehementer pulsari poterit neruus, atq; ab ossibus. Adijcias & his alium vsum, quippe vt excipiendo soni vehementis impetuosiq; vim, impediunt, ne myrinx tenuis, ac valde tensa membrana, affatim ac violenter pulsata, disrumpatur. Quamuis verus vsus nos lateat, tamen eorum historiâ pertractabo. Hæc tria ossicula priscis fuere incognita, duo à Iacobo Carpenſi, vnum à Iohanne Philippo ab Ingrafsia Siculo inuentum. A rerum externarum similitudine nomina consequuntur, & sunt numero tria, diuersa figura prædita, quid verò in causa sit, quòd cum sibi mutuò colligata cohæreant, tria fecerit, & non vnum, ex causa articulationis aliorum ossium conijcere licebit, nimirum ob motum, nam si tria hæc ossicula vnica essent, vel myrinx impulsæ ab ingenti strepitu sonòue, propter ossis rigiditatem & duritiem insignem cedere nequens, rumperetur, vel processus ossis, fracturæ periculum subiret, iam ob separationem & vinculum molle, quo colligantur ligamenti, & vinculo cartilaginoso mutuò hærent, extrema verò horum ossium, quibus in articulum coagmentantur cartilagine illita sunt, ac mollibus quibusdam membranulis ligamenti vice colligantur mobiliaq; redduntur. Myrinx intus absq; vlla offensione cedere potest, compacta autem sunt duobus articulis. Hæc ossicula sunt Vesalijsententia quàm solidissima, soliditas enim ad auditum confert. Soliditas hæc tamen tanta non est, vt paruis foraminibus priuata sint, in quibusdam medulla proportionem inest, duo maiora ossa præcipuè foraminibus scatent. Tertium ob sui tenuitatem minimè.

Nunc de singulis. Primum ab vsu potius, quàm à forma malleum dici scriptores existimant, nimirum quòd dum myrinx mouetur, & malleus commouetur, vel quòd malleus instar mallei fabrilis percutiat myringam. Assimilatur verè ossi femoris, si capita inferiora femoris rescueris finemq; interiorem exquisitè exaceris, quemadmodum enim femur iuxta eius ceruicem duos asciscit processus, quos trochanteres, siue rotatores vocamus, sic etiam ossiculum hæc eadem sede processulos aliquot consequitur, quorum beneficio membranæ suæ firmitus innascitur, dein vt femoris ossis ceruix obliquè versus interiora ad coxendicis ossis sinum vergit, atq; in caput oblongum & rotundum cessat, ita etiam præfens ossiculum à membrana introrsum abscedit, in rotundum caput desinens, quod læue minimeq; asperum est. Ab inferiori parte, mucronis ritu in acutum tendit. Consequitur tres processus, & vnum caput, quorum primus processus est longus & tenuis, quò membranæ secundum ipsius latitudinem innascitur interna facie. Secundus sursum spectat, & eo etiam connectitur cum myringæ. Tertius deorsum tendit, & est fulcrum chordæ, ne in percussione à suo dimouèatur loco. Caput est rotundum, instar capitis femoris, quod in cotylem ischiæ immittitur, tuber hoc sublatum sursum versus anteriora spectat latus meatus auditorij, caputq; hoc ea parte, qua latius est, leui quadam cavitare tuberculum incudis excipit ac secundo ossiculo incudi committitur, vt iste nexus ad articulationem lubricis & leuibus superficiebus efformatam referri possit. Columbus putat baculorum more, quibus tympanum pulsatur, membranam à malleo quati, at mea sententia Columbus in hæc decipitur, nam malleus nullibi membrana solutus est, immò compactio in membrana valida existit, vtiq; si membranam percutere debebat, libera vt esset oportu- it. Malleus cum incude cartilagine illita in articulum coagmentatur, secundo ossiculo, & mollibus quibusdam membranulis ligamenti vice colligantur, quò mobilia forent: compactio hæc valida est. Intus myringi insertitur transuersim, quemadmodum in tympanis fidem vnâ atque alteram crassiorem, membranæ obtendi videmus, quò autem validius firmaretur, oblongum tenuemq; exigit processum, vel caudam, vel pediculum insertum membranæ interna in facie secundum latitudinem. Situs pendet ex membranæ ratione, quæ ab extanti osseo margine, quo

auditorij meatus sedes peluis in modum ampliata circumambitur, exorta est. Secundo ofsiculo quidam à similitudine, quam cum fabrilis incude habet, incudis nomen assignant, quidam ab actione nomen illi tribuunt, eò quòd incudis vicem gerat, excipiens quodammodo ictus permoti ac percutientis malleoli iam descripti. Columbus etiam vocat dentem molarem, nam denti molari aptè assimilatur, qui duas radices habet. At vsus nomine quoquo modo incus dici potest. Huius ofsiculi vsus non ita constat: equidem credo hoc ofsiculum aliæ partis myringis non occupatæ à malleo, spatium occupare, quòd eius partis pulsationem percipiat, deinde vt communicet sonum stapidi, vnde per foramina parua defertur ad neruum auditorium. Consequitur formam dentis molaris præditi duabus radicibus, obtinet gemina crura, altero quod breuius, crassius, & elatius, auri vicinius est, latius, ac in acutum definit apicem, parieti ipsius timpani hæret ea in parte, qua aquæ ductus labitur, hac ratione firmitus hæret malleo, ne in vehementi percussione myringis à se mutuo separarentur. Longius secundi ofsiculi crus, quod suo apice non nihil intorquetur, sursum ex membrana eminet, & inferiori tenuiori parti stapidis affirmatur & nequitur, quòd sonus à secundo osse exceptus, participaretur cum stapede. Præter hos duos conspicuos processus, consequitur minorem processum, pedem vocatum, cuius munus est chordam in sua sede conseruare, ne via delict ea sursum tendat. Est adhuc caput crassiusculum, quod planam quoquo modo incudis partem refert, instar parui incudis, at vbi mallei caput excipit, leuiter deprimatur, necessariò ab alijs ofsiculis separatum est, & vt vsum eundem cum malleo, sic & substantiam obtinet, crassius tamen & breuius existit, positum est ex opposito mallei, nempe in inferiori parte, partem myringis non tectam à malleo integit, attamen crassiori sua portione aurem spectat, cruribus timpanum. Tertium ofsiculum primi inuentores vocarunt à similitudine, quam cum stapede obtinet, stapedem. Verum vt nunc stapedes efformantur, stapedis nomen non meretur, sed vt antiquitus fuere stapedes, nimirum triangulari forma, sine foramine, per quod forum, vt in nostris stapedibus transmittitur, stapes dici potest, est enim triangulare, representans quodammodo græcorum Δ , vel ferreum triangularem, qui annulis aliquot obstitus mendicum cantilenis apud multas nationes accommodatur. munus huius ofsiculi est excipere sonum sibi communicatum ab incude, cumq; per ovalem fenestram ad labyrinthum deferre. Figura illi contigit triangularis, qua autem de causa, me latet. Stapedis cui equorum sellis insidentes pedem immittimus, quasi formam consequitur, in medio est perforatum, multis foraminibus instar spongiæ oppletum, in superficie æquale & planum, inferiori sede tenuius & asperum existit. Latum & vtrunq; amplum longoque sinu veluti ad inarticulationem concinnato donatur, quo superiorem foraminis sedem spectat, quod foramen principium antri cuiusdam statuatur, fodinæ amplam sedem referentis. Situm in fenestra ouali, cui totum præpositum est. Hactenus de ofsiculis tribus in secundo meatu contentis, nunc de musculis.

CAPVT DECIMVM DE MVSCV.

LIS IN SECVNDO MEATV
positis.

DIximus pulsationis gratia secundum Eustachij sententiam vnum musculum, secundum alios, duos auditui tribui, in quem vsum non liquet. Eustachius inquit; organa auditus voluntate moueri, vnde Deum hos animalibus concessisse musculos, equidem ita aio, cum auditus prorsus in nostra nō sit voluntate, aut musculi non erunt, quos musculos appellant, aut si musculi sunt, alij vsui, quam auditui inservire existimandū est. Vesalius in examine non vult esse musculos; inquit enim hoc modo, in anteriori sede sinum etiam vtrunq; insignem, & notatu dignum habet, cui neruosum & fibrosum instar rotundæ oblongæq; glandulæ, cum integrum est organum, insitit. Sunt qui dicunt, cum ex industria illas partes ad audiendum excitare student, vel sese quid in aure moueri, vel audiendi vim intendi, persensiscere, equidem id non ita auditui propriè atq; communiter

communiter motui, & omnibus sensibus attribuere queo, nam ad alicuius animalis operationis intensiorem excitandam, omnes alij sensus concurrere videntur, rursus inquirunt, nulla ossa absq; motu hoc modo articulari. ad id ita respondeo, ossium articulationes ad motum esse factas, at ob id minimè sequi, proprios ad illum motum requiri musculos, etenim reperiuntur in puerorum corporibus ossa capitis, colligata laxis vinculis, sic & ossium multas partes tum membranarum, tum cartilaginibus connexas easq; mobiles, sed tamen absq; musculis, in carpis & pedibus sunt ossa per articulationes colligata sine musculis, sic & ossa pubis cohaerent. Inuenies hunc musculum secundum Eustachium hoc modo, incidis os petrosum, prius aperta caluaria eo in loco, quo linea minimè alte penetrante excelsum est, & versus tenuiorem ossis temporis sedem in anteriorem partem magis eminet, aperiasq; eius squamam. hoc cum effeceris, statim musculus conspiciendum sese exhibebit, qui etiam si omnium minimus sit, constructione nulli cedit, oritur à substantia ligamentis simili, qua parte os cuneiforme cum osse temporis committitur. Inde carneus euadens redditur sensim ad medium usq; aliquantò latior, deinde verò angustior redditus, tendinem gracilimum producit, qui in maiorem apophysim mallei è regione minoris apophysis eiusdem inseritur. & in canibus parum ante insertionem, carneam rotundamq; glandulam aliquantulum depressam habet, illud in parvis animalibus aequè, atq; in magnis conspicuum est, hinc patet illam regulam, quæ vult, quod particularum moles animantibus pro ratione magnitudinis tributa sit, falsam esse nam auditus organa, præcipuè ossicula tria, in pueris aequè fere magna sunt, atq; in adultis.

CAPVT VNDECIMVM DE CHORDA
SIVE FILO IN SECVNDA CAVITATE
existente.

Consequitur tertium in timpano pulsationis gratia factum, & est quid instar chordæ vel fili vt Fallopius inquit, diximus in principio, nos credere aeris pulsationem in aure fieri eo modo, quo in timpano bellico sonus, nimirum ex chordæ per corium expansæ percussione, tribuitur itaq; chordæ hic vsus, vt aerem percutiat, ex exceptione verberationis factæ à tribus ossiculis. Chorda hæc, vel ex ligamento, vel ex nervo, vel ex utroq; simul conflata constare debet, ex alia substantia minimè componi potest, at ligamenta duriora sunt, quàm vt paruo ictui cedant, quapropter minimè ex ligamento, quandoquidem verò nervus ita robustus est, vt quantumvis vehementer impellatur, difficulter rumpi possit, ita mollis, vt ex facili commotione commoueatur, (quod ad sonum excipiendum desideratur) rectè Fallopius dubitauit, num hæc chorda arteria, num nervus, numue alia substantia esset, Eustachius asserit nervum existere, & eius naturam hoc modo describit. Hic neruulus oritur non à quinto pari nervorum cerebri, sed ab altero quarti paris ramo, exilis quædam propago reflexo itinere oritur, iuxta osseum canalem in os desinentem aurium cauum timpanum vocatum, ingreditur, & oblique timpano ac deinde ossiculo malleo supra musculi insertionem adhærescit: nec ibi desinit, sed ulterius progrediens, os lapideum in posteriori sede meatus auditorij perforat, deorsumq; reflexus parumper repit, ac tandem cum tenuiori duriori ramo quinti paris nervorum cerebri iungitur & coit, hæc chorda tenuissima est, quæ per medium timpanum percurrentes incumbit, vel attenditur illi articulo tantum, quo stapes cum altero crure incudis copulatur.

CAPVT DVODECIMVM DE DVABVS FE-
NESTRIS DELATIONI SONI INSERVIENTIBVS
in secunda cavitate etiam con-
tentis.

Haftenus

HActenus dictum est de his, quæ ad pulsationem pertinent, nunc de inservientibus. Ad soni delationem, & sunt duæ fenestæ à Vesalio foramina dictæ, Munus earum est sonum aëri implantato communicatū, per pulsationem excipere, eumq; ad sequentes cavitates transmittere. Vesalius vocat primam fenestram à Fallopio ovalem dictam, anterius foramen, eò quòd antrorsum uersus faciem spectet: ovalis fenestra ob ovalem formam, qua prædita est, à Fallopio appellatur. hæc fenestra oblonga & à lateribus compressa est, sua posteriori sede in buccinosum illud antrum, insigni satis amplitudine sese aperit, & cum anteriori sede buccinosi antri, ita communis efficitur, vt non aliter fenestra ovalis in foramen buccinosi antri, quàm foramen illius antri in fenestrâ pertinere, quis posset asserere, hoc idem anterius foramē, sese posteriori foramini etiam coniungit, deinde in interiora progrediens, dilatatur forumq; quodammodo, aut præcipuâ fodine alicuius metallicæ sedem constituit, à qua (vt Vesalius inquit) multæ plateæ, aut viæ, aut cuniculi excurrunt. Collocata est quasi in media concameratione, manet semper stapedis basi clausa. Altera fenestra nullum peculiare consequitur nomen, à Vesalio appellatur secundum foramen, vel posterius foramen, eò, quòd in posteriori regione collocatum sit. Foramen hoc rotundum & in homine paulò minus angustiusue, quàm anterius visitur, in vitulo & oue posterius foramen amplitudine, anterius quasi vincit: ad posteriora declinat coitq; cum anteriori in cavitare, quæ per os penetrans ex sese labyrinthum & cochleam depromere videtur. hoc foramen semper apertum manet & à nullo corpore operitur. Est & inter fenestram vtramq; tuberculum, quod Vesalius cum foramine rotundo, et extuberante tuberculo subdito superiori sedi, parum conchæ confert, quæ in frenorum ornamenta adhibetur, in tubere verò latitat antrum quoddam, cochlea vocatum.

CAPVT XIII. DE MEATV A SECVNDO

AVRIS MEATV IN OS, EXPVRGATIONI.
inserviente.

Sequitur via expurgationi aëris implantati destinata, excremento à capite ad aurem defluenti exitus viam præbens, cernimus autem ex his, quæ foris in aure colliguntur per transudationem, aurem multis excrementis fluxionibusq; distillationibusq; obnoxiam esse. Si enim illa, quæ per densam membranam tot sunt, quantò crunt plura intus latentia, foris per meatum auditorium ob membranam densissimam interpositam nihil exire potest, nisi tenuissimum, & id per transudationem, crasium verò si intus hæret (vt multoties contingit) semper, propter perpetuam resolutionem, quæ fit continuo à calore innato, status generaretur, vnde susurrus, aurium tinnitus, auditus depravatio ac amissio. Expurgando itaq; auris recremento, peculiaris meatus à rerum conditore hic in aure constructus est, quod autem per illam viam aures purgentur, ex curatione patet, nam in auditu difficultate, in tinnitu, et similibus aurium affectibus, masticatoria admodum conferunt, masticatoriorum enim facultas per palatum ad aurium cavitatem transmittitur, vnde materia partim extracta euacuatur, partim resoluta, discutitur, hic vnicus vsus præsentis meatui ab Anatomiae scriptoribus attribuitur, at ego illi præter hunc vsus & duos alios ascribo, nimirum vt ad refectionem & restaurationem aëris implantati absumpti, novus ex ore, per hunc meatum suppeditetur. Secundus vsus est, vt cum ob membranæ lationem, auditus difficilior obtusiorq; redditur, per hanc viam sonus per os ingressus ad aurium intima pertingat, atq; hac via surdastris subueniatur. hoc ex surdastris, qui, vt exquisitius quid audiant, hiant ore, voces & sonos excipiunt, liquet, idem testantur Musica instrumenta, quæ si vtraq; aure diligenter obturata, baculo, quem dentibus comprehendisti, attigeris, exquisitius pulsari audies. Alcmeon, vt testatur Aristoteles, primo de natura animalium cap: 11. alium illi tribuit vsus, nempe vt animal per aures respiret, affert exemplum de capris. Vnde colligendum præcos hoc foramen non latuisse, at in vsu Alcmeon deceptus fuit, siquidem si animal per aures spiraret, necessum foret aëri externo nullum fore obstaculum, quominus ad secundam cavitatem

cauitatem perueniret, at nunc membrana hoc impedit, quare per aures aër ad os peruenire nequit. Possit & præter alios iam enumeratos vsus alius adijci, nimirum ne in bombardarum, & alio simili impetuoso sono membrana myrinx rumpatur. Si. n. secundus meatus vndequaquæ occlusus, ac aëre implantato infarctus esset, vt nullus exitus pateret, ex tali sono, maximo impetu et affatim concitato, membrana myrinx impulsâ, cedere nequies, haud dubiè rumperetur. iam verò aër implantatus exitum sibi inueniens cedendi locum membranæ myringi concedit, atq; hoc modo rupturæ periculum euadit. Hic meatus in narium cauitatem desinens ortum ducere debuit à timpano, in quo continetur aër implantatus, et vbi sua excremēta deponit. Est rotundo canaliculo persimilis, atq; instar tenuioris calami in exordio amplius, indeq; oblique ad anterius interiusq; basis capitis latus procedens, in medio quatuor foraminum totum illud os perfodit ac penetrat, nam posteriori ipsius sede arteria soporaria caluariam ingreditur, in anteriori regione, quartum par neruorum cerebri, extra caluariam emergit, externum latus patefacit aditū arteriæ distributæ in duram matrem; interim deniq; fissura, quædam circumscribit, quæ à cuneiformis ossis & lapidosi extremis partibus oblique infra & antrorsum versus ductis fiunt. Cæterum meatus hic eo in loco non desinit, sed alterius generis substantia auctus, inter duos faucium seu gulæ musculos, paulò ante dictæ figuræ ductum vltius procedit, et iuxta radicem interne partis apophysis alis vesperilionum similis, in alteram narium cauitatem terminatur, & in crassam palati tunicam prope radicem gargareonis inseritur. Substantia eius, qua extrema fissura ossa temporum & cuneiformis tangit, cartilaginea est, admodumq; crassa, oppositæ verò partis substantia exactè cartilago non est, sed nescio quid membranosi obinet tenuiorq; euadit. Sed huius meatus interna extremitas narium cauitatis medium respiciens, robusta est cartilago, quæ plurimū extuberat mucosâq; narium tunica obducitur, & quasi ianitor præfectus fini obducitur. Hæc autē summo rerum opificis consilio atq; arte sunt machinata, primò autem fit meatus hic cartilagineus quò via excrementorum exitui semper pateret, & ne sua duritie vicinis partibus vim aliquam adferret, materia enim cartilaginosa absq; fracturæ periculo facile cedit, deinde membrana obduxit mucosa valuulæ instar, quo excrementa in os effluere possent, & vicissim parum ex ore in aurem. Si verò semper apertus fuisset hic meatus, ex ore in aures facile quid mali vaporis ingredi potuisset, quare non semper patet, sed aliquando, aliquando non, pro necessitate. Terminatur vbi os palati superioris desinit, ita vt terminus huius canalis & palato, & naribus communis sit, hocq; modo os excrementorum cerebri commodum receptaculum, auris superfluitates facilius recipit. Vbi desinit vtrinq; vnus musculus faucium consistit, voluit enim Deus pro necessitate hunc meatum aperiri, quod egregiè fit, dum fauces dilatantur siue aperiuntur ad transglutinem excitatam à duobus iam dictis musculis.

CAP. XIII. DE AQUÆDVCTV.

Est quidam offeus canalis ob similitudinem, quam cum aquæ, per cuniculos impositis canalibus hinc inde vario modo diductione habet: à Fallopio aquæ ductus vocatus, à quibusdam cochlearis canalis. A Galeno et Vesalio cæcus meatus, non à cæco intestino (vt nonnulli volunt) sed ex eo, quod immissa seta porcina difficulter perquiri possit, immò in arida bouis caluaria ferè nulla ratione setam hoc foramen transmittit. potest & cæcum vocari, quod tenuis & circumducti vertiginosiq; intestini loco perpulchrè censetur. Paratur hoc foramen ramulo quinti paris neruorum cerebri, qui postquam indurere debuit, non sine causa per durissimum siccissimumq; ossis anfractuosum foramen diductus est. adde quod per alium locum via illi non patuerit. Canalis itaq; huius anfractuosi est, vt quinto pari neruorum via ac transitus præbeatur. Aquæ ductus hic oritur ab interna & anteriori caluariæ parte, satis angusto foramine, & in homine rotundi foraminis imaginem habet, atq; per os suo fundo modicè dilatatur, tenuissimaq; offea squamma à subditis antris seiungitur, interim & non tamen semper amplius hic foraminis istius locus duobus paruis foraminibus peruius est, posterius verò, quo boues et oues pariter donantur exiguum admodum est, & ad superiorem præcipue dictorum cuniculorum

lorum intersectionis sedem pertinet, portionem quinti paris neruorū cerebri transmittens. Anterior foramen posteriori amplius, & ad quinti paris neruorum cerebri portionem quoque deducendam paratū, mox integer efficitur meatus canalisue, in petrosæ partis anteriori sede insculptus. Iste aquæductus secundum anteriora antri fodinarū cameram referentis procedens, retrorsum supra inferiorem petrosæ partis superficiem reuertitur, itaque continuò in osse tantisper progreditur, donec extra caluariam sub auditorij meatus ad aurem foramine ubi quinti paris neruorum pars sub aure excidit, ad auriculæ radicem erumpat. In homine autem hic aquæductus sese exiguo intervallo ad initium antri fodinarum cameræ comparati adaperit, nullibi alias sub inferiori petrosæ partis superficie pariter dehiscit: exprimit mediij circuli figuram.

CAP: XV. DE LABYRINTHO SIVE
TERTIA IN AURE CAVITATE.

Absolutis his, quæ ad timpanum, id est, ad secundam cavitatem spectant, proximum est, ut tractem de tertia cavitare. Tertia hæc cavitare à Fallopio labyrinthus dicitur, quia in ea multi cuniculi reperiuntur, qui in eandem, labyrinthi instar, circulari modo, cavitatem redeunt. Anfractuū cavernarumque finalis causa est, ut sonus per angusta transiens loca, tantò acutior & exquisitior foret, quòd ex artificialibus instrumentis, præcipuè Musicis satis liquet. utpote ex fistulis manualibus & organorum, hæc enim quantò angustiores longioresque sunt, tantò magis sonorem acutioremque sonum reddi deprehendimus. primò autem aer contentus in canalibus, quietus ac tranquillus facilius soni alterationem excipit, atque aer ex agitatione conturbatus. Secundò, aer angusto loco conclusus non disgregatur, sed vnitus permanens, disgregato maiorem ac efficacior sonum promit. Quoniam verò hi canaliculi propter breuitatem petrosi processus, in longum exproduci nequiere, recompensata est longitudo circumuolutione & gyroso anfractu. Sic etiam per varias concavitates & spiras, quasi per diuersos gradus sensim voces elaboratæ, & quodammodo fractæ, in cerebrum ascendunt. Postquam iam hæc cavitare sub tuberculo & post fenestram oualem stapede oclusam, sese quartæ veluti cõmuni portæ coniunxit, in interiora deinde progrediens dilatatur, forumque quodammodo, aut præcipuam fodinæ alicuius metallicæ sedem constituit, à qua multæ plateæ aut viæ, aut cuniculi excurrunt, qui per duram ossis substantiam veluti in circulum excauati incedentesque in amplam cameram rursus reuertuntur. A posteriori amplæ huius cameræ regione plures viæ excurrunt, quàm ab anteriori: retrorsum procedentes ita feruntur, ut duæ circulares viæ rectis quasi angulis sese bis intersecant, hi cuniculi numero tres circulares in eandem cavitatem redeunt, nusquam tamen toto processu in se inuicem manifestè patent. Præcipua et manifestior intersectio supra apicem buccinosi antri perficitur, ubi foramen totum quinti paris neruorum excipiens finit, & tenuissima quasi squamma ab hac viarum intersectione dirimitur. Numero tres sunt hi cuniculi, qui in eandem cavitatem redeunt, non enim conduxit (ut dictum est) per latum canalem sonum ferri. Primus verò inferior existit, & ab anteriori parte cavitatis diuertens versus exteriora, ac deinde reflexus in eandem cavitatem, per posteriorem angulum recurrit. Secundus oritur ab eodem anteriori cavitatis angulo sursumque elatus quasi ad ὀρθογωνίον factò semicirculo iterum in cavitatem, per angulum posteriorem regreditur. Tertius & oritur & occidit, aut finit in posteriori cavitatis angulo, nam inde ortus perforatoque osse circulari quodam canali exteriora versus illuc iterum reuertitur, canaliculi hi in intima superficie membrana quadam mollissima ac tenuissima vestiuntur, quæ membrana num sit neruus expansus, an aliud, non refert.

CAP: XVI. DE QUARTA CAVITATE VEL COCHLEA.

Sequitur iam 4. cavitare vel antrum aliquod in tubere superius descripto latitans, quod à Fallopio cochlea vocatur, eò, quòd testæ cochleari exteriori superficie rotunda descripta,

tracta, & parte interiore, quæ in spiras contorquetur, reservata, similis sit, à quibusdam nominatur foramen cæcum, quia nonnullis nullum exitum habere visum est, ac hac ratione cæcum dici non potest, nam etiam si spirarum modo conuoluatur, tamen foramine siue exitu non caret, sed in medio ea nimirum parte, cui spiræ innituntur, à principio ad finem usque angusto, et recto meatu est peruium, atque à fenestra ouali via aperta est, quæ in maiorem huius ossis spiram definit, etenim si cavitæ cæca esset, aer percussus nervo occurrere nequiret. A Vesalio hæc cavitæ vocatur buccinosum antrum, à buccina cornu recuruo ac contorto, quo pastores pecus conuocare solebant, vel à buccina conchilij specie. Vfus ex superioribus satis constat, eundem docet ac confirmat buccinosa testæ multis gyris circumuoluta, nam si talem testam foramine suo quis auri admouerit, miros quis audiet sibilos actinnitus susurrosque excitari, quod si quis apici aut cauo perforato inflarit, tubæ in modum sonus edetur. Hinc animaduertendum Deum creatorem non contentum fuisse tertiæ cavitatis gyris & anfractibus, sed etiam addere voluisse alium anfractum, eumque magis anfractuosum, quam sunt cuniculi tertiæ cavitatis, quoniam nequiere rectè intus petere hi cuniculi, cochleæ modo circumducti sunt. cavitæ itaque hæc ab ampla basi, nimirum sub tuberculo à sede metallicæ fodinæ foro per simili exorta, excavatur, & gyris tribus quatuorue sese mutuò excipientibus procedens, angustatur & absoluitur. Hæc cochlea præcedentibus internis cavitatibus longè minor est, atque insculpta in eodem petroso processu, in latere anteriori est collocata, quò sono, qui à posteriori parte antrosum vergit, occurrat, Spirarum elatior superiorem sedem obtinet, et nervum suscipit, angustior inferiorem & ossis cauo terminatur, exitum consequitur, ut dictum est, hinc fit, quod aer ab ossiculis & myringa agitur in timpano, per spiras dictas ad cochleam, inde ad nervum deferatur, nervi enim quinti paris maior propago videtur in tres portiones inuicem distantes terminari, ex quibus præcipua exiguo foramine peruium in cochleatum os, vel in cochleam obducitur. Sed num instar operculi eidem incumbat, an verò altè penetret, atque in spiras eius ossis conuoluatur, propter administrationis difficultatem, certò adhuc explicare non potui. Fallopius inquit hanc cavitatem in intima superficie membranula mollissima, ac tenuissima vesti, quæ an sit nervus expansus, an aliud, non refert. Hoc idem os cochleæ ex duplici spirarum genere constat, quorum alterum ab ossea substantia admodum tenui & sicca, & quæ facile teritur, creatur: atque vndequeque serpenti in spiras conuolutæ similis. Alterum verò alijs Anatomicis præter Eustachium, ante nostra tempora ignotum, Ex materia quadam fit molli, mucosa, sed firma tamen, & quæ nescio quid arenosi permixtum habet. Oritur ex medio spatio primarum spirarum, tanquam ex ampliori basi, sensimque extenuatum in aciem definit, sed non tam altè conscendit, ut ossis ambitum, qui priores terminat spiras, attingat, Eustachius vult 3 vel 4, foramina minima repperiri, ita ut aliquando vix capillum admittant, quæ in secundam & tertiam cavitatem pertingunt à canali, quem nervi quinti paris ingrediuntur, per hos meatus paruos credit Fallopius nervulos à quinto pari membranæ communicari, vel facultatem & vires, vel quod virisimilius est, à dictis propaginibus membranulam ortum ducere, quæ cochleæ cavitatem inuestit.

CAPVT XVII. DE NERVO

ACVSTICO SIVE AUDI-
torio,

Superest quartum & vltimum ad auditum spectans, nimirum ut agam de nervo auditorio, in cuius descriptione Anatomici scriptores ob administrandi summam difficultatem, valde inter sese dissentiunt. Eustachius ita loquitur, quintum nervorum cerebri iugum, ex duobus tantum nervis, ut alij arbitrantur, minimè constat, sed duas vtrinque propagines inæquales habet: quarum maior secundum longitudinem instar semicirculi eleganter excavatur, minoremque, quod alios fugit, amice suscipit & amplectitur, eoque modo ambæ simul iunctæ oblique in anteriorem & posteriorem partem usque ad extremum sinus, in osse petræ simili earum gratia exculpti, procedunt, ubi minor propago à

maiore recedens paruum foramen sibi paratum inuenit, et ingreditur miroque admodum flexuoso incessu extra caluariam elabitur, maior propago videtur in tres portiones parum inuicem distantes terminari: ex quibus præcipua exiguo foramine in cochleatum os per uio obducitur: sed num instar operculi eidem tantum incumbat, an verò altè penetret, & in spiras eius ossis conuoluatur, propter difficultatem administrationis (quam is, qui negotium manibus contrectat facile experitur) certò explorare adhuc non potui. Fallopius inquit: quintum par auditui inferuire, et ab eodem, quo volunt alij Anatomici loco ex duobus neruulis conflatum, antequam è membrana egrediatur, prodire, altero, quo nullus neruus mollior est exceptis visorij, hicque ad auditum destinatus. Altero, qui quinto etiam pari assignatur, quia nascitur ab eodem penitus loco cum molliori dicto, & cum eodem ad os petrosum venit: sed reuera distinctus est neruus, & durior priori, atque æquè durus, ut reliqui nerui, qui cætera paria efformant, neque vlla ratione videtur paris mollis dicti, Fallopius ne videatur velle dissentire à reliquis Anatomicis, contra animi sententiam concedit quinti paris alterum ramum mollem, alterum durum, equidem hic durum neruum tanquam ad audiendi facultatem non spectantem omittam, et agam de molli auditorio, de hoc ita Fallopius prosequitur. Altera quinti paris portio, quæ mollis est, et neruus auditorius à me vocatur, vna cum dura ad extremum antri illius perueniens quibusdam angustissimis foraminibus medijs in cavitates distribuitur geminas, atque illas quodammodo sublinet, quarum vna labyrinthus, altera cochlea vel cochlearis à me inter ossa vocata, atque descripta est, neque ulterius procedit vllumue neruum à se dimittit ad exteriora. Neque tu, neque alius quispiam (ut mihi persuadeo) aliquam ab hoc quinto pari neruosam propaginem, quæ alicuius momenti sit, præter has dictas, inuenire poterit, hæc tenus Fallopius. Equidem multoties ductum huius nervi sequutus & eodem modo sese habere deprehendi, Vesalius in observationum examine sese purgat, rursus Fallopium erroris accusat hoc modo, Ego discrimen illud, quod abs te in molli & duro in quinti paris exortu (qui aliàs veluti duobus fit funiculis) & in ipsius ad suum proprium foramen progressu adfertur, non memini me obseruasse: & rationi, uti nunc colliges, haud videtur consonum. Mihi namque nulla vicinior via occurrit, qua anterior quinti paris nerui portio (quæ veluti gracilior est funiculus) in bobus & ouibus, & manifestius adhuc in porcis quidem, ad inferiorem petrosæ partis superficiem, in homine autem, ad initium antri, quod fodinarum cameræ comparo, deferri & distribui queat, modo antrorum in petrosa parte exculptorum debeat haberi ratio, illaque citra causam & feriem, non fuerint temerè perforanda. Et quanquam duram quinti paris tuam portionem, ita defers describis potius, ac si auditus organo nullum vsum conferret, animaduertendum tamen est, qui oblongo illi neruo corpori in boue adnascitur, & in homine per foramen camerato antro peculiare, propaginem exhibet, Corpus hoc, proprio sinu in inferiori petrosæ partis superficie contineri, iam sæpius dixi: illique oblongis corporibus conferri potest, quæ in neruorum complexibus, oliuaria appellas, ego autem flocculis & nodulis illarum chordarum assimilare soleo, quæ Cardinalium galeris appenduntur. Ut enim corpora illa, neruea simul & glandulosa substantia, efformata, neruis adnascuntur, aut potius neruorum incrementum constituunt, ita quoque hic in auditus organo, tali oliuare corpus in proprio sinu reponitur: quod quinti paris applantationem admittens, aut ab illa constitutum, humiliori sua sede neruos à se diffundit, qui ossiculorum auditus organi nexibus, crassarum & manifestarum fibrarum ritu partim exporriguntur, et partim illac ad coalitum, cum non spernenda tertij paris neruorum cerebri portione, procidunt, qua vasa auditus organum ingrediuntur. Quæ quum diligentius aliquando in examen reuocabis, promptè animaduertes, in neruorum distributione tibi non pauca insuper desideranda. Posteaquam igitur natura eleganti compendio, his sedibus anteriorem quinti paris portionem distribuit, & reliquam quinti paris portionem (quæ velut crassior est funis) quodammodo ante osseam tenuitatem subsistit et dilatari voluit, quæ inter cuniculorum camerati antri præcipuam intersectionem, & foraminis quintarum par admittentis basim obseruatur, ipsa inquam natura, nerueam portionem in illam intersectionem, mandat, quæ proprio foramine, licet arcto, in cuniculos illos fertur, & fi-

INSTRUMENTO.

105

tur, et fibrosis distributionibus per antra in petrosa ossis parte hic conspicua, dispensatur. Estq; hæc distributio hominibus, et omnibus pariter, ac homini communis, etiamsi in hoc, quam in illis sit manifestior, uti & camerati antri seriem, aut imaginem in homine ampliorem potentiolemq; quam illis, esse expendimus. Immo, quum foramen quintum nervorum par admittens obseruo, & in anteriori huius sede meatum auspicari intueor, qui sub aure tandem extra caluariam finitur, non possum satis colligere, qui dum quintum par in mollem & durum nervos partiris, & quum durum, graciliorem & situ posteriorem statuis, ipsum nuper dictum meatum ingredi cupias, citra nescio cuius deculsationis, alteriusve rationis explicationem, quæ durioris tui nervi supra aut infra molliorem ductum situmque argueret. Mihi enim (ut quid reperiam, semel rursusq; insinuem) anterior quinti paris nervi portio, non verò posterior, meatum illum subire cernitur, qui sub aure versus posteriora in illud cessat foramen, quod Galenus ob difficilem setæ transmissionem, quemadmodum à me est commonstratum, satis ex merito cæcum nuncupavit.

FINIS.

OBSERVATIONVM ANATOMICARVM CHIRVrgICARVMQVE MISCELLANEA

VARIA, EX HVMANIS CORPORIBVS TAM SANIS QVAM MALE AFFECTIS, & æquè viuis, atq; mortuis deprompta, quibus adiecta sunt nonnulla ex brutis corrasa.

PRAEFATIO.



VM ANATOMIÆ STVDIVM BENIGNè lector, varijs de causis cuiq; optimarum literarum studioso, eoq; magis Medicæ facultatis candidato meritò commendatum esse debet: tum maximopere, quo nomine Aegyptijs, olim mundo adhuc florescente, & necdum vt nunc, tot calamitatibus, egritudinibus varijs, ac miserijs oppresso, quippe vt sensuum nostrorum iudicio reconditos morbos cognoscerent: eodem Medicis hoc seculo, senio, ærumnis morbisq; fracto, multò commendatissimum esse oporteret. Etenim, si eo tempore abditi, quorum intelligentia non nisi per sectionem haberi potuit, reperti sunt morbi: nostra hac grummosa ætate, iam annorum cursu, & senecta attrita, haud dubiè multò plures, grauiores, periculosioresq;, & antiquis, & nobis ignoti prodeunt, Ego verò simul atq; extremis (vt dicitur) labris Medicinam degustaram, hac eademq; de causa ad Anatomicū exercitium magis magisque excitatus, quauis arrepta occasione, corporis animiq; recreationibus neglectis, absq; vlla defatigatione ac tædio, que per optimorum hominum beneuolentiam atq; adiumentum consequi potui, secui corpora. vnde me in cognitione multorum abstrusorum, occultorum atq; portentosorum generum morborum, quibus pro dolor genus humanum affligitur, non parum profecisse, negare non possum.

Vtinam ubiq; Magistratus & vulgus Medicis Chirurgisue veris, in sectionibus corporum versatis (intelligi hic nolo barbitonfores arrogantes imperitosq;, qui vesicam pro ventriculo, vermes pro neruis, pulmonem pro epate demonstrant, & monstrosa tum vulgò, tum quibusdam credulis doctoribus narrant) ad morborum incognitorum eorundemq; causarum indagacionem, aperiendi corpora copiam facerent, medius fidius, nonnulli morbi facilius & facilius curarentur. Sed deploranda est potius hac in parte non solum, sed vniuersa arte medica (cuius autoritas indies magis vilescit, propter ingratos hominum animos, & peruersa iudicia) minus fortuna propitia, quam melior aliqua expectanda conditio. Tametsi meritò Plinij verissimū dictū omnes perpendere deberet, cum ille inquit lib. 29. cap. 1. Nemini magis, quam se Medicū profiteri creditur, cum tamen nullo in mendacio sit periculū maius. Nihilò tamen minus, quotus quisq; est hoc tempore, qui statim in principio, vt necessitas postulat, Medici docti fidei & industriae se committere vult? non antea imperitissimorum virorum & mulierularum incertis, & sæpè etiam perniciosis medicationibus sese subiiciens? Quòd si vel morbi vehementia tandem crescit, & alioqui insignia errata fuerint commissa, tum demum, omnibus occultatis ad Medicum curritur, & statim certa salus petitur, vel etiam imperiosè postulatur. Hic verò si auxiliante Deo, nullis non curis nec laboribus parcens, quibus sæpè cum periculo vitæ incumbere cogitur, ægrum conseruauerit, quam frigide illi gratiæ aguntur, vel potius, breui temporis spacio collati beneficii omnis memoria euanescit? contra, si morbi vis superior sit, & mors præ foribus appareat, tum qui vultus auersi obseruantur, quam inhumani sermones notantur, & tandem expostulationes cum bene miritis habentur? Hæc & alia plura probum virum & Medicum peritum, animo integro & recto præditum parum, abest, quin ab ipsa arte salutari & necessaria faciitanda hoc nostro ingrato, & peruerso seculo planè abstergeret, Sed de his satis, vel potius nimium.

Porro

Porro autem quod ad D. O. M. incomprehensibilem, ineffabilem, atq; incomparabilem sapientiam, bonitatem, iusticiam, ac potentiam, quæ omnia ex maxima illa animalium varietate, corporum eorum ac eorundem partium artificiosissima pulcherrimaq; symmetria, ordine, decenti cōmoderatione secundum iusticiam vnicuiq; tum animalium, tum parti, elargita, luculentissime apparēt, magis & venerandam, & suspiciendam excitaret: nullum non animal, prout tempus, locus, occasio tulit, intactum reliqui. adde quod vna eademq; opera ex brutorum sectione quàm plurima, vtpote cerebri, pulmonum, cordis, arteriarum, diaphragmatis & muscutorum motus, neruorum recurrentium vsum & id genus alia, cognouerim, quæ ex homine addiscere nefarium scelus foret. Horum præcipua, quæ Anatomix candidatis, & aliquam lucem dare, & animaduersione digna in re anatomica esse iudicaui, auctarij loco placuit hic adiungere. Fac tu amice lector, qui mecoenates habes, & longè me ingenio, iudicio, opibus, commoditate, ac fauore hominum antecedis, hos tenues meos labores, maiori atq; ego his omnibus destitutus, vnquam quivi, iudicio, intellectu, & studio excolas, illustres ac amplifices. Ne interea diuini numinis obliuiscaris, sed tum sanctorum virorum, tum ethnicorum, in primis verò Galeni, qui libros suos de vfu partium, tanquam hymnos, Deo rerum creatori conscripsit, exemplo, Deum æternum, ac omnipotentem, cuius operum magnitudinem dignitatemq; ne omnium hominum laudes assequi vnquam poterunt, toto tuo spiritu, indefesso studio, laudum præconijs pro virili extollas.

ANATOMICA QVÆDAM IN CORPORE
HVMANO SECVNDVM LEGEM NATVRÆ CON-
stituto obseruata.

Ossi frontis, vbi per suturam, fronti & dorso narium communē, coniungitur, & duplex cernitur, duæ sunt cauernæ siue duo sinus interim vacui, interim pituita crassa penitus pleni, atq; nonnunquam manifestis foraminibus in narium cavitates aperti. In cerebro ventriculi duo primi laterales oriuntur ab ea cerebri regione, vnde mammillares processūs olfactui inferuientes, & optici nerui ex cerebro primam originem trahunt: à posteriori parte in rotundum reflexi in eadem ferè regione terminantur, est enim inter horum ventriculorum duorum principium & finem, cerebri ad digiti crassitiem portio, principium & finem separans, tanquam sepimentum, interposita.

In cerebello tam brutorum, quàm humanorum scissuræ siue impressiones, quæ loco inuolucrorum cerebri sunt, multò profundiores, atq; ab Anatomicis describuntur, à me fuere semper inuentæ, & tenui menynge obductæ.

In neruorum exortu & compagine sunt quædam animaduersione & scitu quàm dignissima, à nemine, ni fallor, ad hoc vsq; tempus notata, quæ breuibus eo, quo deprehendi in multis sectionibus, modo, declarabo. Primò de cerebri neruis, qui vt omnes alij medullæ spinalis, constantur ex tribus, vtpote ex cerebri, siue medullari substantia, & ex dura atq; tenui menynge hoc modo. Fibræ capillares ex medulla cerebri tenui menynge, quam secum ducunt, circumplicatæ producuntur, quæ statim in exortus principio, vel paulò post primam originem separatim discretæ, vel multæ, vel paucae, pro nerui inde oriundi crassitie tenuitateq; mox coaceruantur, & colligatæ, tenuis menyngis beneficio eousq; progrediuntur, quousq; extra caluariam prorupturæ sunt, ibi dura meninx, robur neruis impartitur, & inuestit nerui rudimentum. Hæc in vniuersum ita sese habere, ex omnibus neruis, nullo excepto, ne optico quidem, apparet; immò non credo vllum ex vnicò filo, siue fibra constare. sunt quidam ex capillaribus his filamentis conflati multiplices, longè à se mutuò orti, qui antequam extra duram menynge prorumpunt, coeunt, atq; vnum neruum constituunt, vt in sexto pari & alijs liquido apparet, at tamen hæc coitio ita laxa est, vt facillè diuelli & dissolui queat. Nerui cerebro destinati non omnes à cerebro originem trahunt, siquidem octauum Fallopio par, quod Vesalius assignauit minimæ tertij paris portioni, à cerebello exoritur. Sextum etiam par conflatur

*De neruorum
origine & pro-
creatione.*

flatur à coaceruatione plurimarum fibrarum, quæ à spinali medulla maiori ex parte, iuxta quintam colli vertebram visæ sunt primò prodire, & in ascensu multis alijs fibris augeri, atq; ita inter filamenta spinalis medullæ superiora inferioraq; nervos constituunt, sursum tendere, quoad cum septimo pari proprium transmeant foramen. De singulis cerebri nervis alijs, per maius ocium cum licuerit, agam.

Spinalis medullæ ortus principium rectius cerebro, atq; cerebello acceptum fertur, unde non immeritò caudex, siue processus, siue soboles cerebri à multis appellatur. nam vix in villo, nisi in duritie (est enim cerebro aliquanto solidior & firmior) videtur à cerebro differre: immediatè vt cerebrum tenui meninge circumducitur, deinde dura meninge, cui vt cerebrum intercedentibus nervis colligatur, alijs libera est hæc medulla à dura meninge. Substantia quoq; spinali medullæ contigit duplex, eaq; colore diuersa, vtpote externa, quæ candida est, interna minus candicans, inuenitur etiam à posteriori parte, scissio siue diuisio quasi dimidium crassitie penetrans, quæ tenui meninge obducitur. Ex substantia obliquè vel transuersim dissecta, sanguis, tanquam per angustissimos poros transsudaret, prodit, quo absterfo, et medulla cōpressa, nouus succedit, vt et in cerebro contingit. Cum à posteriori parte, vbi scissio est, leuiter extremis digitis, siue ligneo cultro diuellitur, dehiscit, & foraminis effigiem præbet, at statim rursus confidit substantia, & nullum foraminis (vt quidam Anatomici putarunt) vestigium remanet. Spinalis medulla in principio, quæ foras extra caluariam prorumpit, omniū crassissima & amplissima, in descensu magis magisq; tenuatur. non autem, vt Fallopius opinatur, sacræ fistulæ amplitudinem, quæ circa lumbos maxima est, explet. quod verò Fallopius & cum eo multi Anatomici putarint eo in loco spinalem medullam crassiorem esse, & simul neruorum principium non rectè animaduertit, in causa fuit spinæ difficilis apertio siue dissectio, & harum partium superficialia inspectio. Opinor eos vertebra dissecuisse, & statim in duram meningem, quæ fistulam spinalis medullæ intus inuestit incidisse, atq; eam liberatam cum medulla exemptam. hinc cum dura membrana sua amplitudine, capacitatem lumborum vertebrarum expresserit, existimarunt hoc medullæ ascribendum. quod si hanc duram membranam aperuissent, inuenissent spatium satis capax & vacuum, quod in artritidis, ischiadicis, & podagricis multoties tenui sero, interrim pituita viscoso refertum deprehendi. Quomodo attenuetur & nervi ex ea producantur, nunc intelliges, detecta medulla adhuc tenui membrana vestita, videbis à lateribus quatuor filamentorum ordines, siue series descendentes, vtpote vtrinq; duas, quarum altera à parte anteriori, altera à posteriori ex medulla nascitur. Filamenta verò, siue funiculi, siue fibræ ex medullari substantia & tenui membrana conflatae tum anteriores, tum posteriores, à dextro latere pro crassitie & tenuitate neruorum oriundorum, multæ ac paucae colliguntur, ac vt de cerebri nervis dictum est, inuicem attentæ, vnum conflant neruum eodem modo ex vtraq; alterius vel sinistri lateris serie producuntur nerui, postquam in neruorum corpora coaluere, descendendo abscedunt à medulla, tenduntq; ad vertebrarum foramina neruorum transmissioni destinata. ad foraminum ingressum statim dura inducuntur membrana, quæ ad validam funiculorum cum membranis copulationem, in ipsis vertebrarum foraminibus substantia glandulosa eaq; dura et crassa, nodo non dissimili, ita sese immiscet atq; implicat, vt amplius nulla substantia à se mutuo separari queat: post nodum verò rursus extra vertebrarum cavitatem funiculi rursus discerpi atq; diuelli possunt, eodem modo sese habent omnes spinalis medullæ nerui, cerebri nullos tales, dum prorumpunt, consequuntur nodos. Porro, quantò magis spinalis medulla descendit, tantò altius filamenta, siue neruorū rudimenta, principia, sua siue suos exortus trahunt, ne videlicet natura cogatur medullam vsq; ad sping dorsii finem producere. circa lumbos simul atq; peruenerit, tota in neruorum propagines, instar arboris trunci in ramos, absq; ordine consumitur, funiculi vsq; ad extremum ovis sacri descendentes, sensim à lateribus abscedunt multi, prout necessitas procreandi hunc illūmue neruum postulat. Sunt autem hi funiculi alijs multò crassiores, ab extremitate spinalis medullæ prorumpunt ramuli parui & tenues, qui vsq; ad finem ovis sacri exproducti, dissipantur per musculos ovis sacro vicinos. His ita à me perspectis, tenuem meningem à medulla

medulla detraxi, quæ non difficile abstraheretur, sed eo in loco, quo funiculi ex medullari substantia emanabant, difficilius sequebatur, multò adhuc difficilius circa lumbos, ob funiculorum crassitiem & frequentiam, vnde constanter asseuerandum iudico, medullarem substantiam ad neruorum generationem necessario accedere. Hæc de origine neruorum perfunctoriè annotare libuit, aliàs Deo volente, singulos pertractabo.

Præter cæteros ad faciei partes pertinentes musculos à Realdo Columbo rectè *De faciei musc.* descriptos (in musculorum enim historia non parum laudis meruit) reperi & ego alios. *lis.* os, & aliquot aliter, quàm delineati sunt, positos atq; formatos. Primò sub cute superciliorum vtrinq; vnum in ijs, quibus supercilia tumida apparent, satis crassum, in alijs tenuiorem: oriuntur lato & tenui principio à cantho maiori, vbi lachrymalia puncta sunt, & inde vtrinq; ascendunt versus nasi exortum siue radicem, in ascendendo crassiores redditi, versus supercilia, eorundem ductum comitantes, reflexi, circa mediam regionem superciliorum videntur terminari. Vfus horum musculorum est, simul cum palpebrarum musculis, cum vel in aquis, vel fumo, vel pulueribus sumus, oculos exquisitè occludendo, omnem iniuriam arcere, atq; etiam subgrundia imbricamenti instar oculis inducere. ex contractione enim horum musculorum supercilia intumescunt, corrugatur intercapedo, & simul deorsum oblique versus nares trahuntur, & inferior palpebra leuiter superiori adducitur.

Musculi ad nares pertinentes numero duo sunt, quorum primus à Columbo etiam describitur, et exoritur à superciliorum regione, sub musculo frontis, tenui principio, *De narium musc.* deinde latior redditus, nasi dorsum atq; spinam inuestit transcenditq; & tandem lato, *sculis.* tenui, carnosq; sine rectis fibris, pinnæ narium vltimæ cartilagini, triangulari figura implantatur. Fallopius hunc musculum vidit, at minime musculi loco habet, inquit enim ex carnosis fibris conflare musculum esse, & cognationem habere cum frontis, eiusdem musculi actio demonstrat, nam in foraminum narium dilatatione cernitur musculi frontis, vnde pronascitur, motus: deinde motus cutis in superciliorum intercapedine, & narium spina. Secundus duplex habet principium, quorum alterum sub supercilijs iuxta dorsum, vel spinæ nasi inferiorem regionem ad latera descendit, quoad circa alæ nasi finem, alas contingat: ibi auctus, alterius partis sine media ex parte, extremitati alæ narium, media ex parte, labro superiori ad narium finem inferitur. Alterum principium ab osse mali, sub musculo inferioris palpebræ exoritur, & oblique ad nares tendens, cum superiori vnum carnosum latumq; finem constituens, narium alæ & labro superiori, vt dictum est, immittitur. Huius musculi vt duplex est exortus confususq; finis, ita & duplex & complicatum munus est, labra superiora sursum trahit, & simul narium foramina aperit, & vice versa, fungitur itaq; vno tempore duplici munere. Notabis etiam sub interna labiorum & radice linguæ cute, plurimas glandulas carnosas, quæ ad labiorum & linguæ humectationem spectant, atq; interim valde tumefactæ imperitiorebus suspicionem elephantiasis inducunt. sub his glandulis inueniuntur fibræ à lateribus oblique sursum repentes, quæ mihi visæ sunt labrum inferius introrsum trahere. Reliqua, quæ obseruatione digna sunt penes me, alijs scriptis Deo volente inferam.

Multoties vidi tum cartilagine tum ligamenta ossea facta. Habeo penes me *De ossibus & cartilaginibus.* iorem pedis digitum ex vno osse conflatum, fuit enim senis, in quo ob sedentariam vitam & motus priuationem ligamenta articulorum digiti, ossea sunt reddita. multas vidi vertebrae coaluisse, sic & laryngis & asperæ arteriæ cartilagine in ossa spongiosa mutatas. Viri fide digni mihi Bononiæ retulere, sese Patauî in corpore à Fallopio dissecto vidisse arteriam aortam, siue magnam, totam osseam, Bononiæ Doctor Arantius Anatomicus publicus, mihi in suis ædibus cranium anteriori eminentia, & coronali sutura squamiformiq; commissura priuatam, ostendit, alio in loco inueni cranium omnibus futuris destitutum. Monspeluli Rondeletius fide sua mihi affirmavit, se vidisse cranium, cui connata erat maxilla inferior.

PP

Contigit

De corio capitis

Contigit mihi videre capitis cutim, siue coreum satis multa pinguedine suffultam, sub hac pinguedine herbat membrana carnosae, quae circa aures nanciscebatur fibras carnosas crassissimas musculis non admodum dissimiles. Subtexam hic aliquot historias, ad diuersos affectus praeter naturam pertinentes.

Historia de femina ex febre ardente cum phrenesi mortua, in qua docetur in cerebro uiuentis animalis uermes minime posse generari.

Anno 1567, mense Iunio Ambergae in palatinatu superiori mulier quaedam, quae acui sibi victum querebat, ex ingenti animi moerore, febre ardenti cum capitis dolore, cui postea phrenesis superuenit, correpta. vulgus duxit Vngaricum illum morbum fuisse. Signa omnia attestabantur hanc phrenesim ex sanguine esse, ridebat, iocabatur, cantabat, omnibusque gestibus hilaritatem exprimebat, interim ad interrogata responsum dedit, aliquando non. frequenter mapum capiti, tanquam isthic dolorem perferentisceret, admouit, tempestiue fuit leuibus medicamentis purgata, & vena illi secta, sanguis erat maiori ex parte pituitosus, crudus & serosus, tandem resipuit & paulo post animam expirauit. Aperui caput, dum serra craneum remouebam, effluxit aqua loturae carniuum similis. tenuis membranae & plexus choroidis vasa aquosa & pituitosa sanguine turgabant, uterque ventriculus tam dexter, quam sinister plenus aqua fuit inuentus. nullam nec in membranis, nec in cerebri substantia deprehendere quui inflammationem, Ex sinubus durae membranae cerebri, ut alias ex suspendio enecatorum cerebris, extraxi fibras siue filamenta crassa, lumbricis non dissimilia, ex alba pituita conflata, similes sumpsi ex cordis ventriculis. Hinc accidisse opinor, quod multi Medici & praecipue barbitonfores in Germania anatomiae prorsus ignari, qui febris maligna cum lenticulis praeterito anno satis vulgari, quam Vngaricum appellant morbum, extinctos aperuerunt, tam principibus, quam stulto vulgo, in hoc morbo cerebrum putrefieri, atque ex ea putredine in cerebro vermes generari, persuaserint. dant itaque his aegris allium & olfaciendum, & comedendum tanquam vermibus lethale venenum, intellexi tum Venetis, tum Patauis, multorum, qui ex febre cum lenticulis, vel ut Italico vocabulo utar cum peretichis, occubuerant, capita aperta, & nullos in ipsis vermes deprehensos, inuenerunt autem inflammationes, & abscessus vel in membranis, vel in cerebro. Num vero cerebrum viuo animali ad tantam corruptionem, ut in eo vermes gignantur, peruenire queat, & (ut hoc obiter adiciam) num in corde viui animalis, vermes, quemadmodum Barbitonfores, & nonnulli Medici vroneantes, qui ex inspectione lotij, quo turpissimum lucri gratia anicularum vulgique caeci sibi faciant applausum, oscitanti plebeculae nasci posse persuadent, procreari possint, eruditus atque in anatomicis sectionibus versatis medicis iudicandum relinquo. Equidem cum in anatomicis vix oculis meis confidam, adduci non possum, ut imperitis barbitonforibus hac in parte fidem adhibeam, aperui etenim quam plurimorum in capite vulneratorum cerebra, in quibus plusquam cerebri partem dimidiam vndequeque putrefactam, eiusdem lateris ventriculum pure foetido, viridi & crasso refertum, atque in cerebrali substantia apostemata putidissima deprehendi, at nullum in his vnquam videre quui vermem. multo minus in tanto corporum a me dissectorum numero, inueni in corde vermem, quem barbitonfores & vulgus vocat die herte wärme / latine vermem cordis.

HISTORIAE ALIQVOT DE VVLNERATIS IN CE-

REBRO AD ANIMALIVM FACVLTATEM, EARVNDEM PROPRI-

as sedes curationem vulnorum cranei, ad fungos, &

alia chirurgis scitu digna, pertinentes.

Bononiae in aedibus generosi & nobilis viri Iulij Caesaris Maluentij, Regienfis quidam nomine Augustinus gladij non admodum acuti cuspide in capite vulneratus fuit, vulnus vero ab osse bregmatici sinistri lateris paulo post aures incepit, & transversim per musculum

musculum temporalem, qui totus transscissus fuit, ad oculi canthum maiorem sese extendebat, atq; in cerebri profundum ad eiusdem lateris ventriculum ferè penetravit. Fractura hæc cranei non fuit simplex, sed ex *istha*, id est, sede & ex thlasmate siue confusione composita, siquidem squammæ & separatae & exemptæ sunt. Aeger statim ab accepto vulnere in terram concidit, biliosa euomuit, amisit sensus & motum, correptus est rigore & spasmò, aliquot horis post rediit ad se, ac balbutire astantesq; vix aggrè agnoscere incepit: attamen tum memoria, tum intellectu, tum sensibus omnibus vacillabat.

In curando hoc vulnere vti sumus Hippocratica methodo, Hippocraticisq; remedijs, de quibus Deo volente aliàs in proprio tractatu de cranei vulneribus quàm exquisitè. Quarta die febris, quæ ante mitissima fuit, aucta est, & cum ea omnia symptomata intensiora sunt reddita, & ex vulnere singulis diebus substantiæ cerebri quid exercebatur, idq; tantum, vt totum collectum dimidiæ nucis iuglandis magnitudinem adæquarit, ad vespèram quartæ diei, superuenit alui solutio, vnde quinta die omnia remisere, multò magis sequentibus diebus, nona die maxima visa est mutatio in melius, in vulneribus enim capitis crises admodum sunt fallaces & inconstantes. Ex vulnere cerebrum excreuit, vt in omnibus capitis vulneribus, quæ ego tum curavi, tum à Fallopio, tum à Lulio Cæsare Arantio curata vidi: animaduerti substantiam quandam fungosam, ita duram, ita tenacem partibus subiectis annexam, vt spatula auferri nequierit, hæc semper suppullulat, donec carne loco cerebri, vel calli succrescente, vulnus cerebri repletum & obductum sit, hoc tempore desinit humorum putredo, vnde fungi huius scaturigo prodit. Inquit Iohannes Langus in Epistola quadam, quemadmodum enim in supitibus arborum, humores semiputridi per corticem extuberantes, in fungos coalescunt: Sic vulnerato cranio, vt multi volunt (at vt ego obseruavi, lesò cerebro) humores cerebri affluunt, qui (teste Alexandro Aphrodiseo) ovis frigore condensati, in fungi speciem concrescunt: qui in superiori parte ampliusculi, infra verò prætenues, pro loci ratione perficiuntur. Vnde Galenus lib: tertio Epidemiorum densitate humorum tales in vulneribus annascentias efficiente, quos multi fungos appellant. Hos fungos cum nostri chirurgi in capitis vulneribus enatos vident, substantiam cerebri esse arbitrati, aut agros tanquam deploratos relinquunt; aut si forte fortuna eos curauerint, vulnera cerebri sese curasse, tantillumq; de cerebro frustum exemisse gloriantur, nunc redeo ad meum ægrum 14. die abcessere duæ ovis portiunculæ 30. die vlcus vnde quæq; fuit carne repletum, & tamen ovis duæ squammulæ erupere. postquam curatus fuit, memoria semper læsa, stupidus intellectus, iudicium valde imbecille permansit. Triennio post, in aduersam valitudinem ægro & Medico suo Phycico satis obscuram, vel cognitu difficilem, incidit, & tandem ex insperato atq; inexpectato sedens lenissimè efflauit animam.

Adijciam hîc & aliam historiam de quodam, qui etiam cerebri habuit vulnus profundum, & magnum, multò magis atq; prima, admiratione dignam. Ante quinq; ni fallor annos Ambergæ in superiori Palatinatu cum Illustris: Ducis Bauariæ & Comitibus Palatini Rhæni Ludouici, Palatinatus superioris præsidis essem Medicus, cuidam qui ipsius principis equi instruendi curam gessit, nomine Nicolao Graffereuter nouam explosiuenti bombardam, frustum eiusdem (inter explodendum enim in multa frustra diffrumpebatur) inter supercilia, paulo supra superciliorum intercapedinem, frontem perfregit, & ad dimidij digiti longitudinem in cerebrum obliquè dextrorsum ingressum est, aliud frustum eiusdem lateris oculi corneam tunicam discidit: vnde aqueus, siue albugineus humor totus effluxit, ex percussione vehementia, tanto impetu vulneratus retrorsum in terrâ proiectus impexit, vt ex hac illusione occipitis cerebri posterior pars vulnere obiecta, non leuiter offensa sit, idcirco magis de hæc parte, atq; de vulnere oculoue conquererebatur. Stupidus, attonitus & omnibus sensibus quasi orbatus, domum vectus, & curæ barbitonforum balneatorumq;, qui isthic magni habentur, commissus, hi cum cerebri non parum ex vulnere seminare cernerent, atq; prognosticarint eum, de speratum, atq; intra triduum, vel quatrimum moriturum. Illust: Princeps vt erga omnes sic versus suos benignissimus ac clementissimus, casum ministri dolens, me accersiri, vultis dete-

De vulnere cerebri maximo, & fungis ex capitis vulneribus excrecentibus.

nus detegere, atq; quidnam de vulnere esset, explorare iussit. ego remoueri emplastrum, & statim cerebri aliquot frustula cum sanguinis grumis, non sine reprehensione barbitonforum (volebant enim cerebrum relinquendum fore) exemi. Quod & celsitudini suæ, & circumstantibus aulicis cerebrum fuisse læsum certo constaret, id cerebri, quod abstuleram, omnibus demonstraui: ne aliud, quàm cerebrum esse putarent, ex sufficienti enumeratione partium, nec pus, nec fordes (trium enim horarum spatio tale nihil generari potuit) nec os, nec cutim, nec carnem, nec membranam, sed cerebri veram substantiam fuisse comprobauit. Celsitudo sua respondit, iam conclamatum est: inquebam, est quidem casus periculosissimus, verum non omnino desperatus atq; lethalis, hocq; exemplis plurimis confirmaui. Illust: Princeps admirandus dixit, hoc in Germania inauditum esse. vñq; Celsit: suæ conualescentiæ ministri maiorem spem facerem, attuli Fallopij commentaria in Hippoc: librum de cranei fracturis, in quibus similia enarrat, deinde quæ exempla Fallopius isthic de cerebri grauissimis vulneribus ab eo curatis recenset, Celsit: suæ indicabam. Tandem Illust: Princeps acquieuit, commisitq; totum fauciatum meæ curæ. ego cum curandum suscepi & humana pollicebar. Mira benigne lector audires, si vellem hîc recensere barbitonforum balneatorumq; quo exarsit sint erga me, tanquàm prognosticum atq; illorum curationis modum (in principio enim omnibus capitis vulneribus, & etiam grauissimis, barbitonfores in Germania adhibent cataplasma calfaciens, humectans & relaxans, nonnunquam miscent attrahentia, vocant hoc cataplasma Germanicè *ein warm gebandt* / Lat: ligaturam calidam, aliquot diebus post, feruidissimo vino vulnera eadem fouent) spernentem, furorem, calumnias, obrectationes ac maledicta, quibus me lacerauerunt, vltimò quantum virus in me euomuerint. Equidem recollectione responsi Socratis, dum à proteruo ac infosolenti homine in publico læsus, ab amico, cur illum non iniuriæ apud Magistratum deferret, interrogabatur, hæc omnia deuorauit, & alia singulis diebus deuoro: eos enim commiseratione potius, quàm accusatione dignos esse iudico. Hæc iustis de causis hîc inferre coactus sum. nunc ad rem nostram. Reperi ægrum cum febris satis intensa & delirio, oculi læsi palpabrat tribus in locis vulneratas, easq; cum vicinis partibus ad pugni magnitudinem ita inflatas atq; tumefactas, vt ad inspiciendum oculum palpebras disijungere nequierim. Mundaui vulnus diligenter, exemi tū cerebri, tum oisii paruas portiunculas à subiectis partibus liberas, immisi conuenientiā atq; vulnus obligauit, sanguinē ex brachio extrahi iussi: oculo imposui cataplasma ex farinis & herbis partim frigiditate, siccitate & leui astrictione inflammationem arcentibus, partim ex dolore sedantibus, vnde postridiē maiori ex parte tumor subsiderat: in spexi oculum & deprehendi humorem albugineum vniuersum effluxisse, corneamq; tunicam desidisse, atq; crystallino humori immediatē incumbere. iussi sanum oculum ocludere, ac intueri læso (vt fecit) circumstantes, quos præter omnem rationem & cum stupenda admiratione læso oculo æquē, atq; integro vidit agnouitq;: durauit visus in hoc oculo ad sextū vsq; diem, quo cepit deficere, erat enim tanta, ob vehementem illius oculi contusionem, putredo, vt à corruptione diutius conseruari nequierit. Opinor si exiguum extitisset corneæ tunice vulnus, visus priuationem non sequutam fuisse. Siquidem vidi in pueris corneæ vulnera stylo puncta, ex quibus humoris albuginei parum effluerat, & tamen curata, similia ab alijs sunt animaduersa. Vulnus erat ab omni inflammatione liberum, effuditq; grumosum sanguinem cum cerebri contusi aliquot particulis. ad delirium, dolorem occipitis & febrim, quæ intensius creuerant, accessere rigores inordinati, appetitus prostratio, vigiliæ, atq; vulneris magna suppuratio. Occipiti à principio repellentia adhibui, deinde exiccantia & discutientia absq; manifesto calore, interdum etiam anodina. his cum viderem nihil me proficere, contusionemq; occipitis ad suppurationem, quod ex pulsatione, doloris incremento, febris exacerbatione & rigoribus inordinatis, qui vulneribus cerebri familiares sunt, conieci, tendere: ad maturationem me conuerti, atq; paucorum dierum spatio collectam materiam suppurauit, intus apostema perruptum, & per vulnus expurgatum fuit, interim nunquam integrè à Symptomatibus enumeratis liberabatur, interdum remittebant, nonnunquam rursus exacerbabantur, inter cætera rigor.

tera rigor, præcipue noua collecta in cerebro materia, quæ expurgari nequiuir, equidem corpus purgabam, humores reuellebam, deriuabam, vlus expurgabam, exiccabam & corroborabam vulneratum cerebrum cum decoctis, matre balsami, & interim balsamo artificiali similibusq; per clystere auriculare immisissis. His dubia spe, & plurimorum hominum, qui euentum vel finem videre desiderarunt, expectatione ad quartum à vulnere accepto mensẽ perseueraui: tum primum leuem conualescentie spem concepi, & symptomatum constantem remissionem deprehendi, multum tamen puris quotidie effluxit. Tertio mense materia callosa, cuius in præcedenti historia mentionem feci, tanta duritie atq; copia ex vulnere excrefcere cœpit, vt mihi in remouendo atq; impediendo, ne vulnus ea substantia occluderetur, negotium non leue exhibuerit, compescere illam crescendi luxuriam tum causticis aquis, tum alumine, tum vitriolo combusto, tum vinculis (erat enim ferè tota exanguis, stupidi sensus & dura) tum alijs medijs, totis conatus sum viribus, at semper ex profundo repullulabat: ad extremum decimo vel vndecimo mense, conualescentia succedente, spontè succrescere desijt. Symptomata omnia sensim ac pedetentim euanescere, ac tandem 13. post inflictum vulnus, mense, per Dei omnipotentis insignem & insperatam benignitatem, valetudinem pristinam recuperauit.

Bononię in gdiibus nobilissimĩ, amplissimĩ, ac prudentissimĩ viri D. Ioannis delli Ar.
me Senatoris Bononiensis, quidã ex suis ministris ab equo calce vehementer percussus, *De oculis ac leu
thali cerebri
vulnere.*
in capite iuxta futuram sagittalem vulnus accepit rotundum, & angustum, ad cranium vix penetrans. Ob percussioneis vehementiam suo Doctore Arantio, tum temporis chirurgo foelicissimo, offensionis cerebri suspicio oriebatur, quare incisa capitis cute in foramam crucis, vel X. literæ, os detexit, quod etiam terebra perforauit ad inferiorem ferè laminam vsq; nam ob sanguinis effluuium profundius penetrare nequiuir. Secundo die rigor febrilis, quem sequebatur æstus, superuenit. A principio conquestus est de capitis, præcipue de colli intenso dolore lassitudineq; brachiorum. febr̃ quartanæ, quæ antè diu laborarat, rigor, brachiorum lassitudo casui, colli dolor contorsioni inter cubandum assignatus est. Paucis diebus post, facta euacuatione & sanguinis missione, febris omnino remisit, mitiora sunt reddita omnia symptomata, nunquam tamen vulnus mihi placuit, erant enim vulneris labra tenuia, squalida, depressa, flaccida & mali coloris, minimè vt in non lethaliibus, vel non periculosis subdura & tumida mediocriter, absq; inflammatione tamen, & viui coloris, 19 die accessit rigor & cum eo maxima atq; violenta inferioris maxillæ conuulsio, vomitus biliosus, singultus, capitis ingens dolor, inquietudo, delirium, vigilie, facultatis ventriculi retentricis imbecillitas, & colli rigiditas. Rigor erat frequens, inordinatus, absq; calore comitante, vt in quartanis rigoribus contingit. Sequenti die, excepta colli conuulsione, inquietudine, maxillæ conuulsione, omnia symptomata multum remiserunt, & tandem mortuus est. Apertum fuit caput, & inuenimus putredinem dimidiam cerebri partem occupasse, in ventriculo laterali & medio, qui tertius dicitur, plurimum tum puris, tum aque subrubro colore tinctæ vidimus. dura membrana fuit integra, & è regione vulneris aliquousq; à cranio libera, accreuerat in illo loco membrana, caro laudata, quæ etiam cranei foramen obturarat. Hoc idem in multis similibus vulneribus interemptis, deprehendi. Vnde periculosiora penes me sunt cranei vulnera, in quibus integra dura, cerebrum læsum est, vel vbi sub dura membrana læsa vena, vel arteria (quod leui de causa contingit) sanguinem effudit, quàm cum membrana simul sit vulnerata. Siquidem horum plures, atq; illorum vidi curatos, nam membrana dura cerebri, ob suam densitatem atq; crassitiem nec sanguinem emissum, nec pus sub ea generatum transmittere potest. Hac de causa nisi reprehensionem & calumnias metuerem, in grauib; & periculosis capitis vulneribus, vbi vel contusionis cerebri, vel perrupti vasis sub membrana manifesta haberem signa, auderem hanc duram cerebri membranam percindere, etenim vt in omnium, licet in horum vulnerum curatione præcipuum est, perficere, vt vulnera optime expurgentur, nam omne, quod tangitur à putrido, putrescit.

De Paralytica,
quæ ex fibri ter-
tiana notha in
colicâ dolorem,
ex hoc in parâ-
lysim, delirium
et epilepsiâ in-
cidit, ac tandem
morta est.

Febres, & colicos dolores frequenter in paralyim transire, non solum Neoterici, verum etiam prisca scriptores testantur. Etenim Paulus Aegineta librò tertio cap: 18. ita scribit, nostra ætate colicus quidam dolor incruduit: ex quo præsertim superstites futu- ros consummata artuum motus priuatio comitabatur, tactus sensu, vt videbatur, inco- lumi seruato, ceu critica quadam ex alto oborta transmutatione, vnde motus plerisq; spatio temporis spontè redijt. Quo verò difficiliore curatu extitè, etiam simplici- bus ex prædictis inunctionibus leuati sunt. Andernacus commentator scribit, Quod Paulus suo tempore accidisse in morbo colico commemorat, nos quoq; nostra ætate frequenter vidimus. Nempe ex magno diurnoq; colico cruciatu, artuum resolutio- nem, præsertim brachiorum, quanquam & crurum imbecillitas summa adfuerit. Iam ex febre, quæ humoribus ad intestina confluentibus, ibiq; dolorem vehementem exci- tantibus finita fuerit, secuta est artuum resolutio: quod nuper in Canonico quodam, sed non iuxta regulam viuente, sum expertus. Fernelius lib: quinto de partium morbis & symptomatis cap: 3. Quin etiam alius quiuus humor in spinæ medulla infixus paraly- sin committere potest: ac sæpe flaua bilis hanc infligit, quum sub finem intermitten- tium febrium in spinam dorsii ac in neruorum origines effunditur.

Desiderius facotus & Chrystophorus Bургensis Medici peritissimi & diligentes rerum anatomicarum obseruatores scholijs suis eruditissimis & vtilissimis in Hollerium Stempnum, etiam huius paralyseos mentionem faciunt his verbis. Quod autem à ve- teribus scriptum est colicum dolorem in paralyim transire, id rarum apud nos, famili- are quibusdam populis, vt Britonibus, Sacerdoti cuidam 40. annorum ex assiduo pro- pè dolore Paralysis nata, dolorem soluit, sed mansit paralysis annis aliquot. In Germa- nia & præcipue in Franconia ac in Noribergico tractu frequentissimum hoc malum est. Quo verò modo & quibus de causis hoc contingat ex subsequenti historia intelliges. Ante paucos dies Noribergæ, præfente eximio ac eruditissimo Philosopho ac Medico Henrico Volfio anatomie studiosissimo Domino & collega meo obseruando, secui iuuenem quandam mulierem, quæ primò ex hepatis & vesicæ bilis obstructione in ter- tianam notham, deinde in colicam passionem incidit. paulò post paralytica reddita, in- tegrum annum vixit, qua tamen vsu thermarum aliqua ex parte subleuata, ad extre- mum delirio ac epilepsia correpta, occubuit. Paralysis à principio occupauit brachiorum superiores partes, sensim ad extremitates manuum, vltimò ad crura descendit. ægra atro- phia contabescebat, de ventriculi ardore, siti, appetitus edendi prostratione, alui difficul- tate & dolore ilij sinistri tensu grauiq; (sentire enim sese inquiebat in illo loco pondus aliquod graue, tanquam plumbi massam) conquerebatur. Hanc mulierem aperui & reperi ecur pro corporis ratione nimis magnum obstructioneq; minimè vacans, vesic- am bilis bili crassa, ac nigra turgidam, ventriculum humore viridi plenam, atq; exten- sam. Vterius descendens inueni colon intestinum malè, atq; præter naturam confor- matum: Siquidem vbi sacculus, siue monocolus situs est, & vbi colon ventriculo an- nexum erat, colon fuit valdè laxum flatibusq; expansum, reliquis in locis ad crassum inte- stinum vsq; angustum, facibus crassis durisq; in globulos concretis infarctum, eodem modo conformatum vidi colon in multis foeminis tum Mons pessuli, tum Bononiæ. Reliqua viscera, tam naturalia, quàm spiritualia erant illæsa ac integra. Ex cerebri sub- stantia inter secandum effluxit aqua tenuis, & colore subrubicundo, quod venarum arteriarumq; incisioni ascribendum est; nam aqua, qua omnes ventriculi scatebant, fu- it tum tenuissima, tum limpidissima ac pura, nihil verò pituitæ in ventriculis cerebri vi- di. Totum spatium, quod in sacra fistula inter tenuem, ac duram membranam est, & ubi neruorum funiculi neruos constructuri, à spinali medulla recedunt, simili aqua ple- num extitit. Ex hac historia et symptomatibus, quæ præcurreunt, conjicio omnium malorum scaturiginem ab epatis, & vesicæ bilis obstructione prodijisse, indeq; febrem consequutam, vt cuiq; satis notum est. postquam verò bilis non expurgabatur per con- uenientes vias, quæ sunt intestina, ac eorundem facultatem expultricem ad recrementa propria expellenda non stimularit, haud dubiè intestina debilia stupidaq; reddita, mula- ta superflua, quæ in flatum soluta excitarunt colicum dolorem pertinacissimum, colla- gère. hi

gère, hi flatus cum liberū exitum ob coli in quibusdam locis angustiam, habere neque-
runt, in laxa parte vtpotè paulo supra inguen sinistrū collectus, huic parti vicinisq; locis,
quibus colon beneficio ligamentorū firmissimè alligatur, magni pōderis et tensionis sen-
sum excitauit, in alijs locis non eque, nam non ita laxa erant. In his affectibus bilim tenci-
orè regurgitare in ventriculum, tum quotidiana experientia docet, tum Galenus in cō-
mentarijs in sexti lib: aphoris: Hipp: aphorismo 50 manifestè his verbis demonstrat. Con-
suevit quidē & aliter in magnis doloribus, atq; mceroribus fortibus ad ventriculū fluere
biliosa superfluitas: & multo magis cum ipse malè affectus fuerit, ad ea, n. quę talia sunt,
feruntur partiu proximarum superfluitates, præsertim quę tenuem habent substantiam,
qualis est ipse biliosus humor, atq; cum eo, quęcunq; serosa superfluitas, quę sepius in vo-
mitibus bili cōmiscetur, siquidem raro admodum accedit, vt bilis exquisita euomat, cui
serosam superfluitatē non vidēamus admistā. In huius præsentis fœminæ ventriculo hu-
mor contentus vnde quaq; erat viridis, & satis tenuis, vnde non mirū, si ventriculi actio-
nes disturbatę fuerint, ac egra omnē cibum nausearit, sitimq; ardoremq; ingentem cum
morsione perceperit. Ad paralytim capitisq; alios affectus quod attinet, notissimum est,
nullas partes consensionis vim maiore, atq; cerebrum et ventriculi orificium inticem ha-
bere. quare in hoc casu cerebrum per ventriculi confortiū affectū esse minimè dubitandū
existimo, multo minus plurimos vapores ad caput elatos, atq; in tenuē illam humiditatē,
quę forsan acrimonia non caruit, conuersos, atq; totum cerebrū irrigasse, cerebro vnde-
quaq; repleto, hanc humiditatē per sacram fistulā ad neruorū originem defluxisse. ad ex-
tremum facta aquosi humoris ebullitione auctaq; acredine, sequutum delirium ac epi-
lepsiā opinor. Hęc ita sese habere omnes, quos similibus affectibus correptos, & tan-
dem simili modo interemptos vidi (vidi autem plurimos) manifestè attestantur, præ-
currerunt hæc maiori ex parte, primò febris tertiana notha, faciei color subflauus icteri-
tius non admodum dissimilis, vel color pallidus, nonnunq; pallor, interim faciei tumor,
appetitus edendi deiectio, totius corporis emaciatio & languor, pleriq; incurrunt in co-
licas passiones curagru difficilimas: colica cessante subsequitur paralytis primò brachiorū,
Secundò manuum, vltimò crurum, paralytim comitatur nonnunq; dilirium, interim le-
thargus, interim apoplexia, interim epilepsia & mors ipsa. fœminę non rectè purgantur
habentq; mensū purgationes prauas atq; inordinatas, iuuenes multi ab hac paralyti li-
berantur, si in tempore conuenientibus vtantur remedijs ac abstineant à venere, vino, &
iram reprimant. Sin minus, difficillimè, præsertim si magna accesserit hepatis obstructio
ac imbecillitas, senio confecti difficiliter conualescunt. Postq; nunc notū est, q̄modo ter-
tiana febris et colicus dolor in paralytim et epilepsiā terminentur, reliquū est, vt pauca de
paralyseos causa continenti dicamus. scriptores tam veteres, quā Neoterici de resolu-
tionis materialis causa inter sese controuerfantur. Quidā volunt omnem paralytim pro-
dire vel ab intemperie sola, vel à materia, excipio nunc resolutionem à compressione, vel
vulnere vel contusione procreatam. Trallianus existimat intemperiem calidam & sic-
cam sine materia paralytim procreare, quod Rondeletius difficilimum & rarum esse o-
pinatur. Fernelius ex Galeni sententiā ita scribit, Ea porro causa spiritus influxum et di-
stributionem interpellans, crassa ferè est pituita neruo tenaciter impacta, huncq; obstru-
ens & impediens, quominus spiritus animalis in eam distribuatur partē, in quā neruus
propagatur. Adijcit suā opinionē, Quinetiam alius quiuus humor in spinæ medulla infi-
xus paralytim committere potest: ac sepe flaua bilis hanc infligit, quum sub finem inter-
mittentiū febriliū in spinā dorsi, & neruorum origines effunditur. Rondeletius ita inquit:
Paralytim à pituita crassa neruo tenaciter inharēte fieri omniū Medicorum est senten-
tiā. Ego verò à tenui, sed multa, quæ à cerebro defluit, et ob tenuitatem, totam nerui sub-
stantiam irrigat, mollioremq; efficit, ex illa nerui remollitione, sequitur nerui extensio,
constructioni naturali contraria, quæ efficit, vt partem cui inseritur neruus, mouere non
possit. Quare non est audiendus Fernelius, qui flauā bilem, paralytim posse excitare scri-
bit. Rondeletius concedit paralytim p̄duci posse à sanguine eò fluente, sed à flaua bili me-
lancholiāq; minimè, hi, n. humores non facile eò transmittuntur, & si transfunderentur,
siccitate sua magis neruos exiccarent & contraherent, deinde bilis sua acrimonia magis
conuulsionē, quā paralytim excitaret. pluribus vitur argumentis, quibus demonstrat
tum ab

tum ab his duobus humoribus, tum ex febribus intermittentibus membrorum resolutionem procreari non posse. Si ocularis inspectio hac in parte scriptorum authoritati est præponenda, nostra sententia magis ad Rondeletij, quam ad Fernelij opinionem inclinabit, pluries enim inuenimus in cerebri ventriculis sacraque fistula aquam limpida, tenuem, & puram, quam flauam, vel bili suo colore similem, vel etiam alium humorem. maiorque itaque ex parte, si non semper, paralyfim excitat tenuis limpidaque hæc aqua, in cerebri ventriculis atque in spina dorsi collecta, quæ sensim à superiori parte nervos irrigat quoad peruenerit ad eorum extremitatem. De epilepsia causa idem quasi asserendum opinor, nam similem aquam in epilepticis apoplecticisque multoties vidi.

Porro deprehendi nec verum morbum, nec veram sedem epilepsia à priscis scriptoribus assignatam. Fernelius ex antiquioribus ita de epilepsia tradit, causa interior traditur humoris pituitosi aut melancholici ingens copia, quæ repente cerebri ventriculos meatusque inferciens, efficit, ut æger, cohibito animali spiritu, corruat. Præter humoris copiam, venenata & cerebri substantia infensa atque inimica qualitas, epilepsia causa statuenda est, quæ quoties exagitur ac prorepat in cerebrum, ea quidem feriente, cerebro autem contra pugnante, quasi colluctatione quadam ac dimicatione, fit epilepsia. Galenus videtur velle, epilepsiam absque materia nullam procreari, Rondeletius multis argumentis demonstrat, epilepsiam fieri à pituita tenui, & à spumosa, vel à bile flaua, vel attenuata atra, aut eius ichoribus, vel à vaporibus acerbis, vel à odoratu propter cerebri exactiorem sensum. Desiderius Iacotius & Christoph: Burgens: in scholijs, breuibus & rectè, totum negotium his verbis comprehendunt, de paralyfis causis, generationis modo, ac loco, non eadem est omnium sententia. Veterum enim propè omnium communis consensus est, ab humore crasso, viscoso, et ferè semper frigido procreari, obstruente (ut quibusdam placet) medium cerebri ventriculum, vel alterum, vel primum: atque ita fieri, ut interceptis vijs, spiritui ad nervos non pateat aditus, paulò post, primum ab intemperie fieri non posse videtur sine vapore, siue humore. citius enim interiturum est animal, quam ad tantam perueniat intemperiem, neque ab humore crasso, cita enim solutio materiae & paucitatem, & tenuitatem indicat, quod crassa difficile moueantur, idem demonstrant oscitatio, sternutatio, spumæ per os exitus, tenuioris materiae indicia. Accidit quoque frequentius ingeniosis hominibus, ob tenuem cerebri substantiam valde sensilem, victus rationem vaporosam, flatum, vinum fumosum, & similia. Adde omnem Epilepsiam per consensum à tenui substantia oriri, ut vaporibus bilis flauæ & porraceæ, eorundem agitatione & acrimonia, fumis, odoratis, aëre, vel vento per nares accepto. Videtur ergo causa esse pituita tenuis, spumosa, bilis flaua, atra tenuior, aut eius ichor, vapor aëris, odor ob cerebri exactiorem sensum. Neque etiam fit obstructione spirituum transitum impediende: oportet enim vel motum in vniuersum prohiberi, vel minui quantitate spirituum, qui transeunt, non sufficiente ad partes inferiores mouendas. Sed vehementior, quam antè apparet concussio, & motus inæqualitas, probabilius multò, cerebrum in seipsum contrahi, ut expellat, quod noxi-um est. Ad confirmationem explicationemque illorum, quæ in superiori historia enarrata sunt, denique ad veritatem agnoscendam, varias has scriptorum sententias in medium attuli, nihil enim in cerebri ventriculis pituitæ, nullam in ijs obstructionem, & non plus humoris tenuis, aquosi, ac limpidi in medio ventriculo, atque in reliquis deprehendere quini: ceterum totam cerebri substantiam inueni aquosa hac humiditate infectam, ventriculosque omnes eadem aqua plenos.

De hydropes
cloris.

Ad omnem prolixitatem euitandam, lubens hinc superfedeo multis anatomicis exemplis, quæ partim omnibus nota, partim ab alijs diligenter annotata sunt, quare nunc ad pectus descendam. Multoties deprehendi integris pulmonibus, vel vtramque pectoris cauitatem, vel alteram aqua plenam, interim pulmones corruptos in aqua nantes vidi, unde cum Hippocrate asserere licet, in pectore hydropem fieri, huius rei duo insignia adferam exempla. Anno 66, in schola Bononiensi Medicinæ theoriæ professor, nomine Ioannes Peregrinus (ni fallor) quinquagenarius, corporis constitutione ad phrysim

ad phrysim proclius, hydropē correptus fuit, à qua multo, ac diuturno piperis vsu seipsum liberauit, tandem in hecticam marasmodem incidit, & animam dedit. Equidem singularis eruditionis viri D. Hieronymi Cardani Medicæ facultatis professoris, mei studiosissimi precibus adductus, eum secui. inuenimus dextram thoracis capacitatem aqua plenissimam ac turgidam, pulmonem illæsum, in inferiore ventre viscera absumpta, atq; omni succo exhausta, nihil aquæ in ventris capacitate contentum, at ubiq; mesenterio, peritoneo, intestinis, lieni, hepatis, deniq; omnibus visceribus, vesiculæ inæquali magnitudine, eaq; aqua limpida plenæ adhærebant.

Virgo quædam 35. annorum integro biennio ante mortem laborauit copiosissima narium hæmorrhagia, quæ non nisi venæ sectione sisti potuit, paulò post incidit in cachexiam & hydropis initium, tumescentibus pedibus & ventre inferiore, remanente cachexia. menses fuere inordinati, aliquando non fluebant penitus, aliquando nimis erant copiosi, perdurauit tamen hæmorrhagia, quæ alternis diebus increbrescebat. Decima quarta, vel quinta die ante interit corripiebatur tussi molestissima & sicca, nonnunquam quid foetidi expuebat: sentijt punctiones & dolores in regione hepatis, euomebat bilim corruptam, præsiam, ac cum ea, vermem oblongum aliosq; simul vermiculos. Ego ad eam vocatus, deprehendi febrem malignam, quam comitabantur subsequentiâ symptomata: delirium, vigilie, inquietudo, sitis inextinguibilis, vomitus materie corruptæ, dextræ partis faciei resolutio leuis, hypochondrij sinistri ac lateris pectoris sinistri maximus dolor, ac æstus, nulli lateri incumbere potuit, color faciei flauus ac subniger, vrinæ erant subnigræ, ex dextra nare frequenter per interualla aliquot sanguinis guttulæ promaniabant. Hæc virgo post multos perpeffos cruciatus morte occubuit. mortuam secui, atq; primò occurrit vena vmbilicalis (quæ in omnibus adultis munus ligamenti obtinet) sanguinis copia turgida atq; extensa, in quibusdâ locis, vbi hæc vena contorquebatur, instar varicum, tuberosa. Hepar iustam habuit magnitudinem, sed erat album, tuberosum, inæquale, durum & exangue, ut uix sanguinis guttula ex dilecto hepate exierit, ex gibbo nihil, ex sima parum. Thoracis capacitas dextra erat aqua subnigra & putrida plena, continebatq; eiusdem aquæ cantharum & dimidium, pulmonis dextra pars in ea cauitate collocata cum pleura corrupta, ac nigra fuit. Ventriculus mirum in modum copia tum fecum, tum flatuum inflatus, ac tumidus reperiabatur, inueni & duas vesicas vrinarias, alteram naturalem & in sua sede collocatam, alteram ex matricis colli dextro latere prognatam, naturali vesica duplo quasi maiorem, lotio plenissimam & duabus tunicis, vt naturalis vesica, præditam. hic nullus meatus aquam vel immittebat, vel emittens conspiciebatur, vteri corpus erat schirrosus, callosumq; reliquæ partes satis integræ apparuere, caput non aperui. Equidem ad fructum aliquem ex hoc casu depromendum, enarrata symptomata (vt plerunq; in similibus sectionibus facio) diligenter examinaui, quanam obseruanda forent, ad certum numerum redegi, eorumq; rationes atq; causas pro viribus expendi. Hæc iuniorum ac rudiorum causa hic exempli loco, enarrare placuit. Numero esse sex, in superiori historia discussione digna iudico. & primò, postquam hepar sanguinis officina, & primum sanguificandi instrumentum in hac virgine tam exangue extiterit, tantis obstructionibus laborarit, tot, ac tantis scirrhis tuberibusq; refertum fuerit, & ex consequenti ad sanguinis generationem ineptum redditum erat, quomodo contigerit, quod hæc virgo tanta *ἀποφύστα* tam longo tempore laborarit, atq; ea quantitate venæ post mortem repletæ inuentæ sint. Secundò, quo modo sanguis in tanta hepatis obstructione duritieq; potuerit ad cauam venam, & vrina ad renes vesicamq; peruenire. Tertiò, quomodo generata hæc vesica non naturalis, ac per quas vias vrina ingressa sit in vesicam adnatam. Quartò, cur fiat, quod obstructo hepate, sanguis per dextram narem, & non per aliam corporis partem expurgatus sit. Quintò, quomodo, ac quibus vijs aqua in pectore colligatur. Sextò, vnde febris malignitas & pulmonis corruptio enata sit.

Primum quæsitum ob scriptorum diuerfas de hac re sententias, solutu non admodum facile est, immò quoquo modo disputabile relinqui potest. etenim cum Anatomia

QQ

ci &

ci & diligentes rerum scrutatores multoties (vt antè de corrupto ac putrefacto hepate dictum est) animaduenterint totam hepatis substantiam, adeò à naturali constitutione recedere, vt vix credi possit, per vim *αἱματώδους* hepatis, sanguinem in animalis corpore generari posse, & tamen in totius corporis venis multum laudati sanguinis deprehendant, alij lieni, alij alijs partibus, alij venarum generi sanguificandi munus ascribunt. Lienem hepatis vicem gerere, tanquàm quid naturæ legem excedens, multorum aures offendit. Plausibilis & rationi magis consentanea est Galeni sententia quarto de vsu partium capite 17. & multis alijs in locis, vbi docet, vti intestinis *χυλώδους* à ventriculo, arterijs pulsandi vim à corde, sic & venarum generi ab hepate *αἱματώδους* facultatem impartiri, horum partibus, suis fontibus vicinioribus maiorem, remotioribus minorem vim communicari. Ex hoc præfenti casu non solum Galeni sententiam stabiliri, verum etiam Vesalij aliorumq; refutationem rejici posse, eximius quidam Philosophus ac Medicus mei studiosissimus, in responsione sua ad meas literas, quas huius virginis amicorum rogatu de hoc casu, atq; his quæsitis ad eum scripsi, doctè ac eleganter sequentibus verbis demonstrat, certè hic tecum vix habeo quod respondeam, nisi cum Galeno in quarto de vsu partium dicam, venæ portæ ramos modicam quandam generandi sanguinis facultatem habere, non secus quàm intestinis superioribus inest quædam ciborum concoctrix facultas. Et licet hic peritissimus Anatomicus D. Vesalius & alij plures cum eo docti viri Galeno reclamant, propterea, quòd vnumquodq; membrum generet naturæ suæ similem humorem, & quòd necesse sit, vt alteratum in nutritione, in alterantis particulæ colorem ac substantiam abeat, sicuti commune *ἀρίστω* est omnium Medicorum: at in proposito nostro casu, in quo hepar in tantum à naturali sua constitutione recessit, vt prorsus exangue, callosum, obstructum, durum, & inæquale inuentum est, quæso an non cum Galeno sentire cogimur venam portæ in nostra virgine eandem quandam facultatem generandi sanguinis habere debuisse? Hactenus Doctiss. ille Doctor, nos verò, cum minimè prolixas disputationes huc adferre constituimus, hac solutione acquiescimus, atq; hoc quæsitum alijs magis excutiendum relinquemus. De ligamento vmbilicali in venam conuerso nescio quid scribam, forsàn natura eius vsum hac de causâ commutauit, vt venis portæ in sanguinis elaboratione ac generatione adiumenti parum adferret. non puto hanc venam vmbilicalem vt quidam Anatomici, qui eadem in hac vena obseruarunt, annotant, iocinoris vicem gerere.

Secundum problema nos docet in gubernandis ac conferuandis nostris corporibus, insignem admirandamq; sagacitatem, benignitatem, ac prudentiam naturæ, quæ confuctis purgationum meatibus obstructis, alios nobis minimè perscrutabiles parare nouit, vt ex illis, qui thoracis, hepatis, mesenterij aliorumq; viscerum suppurationibus per vesicam liberantur, apparet. In presenti tamè casu opinor hepar minimè ad tam exquisitâ obstructionem, vt sanguinem tenuem transmittere nequirit, peruenisse: immò frequentes *αἱμορροϊδαι* narium (vt in omnibus quasi, qui hepatis magna laborant obstructione, præcipuè qui ex hac in hyoropè incidunt, contingit) demonstrant, per hepar tenuem ac crudum tantum sanguinem ad solidarium partium nutritionem inutilem (parum enim vel nihil nutriuntur) transudare, etenim sanguinis tenuitas atq; acrimonia à sero & bili acquisita, hanc haud dubie narium hæmorrhagiam excitat. Vnde frustra Medici multi hepatis obstructione atq; debilitate relicta, per incrassationem sanguinis, hæmorrhagiam auferre conantur.

Ad tertium respondere licet, naturam non solum in rerum procreatione, vt ex rerum diuersa constitutione ac formatione, præcipuè verò in corporibus monstrosis apparet, verum etiam in morborum depulsione, frequenter ludere ac luxuriari: huius rei exempla conspiciuntur in hernijs aquosis, & in historijs paulo ante enarratis, nulla enim animalis corporis pars est, quæ non tam aliarum partium, quàm sua propria, inscrutabili modo colligat recrementa, vnde varias congestiones varioq; affectus in corpore humano procreari cernimus, quid itaq; mirum, in hac virgine, vtero malè affecto, & membris male atq; inordinatè expurgatis, inter membranas, quæ in ventre inferiori multæ reperiuntur, aquam hanc tenuem lucidamq; collectam, atq; membranæ expansis, vt in alijs locis factum est, hanc vesicam sibi formasse.

In quar-

In quarto agitur de obstructi hepatis pathognomonico & quasi indubitato signo, nimirum dextræ naris hæmorrhagia, cuius causam nulli aliæ rei, quam rectitudinæ & societati, quam dextræ nares cum hepate *extra* *ipsi* habent, ascribere quimus. At in controuersia venit, an hic sanguis tanquam superfluus & malus, à iocinore ad nares expurgandi gratia propellatur, an ob tenuitatem acrimoniamque spontè per tunicas venarum nariū tenuissimas anastomosi facta, primò transudet: secundò, an poris venarum à diuturna transudatione dilatatis, copiosius emanet, & vltimò, num per rofa vena, quam abundanter effluat. In hac nostra virgine, cum hepar inuenerit vias ad vterū tendentes, per quas sese expurgare solet, admodum obstructas, mali sanguinis superfluum ad nares protrulisse opinandum est. In viris verò, & alijs mulieribus rectè expurgatis, sanguinis acrimoniam tenuitatemque hanc hæmorrhagiam excitare puto. In hydropicis enim, quibus artus extenuati omninò erant, non tantum ex naribus, verum etiam ex ventriculo, per vomitum vidi sanguinem eijci.

Quintum quæsitum solutu non admodum facile est, sunt enim diuersi morbi, quos pectoris hydrops comitatur, utpote catharri, peripneumoniæ, pleuritides, tabes, & hydropes, quapropter huius aquæ collectionis in pectore, non vna semper est causa, sed multæ variæque esse videntur, ut ex sequentibus intelliges. Anno salutis 1563. autumnò, cum per totam ferè Italiam tussis, peripneumoniæ, & malignæ pleuritides epidemialium morborum instar grassabantur, atque multos occidebant, inueni in omnibus, quos secui, quasi totos pulmones sanguine media ex parte putrido repletos, turgidos, atque mirum in modum induratos, id spatij, quod pulmones non replerant, aqua loturæ sanguinis non dissimili plenum fuit. Capita etiam magna aquæ limpidæ copia referta erant. Alio tempore deprehendi in Phthisicorum thoracis capacitate dextra, quæ maiori ex parte his malis obnoxia est, pulmonem vel corruptum, vel absumptum, eumque in ea capacitate aqua plena natantem. Haud dubiè in his enarratis casibus, partim humiditas ex cerebro defluxa thoracem replet, partim per substantiam vasæque pulmonum tenuior in pulmonibus collecta, transudat, atque hanc hydropis speciem excitat. ad huius sententiæ confirmationem & causarum meliorem explicationem Fernelij in libro sumptomat: quinto verba huc adferam, inquit hoc modo. Suppurationi affine interdum malum est, in quo magna thoracis capacitas seroso, pituitoso, eoque tenui humore scatet, qui aut è cerebro per asperam arteriam & pulmones tenuitate sua affatim irruens, aut è reliquo corpore, aut etiam ex abdominis capacitate (quod sæpe in hydropicis animaduersum est) cæcis ductibus redundans, eò penetrauit, tum suppurationis signa, atque symptomata insunt, nisi quod neque febris affligit, neque suppurationis efficientes causæ præcesserunt. Ea proinde affectio, non suppuratio, sed suppurationi finitima est. Hæc de quinto sufficiunt. Sextum & vltimum nullam difficultatem habere videtur, satis enim notum est malos humores ad putredinē aptos faciliè putrescere, si visceri alicui calido impacti, atque infarcti, euentatione destituantur: porro acrimoniam putredinemque acquirere, qua continentia atque proxima quæque corroduunt putrefaciuntque, quæ multò magis faciliusque contingunt, si hi humores ab initio acres fuerint. Idcirco nemo de huius pulmonis corruptione, & malignæ febris, quæ ex corruptorum humorum malignis vaporibus procreata est, causis, ambigere poterit.

Anno Domini 1565, in ædibus excellentissimi ac eximij Medici Doctoris Cæsaris Odonis in schola Bononiensi practicæ ordinariæ professoris primarij (qui ut insignis doctrinæ, artium virtutumque excellentium possessor, sic & studiosorum & omnium artificum mecenas, per insignem suam erga me beneuolentiam ac officiorum liberalitatem, mihi splendidam aulam, ad anatomie administrationem concessit) multa secui corpora, & inter cætera suspensum, in quo sub liene deprehendi vesicam duorum pugnorum magnitudine aqua plenissimam, & eam à vicinis partibus absque læsione separavi, nullam vnquam quæ inuenire membranam à iocinore ad lienem sub ventriculo tendentem, quam Gabriel Cuneus Mediolanensis in sua apologia vult in mania & melancholicis morbis afflictis, prauis succis, qui post diuturnos morbos ac dolores, interim per vomitum, interim per sedem expelluntur, repletam nonnunquam inueniri.

QQ 2

Bononiæ

De vesica sub liene aqua plena inuenta.

De apostematibus in iocinore inuentis.

Bonomiæ in xenodochio, quod hospitale della morte vocatur, secui quendam diuturno morbo vndiq; absumptum, cuius iecur ita putridum ac purulentum fuit; vt integræ hepatis substantiæ vix quadrans restiterit. Lien solito maior erat, forsan in iocinoris tanta corruptela consumptioneq; (vt quidem anatomici volunt) iocinoris vicem gessit, & totum corpus, quod ex cutis colore, alijsq; humoris melancholici signis conspici licuit, melancholico sanguine aliquandiu enutritum fuit. Adjiciam hîc historiam præcedenti non valde dissimilem, notatu verò, apostematum iocinoris cognoscendorum gratia, valde vtilem. Anno 1570, cuius quidam Noribergensis natus annos 42. totus colericus, leui tussi correptus, de molesto quodam Hypochondrii dextri dolore, edendi appetitus amissione, totius corporis languore, æstu affatim & plerumq; post cibum faciem, manuum palmas pedumq; plantas inuadente, oris ariditate conqueri cœpit, vi morbi crescente, viribus decrecentibus, corpore extenuato, totius anni spatio post, coactus fuit decumbere, ac Medicorum opem implorare. vsus est multis ac diuersis remedijs, at nullo cum fructu, tandem & me simul cum alijs accessit iussit, inuenimus inter cætera febrim quandam erraticam, atque tumorem durum, tensionemq; in hepatis regione, ad medium ventris, & umbilicum vsque protentum, febris minimè erat intensa, & periodica, sed hæctica similis, quæ incerto tempore subinde per totum corpus diffundebat æstum solito maiorem, qui interim prius, interim tardius remisit, magis potus, quam cibi desiderio molestabatur, vt fere semper hominibus, qui similibus affectibus, vel etiam hepatis magnis obstructionibus, schirris, quibus calida præter naturam intemperies accedit, vsuuenire solet. Tumor erat durus cum magna tensione, et vehementi punctione, doloreq; hulceroso coniunctus: quamuis nulli lateri incumbere quierit, tamen facilius dextro, atq; sinistro, ad quod quid ponderosi in corporis commotione, vel labi sentijt, alius erat difficilis, & cum dysterijs, vel lenientibus pharmacis commouebatur, exhibant fæces biliosæ, & pituitosæ corruptæq; vrina fuit subflaua, tenuis, cum paucis sedimento eoque diuulso. Punctio, quæ agro omnium molestissima erat, nullis vnctionibus, emplastris cataplasmatibusq; remitti quieuit, tandem barbitonfor quidam doloris mitigationem pollicitus est, & imposuit cataplasma anodinum, emolliens & suppurans. vnde tumor creuit efferebaturq; magis ad umbilicum & dilatabatur ita, vt quidam suspicati sint hunc morbum in hydropem terminaturum, aliquot diebus post in illo dextro in conspectum venit tuber, quod barbitonfor existimauit ab apostemate inter musculos abdominis generato, prodijisse, quare apertionem suauis, ego cum nec vndationem, nec alia suppurationis signa manifesta isthuc deprehendere potuerim, conatui barbitonforis restiti, æger morbi molestia ac diuturnitate pertæsus, permisit sibi à barbitonfore lapidem causticum (ab incisione enim abhorrebat) apponi. Hic lapis causticus triduo, maximo ægri dolore, ac cruciatu abdominis musculos ad peritonæum ferè vsq; perrosit, & antequam abdomen penetrarat, pus in folliculo collectum, intus folliculum rupit, atq; per abdominis cavitatem, inter peritonæum, & intestina dispersum est, tumor desidit, durities euauit. eodem die aliquot animi deliquijs correptus, animam dedit. Aperto corpore, inuenimus vomitum simæ parti hepatis, cuius non parum putrefecerat, connatam eamq; satis magnam atq; apertam, reliqua fuere satis sana.

De renum apostematibus.

Quemadmodum hepar, ita & renes apostematibus diuturnis infestari videmus, cuius rei exemplum adferam. Nobilis quidam Bononiensis nomine Camillus della volta sexagenarius, cum multis annis nephritico dolore, ardore vrinæ & meiendi difficultate, quæ omnia à renum calculo prodire existimarunt, lancinatus, tandem occubuit, secundo caduere inueni renis dextri substantiam totam in pus crassum & foetidum conuersam, idq; membrana conclusum; similiter & in alijs permultis tum calculosis nephritico dolore subiectis vlcera renum magna deprehendi, dextrum verò renem, ob iocinoris incumbens forsan caliditatem, magis atq; sinisterum exulcerationi obnoxium vidi, huius Camilli vesica ob insignem inflammationem, atq; exulcerationem,

tionem ita fuit contracta, angustata, & tumida vt vix digitum admiserit, capacitas inueniebatur crasso pure plena.

Similibus collectionibus atq; apostematibus obnoxia sunt omnia viscera, immo De apostemate in mesenterio inuento.
ne cor vitæ fons ab hoc malo immune est. Adiungam hîc exempla quædam de mesenterio & intestinis, ab eximio medico Hieronymo Heroldo annotata. Patritius quidam Noribergensis homo intemperantissimus in affectionem, hypochondriacæ non admodum sua forma dissimilem incidit, aderat & nausea continua, creber vomitus & cogitationes melancholicæ. symptomata leuibus purgationibus & tempestiua sanguinis missione aliquanto remissiora sunt reddita, at nunquam malum fuit extirpatum, aliquot diebus post, sensit horrorem, & superuenit tumor & dolor dextro genui, tidem circa pubem tumor pronatus, qui vesicæ orificium ita compressit, vt difficulter vrinam reddiderit, hic tumor interim augebatur, interim minuebatur, vnde causa flatibus ascripta est, quotidiano tamen incremento ita auctus est, vt sese ad vmbilicum & latus sinistrum extenderit, & respirandi difficultatem excitarit, fuit redditus cacoehymicus & cachecticus, & postquam cruciatibus morboq; totus contabuerat, septimo à morbi principio mense obiit diem. Apertum fuit corpus, & in eo inuenta collectio materiei purulentæ ac foetidæ, nimirum inter duas mesenterij tunicas, collectio hæc occupat maiorem ventris inferioris partem, & hepar sua putredine infecerat. hinc non mirum, si facta mala sanguificatione tumoribus inflationibusq; crura infestata (vt hydropicis contingit) fuerint. Opinandum sanè est multos similem materiam tanquam grauissimorum morborum fomitem in hoc mesenterio coacervare, à qua si non per vomitum, vel per aluum liberantur, in tædiosos, longos, atq; grauissimos morbos incidunt, & vltimò miseris consumpti occumbunt, inter cæteros, quos vomitu à materia atra atq; corrupta liberatos vidi, fuit mercator Bononiensis nomine Ludouicus della ratia, qui multoties omnium doctorum, in primis verò Doctoris Camilli Franchini vel Montagnani, viri in re medica magni, maioris verò expectationis, nisi matura morte præuentus, concessisset fato, admiratione, vltra duas vini mensuras, boccalia vocatas, bilis atræ ac acidæ, maximo sanitatis emolumento euomuit, quæ vt ex certis coniecturis patuit, in ventriculo minimè accumulata fuerat,

Honestæ quædam matrona Noribergensis à conceptionis primordio, mense quinto, malè incepit habere, & octauo mense periit, conquerebatur de magno sub hepatis regione ardore. inuentum est colon intestinum hac in parte denigratum, & putrefactum. Idem hoc malum in duobus vel tribus alijs, eodem modo afflictis, deprehensum fuit.

Anno Salutis 1570. Noribergæ vocatus sum ad quandam mulierem, quæ longo decubuerat tempore.angebatur transglutiendi difficultate maxima, & tanto gulæ ardore, vt præ eo nec dormire, nec sitim sedare quierit. Aucta gulæ angustia, vix quid liquidi in ventriculum immisit; ventriculus ad vomitum excitatus egerebat interim cibum, interim phlegma viscosum ac crassum, interim etiam pituitam cum bili crassa permixtam. ægra sciscitata, num iuxta ingressum gulæ in ventriculum, vel ventriculi orificium quid, tanquam clauis infixi, vel globulum persentisceret, respondit sese toto octennio tale quid in ea regione percepisse, atque transglutiendi magna difficultate laborasse, similisq; morbo & patrem, sorores & alios suos amicos occubuisse affirmabat. Tandem nutrimento destituta, atq; ad extremam perducta maciem, extincta est. Mortuam aperui & inueni ad ventriculi orificium scirrhum pugni magnitudinem excedentem, substantiæ gulæ innatum, qui crassitie ac tumore suo angustarat, atq; obturarat esophagi finem. Mesenterium visum fuit ex multis ijsq; satis magnis scirrhis conflatum, sic & pancreas, omentum contractum, crassum & ligno durius inuentum. Ventriculus inanis, hepar subalbidum scirrhisq; refertum erat. Quamuis hæc mulier totum octennium hos scirrhos gestarat, atq; transglutiendi difficultate indies magis ad finem

De scirrhis ventriculi orificio, mesenterio omnia to & iocimori adnatis.

vitaē vsque afflictā fuerit, nihilo secius (quod valde mirum est) vteunq; commode, laete ac hilariter vixit, liberos procreauit, habuit tamen macilentum semper corpus.

De vesica fellea
obstructione à
calculis in ea ge-
neratis. Ob-
seruatio.

Calculos in varijs nostri corporis partibus generari, Gesnerus proprio libro docet, ego etiam diuersis in locis calculos vidi, & in fellea vesica præcipue, quæ post renes vesicamq; vrinariam frequentissimè calculis infestatur, adferam hinc aliquot exempla, ex quibus & adidescet symptomata hoc malum sequentia. Bononiæ praxeos Medicinæ ordinarius professor quidam nomine Beatus, habuit matrem sexagenariam, quæ cum diutissimè regio ni fallor morbo laboraret, & continuo ciborum vomitu excruciatā fuerat, tandem mortua est. In eius vesica fellea multi reperti sunt calculi, & in meatu à vesica bilis ad duodenum intestinum magnus, qui cum meatum vndequaq; obstruxerat. Vnde hac via obturata, natura bilim in ventriculum exonerauit, ventriculus perpetua acrimonia stimulatā, omnia per vomitum reiecit, fuerunt Medici, qui volebant hanc *πικροχόλην* fuisse, at cum non, nisi in hoc tantum morbo, vomitu infestata fuerit, existimo proprium meatum minimè à vesica fellea in ventriculum immisum, sed potius per inscrutabiles vias (vt in his, qui hepatis vesicæq; fellis magna laborant obstructione, quotidiè cernimus) in ventriculum bilem flauam profundū. Aliàs secui Iulij Cæsaris Bouij, Ioannis Bouij Iuris & Doctoris, & Professoris, Boniniæ Germanorum olim isthinc Mecenatis filij famulam, senio & morbis confectam. inueni in fellea vesica duos insignes lapides cæruleos, quorum alter quasi oui columbini magnitudinem adæquabat, laborat diu regio morbo, ac vltimo febri correpta occubuit. Præterea in Palatinatu superiori quandam noui scæminam molestissima ac admodum diuturna icteritia, per calculi cum alui recrementis excretionem, liberatam. Idem etiam Fernelius notauit. Vnum hinc animaduertendum est, quod in icteritijs quasi omnibus, vt & in his, qui hepatis grauiori obstructione laborant, vesica fellea fel in ventriculum, aliquando per manifestos ad visum meatus, aliquando etiam per naturæ cognitās, nobis ignotās vias, eructet, vnde ciborum, carniū verò præcipue sequitur nausea, multoties oris amaritudo, variorum potuum & ciborum, quibus tamen statim exsatiantur, appetentia.

ANATOMICÆ OBSERVATIONES

EX DIVERSIS BRVTIS DE-
sumptæ.

De cerebri mo-
tu & ruminan-
tium partibus.

Agnorum, hœdorum, & canum viuientium, quod certò, num cerebrum mouetur, deprehenderem, aperui capita: at nullum cernere quiuī in ijs motum. quod in cerebri magnis vulneribus cerebrum simili cum arterijs motu agitari videtur, arterijs, & non substantiæ cerebri ascribendum est. Quod summa admiratione dignum existit, brutorum viuientium cerebra detexi, vulneraui, & intactis neruis, eorundemq; principio & ventriculis medijs illæsis exemi, at nullum vel vocis, vel respirationis, vel sensus vel motus offensionis signum in ijs deprehendi. Aues absque cerebro aliquandiu viuunt, vt quilibet in gallinis vel pullis gallinaceis, si rostrum superius cum dimidia capitis parte abscederit, cerebriq; maiorem exemerit partem, experiri potest.

De olfactus in-
strumento.

Porro vidi productiones proceras sub cerebri mamillis exortas, olfactui inseruiētes, vt & Vesalius in examine notauit, nō, vt in hominibus, exiles, et occlusas, sed veluti in ouibus crassissimas, atque vt Vesalius inquit, quintuplo humanorum processuum mole superantes, & longissimis papillis iuniorum vaccarū similes, intus manifesto canali donatas, quæ in fine crassiores sunt, & spatium ossis ithmoidis, magis atq; in rationabilibus exerti maiorisq; sua substantia intus candidiore, extus cerebri substantiæ simili ambire, siue inuestire videtur. In ablatione cerebrales hi processus apparent foraminibus ossis ithmoidis firmiter inhaerere, & etiam meatibus proprijs, per quos odores trahuntur, atq; cere-

atque cerebri pituita expurgatur, non carere. Differunt autem hæ proceritates siue olfactus instrumenta, tum longitudine, tum crassitie, tum cavitatis amplitudine inter se, pro diuerforum animalium natura. Quanto enim quodq; animal acutiori sensu olfactus est præditum, tantò proceriores, crassiores & laxiores has cerebri productiones obtinere cernimus. Hinc homines hoc sensu multis brutis longè inferiores, etiam minores, breviores atq; angustiores processus hos consequuti sunt, canes venatici sagaces, qui olfactu feras inuētigant, alijs canibus hoc instrumento olfactus antecellunt. Pro certo itaq; statuere licet contra Galenum, qui multis argumentis, priores siue laterales duos cerebri ventriculos, primaria olfactus instrumenta esse demonstrat, has easdem productiones olfaciendi munus subire, videtur enim, vnam partem non posse esse simul sensorium primum, & secundum.

A lateribus sellæ & glandulæ pituitam excipientis vtrinq; atq; etiam sub glandula ipsa vidi plexum implicato reti non dissimile, in bouino capite admodum con-
De rete mirabili.
 spicuum, in hominibus minus manifestum, quod à Galeno rete mirabile dictum est, & ex arteriarum complicatione constari docet. Sunt multi, qui Galenum tanquàm hoc rete effluerint, reprehendant. Verum enim verò, si quis veritatis studio addictus, rem diligenter perpenderit, inueniet hoc rete in omnibus quadrupedibus, atq; pro ratione animalis maius ac minus: porro videbit non ex arterijs, sed ex neruis (vt ego opinor) tertiæ coniugationis cerebri compositum, sunt enim huius retis funiculi tum colore, tum duritie, neruis magis, quàm arterijs, vel venis similes.

Animaduertas in bouinis cerebris venas easq; satis magnas, præcipuè verò in corpore calloso.

Hæc odorum, vt omnium animalium ruminantium uenter inferior aliquot donatur
*De partibus munitioris rumi-
nantium.*
 partibus, aliorum non ruminantium partibus dissimilibus. Aristoteles lib. 3. de partibus cap: 14. inquit: Deum ruminantibus animalibus ob dentium inopiam (carent enim superioribus incisorijs dentibus) quò mandendi defectum resarciret, plures ventres dedisse, horum primus inconfectum, secundus aliquantulum confectum, tertius plenius, quartus perquàm plenè confectum cibum excipit. Ita fit vt hoc genus animalium receptacula cibi habeat plura, quibus nomina hæc aut indita sunt, aut indere licet, venter, arfineum siue reticulum, omasum, abomasum, Aristot: de historia animalium secundo capite 17. inquit. Gula post diaphragma se applicat ad ventrem inferiorem, qui parte interiore asper interceptusq; est, ac prope gulæ commissuram sibi annexum habet, quem ex argumento reticulum vocat, est enim ventri extrinsecus similis, intus reticulis mulierum implexis, magnitudine multò, quàm venter minor, hunc excipit omasum parte interiore asperum, cancellatum, crustatum, magnitudine reticuli, abomasum venter ab eo alius iungitur, magnitudine amplior omasi, forma oblongior, cancellis intus, & crustis multis magnis, & leuibus innormatus. mox intestinum iam sequitur, hæc tenus Aristoteles.

Equidem reperi primò omentum maiori ex parte ventriculos inuoluere, & multo alter, atq; in non ruminantibus situm, intestinum autem non longè à gulæ in reticulum ingressu prodibat, minimè ex abomasone produci (vt Aristoteles putat) à me visum est. Intestini principium fuit satis amplum & multis satisq; magnis rugis intus exasperatum, duarum palmarum longitudinem non excedebat, huic annexum erat intestinum gracile tenueq; viginti quinq; vlnis longius, miro modo contortum atq; implicitum, quod tandem medio sacco recrementis referto immittebatur, ex sacco rursus prodibat aliud intestinum tenue, proprijs facibus plenum, & quatuor vlnas longum, ex hoc intestinum rectum enascebatur. Longitudo autem omnium intestinorum facillimè superauit vlnas triginta. huius longitudinis Aristoteles rationem reddit, nimirum, quod auctiora sint, cornigerorum enim propè dixerim omnia ampliora (& alio in loco) maiora multiplicioraq; cornigerorum intestina sunt pabuli ratione, &c.

Ruminantium vteri bicornes sunt, vt & canum, felium, suum, atq; multorum alio-
*De ruminantium
uteris & tes-
tibus.*
 rum ani-

rum animalium matrices. Testes in fœmellis ex multis glandulis vesiculisq; inuicē confusis atq; annexis conflantur, vesiculæ quædam continebant aquam limpida, quædam luteum humorem, tribus obduci tunicis visæ sunt glandulæ, tum vesiculæ, quarum prima immediatè testium substantiam, instar dartos ambit, ténuitate atq; molitie tamen darto cedit. Secunda vesiculas & glandulas simul colligat. Tertia laxè testes amplectitur, & quoquomodo virorum elitroidem tunicam, & vlu, & substantia exprimit, nam postq; testes complexa est, videtur membranam carnosam, latam, asperam & vasis, plenissimā constituere, quæ tandē non longè à teste angustatur terminaturq; in vas deferens, seu corpus, quod Vesalius epididymum vocat. Hic epididymus perforatus est, eiusq; perforatio non tendit ad cornua, sed satis longè ab vteri cornubus soluebatur, scio in quid, nullam verò huius epididymi deprehendere quivi cum vtero communicationem, vidi vtrinq; à lateribus multas venas & arterias ad hunc porum spermaticum, tanquam sanguinem spiritumq; ad seminis generationem eò deferentes, tendere, easq; cum epididymo capreatim descendere, eodem ferè modo sese negotium in mulieribus & alijs quadrupedibus habet. legas de hoc epididymo in tabulis internarum partium, Venæ arteriaq; permultæ à lateribus vtrinq;, partim ab epididymo, partim ab alijs vicinis venis exortæ, cornubus vteri tortuosis & inflexis, secundum longitudinem, in prægnantibus animalibus manifestius, in non prægnantibus obscurius implantantur, Cornua vterorum prægnantium aliter, atq; non prægnantium sese habent: horum enim sunt contracta, sicca, angusta & dura, illorum verò cornua à principio, & toto conceptionis tempore humidiora, latiora laxioraq; & mucore quodam, vt in mulierum, quæ abortiendo animam efflant, vteri aliquoties deprehendi, obducta.

De genitura s.
uel 10. dierum.

Dum hæc diligentius in multis animalibus inquirebam, incidi in vterum suis, in quo reperi genituras aliquot s. vel decem (ni fallor) dierum, & vidi in medio vteri, vbi cornua vtrinq; abscedunt, substantiam pellucidam, vitreo humori in oculis substantia, coloreq; similem, membrana conclusam, in cuius medio erat punctus sanguineus circulo sanguineo, vt de ouis gallinaceis dictum est, circumdatus, à puncto videbatur prodire vena & arteria, vel arteriæ quid simile, ex quibus multi ramusculi exerti per substantiam feminalem diffundebantur, vesicis pertusis, effluxit aqua, & simul viscosum quid, seminis naturam referens.

De cordis motu,
diastole, systole,
& quiete.

Ad cordis motum rectè cernendum, aptissima sunt animalia viuia, vt sunt ferè omnia amphiuia, feles, lacertæ, serpentes, & inter pisces anguillæ, lucius piscis, & id genus alia. Equidem felis iuuenis viuens pectus alterum aperui, & mediam, vtroq; percisso, integram amisit vocem. Pericardio secto, duplicem, atque contrarium in corde vidi motum, cordis nimirum & eius auricularum, dum enim cor pulsatione efferebatur, auriculæ subsidebant: rursus subsidente corde, attollebantur atq; implebantur auriculæ, ita vt auricularum diastole cordis systoli, auricularum systole

De auricularum
cordis motu.

cordis diastoli responderit. Auriculæ sese hoc modo componebant ad diastolen, instar vesicæ visæ sunt inflari, & cum extensæ erant, rubrum acquirere colorem, & aliquantisper morabantur, antequam ad systolen contenderent, sic rursus post systolen ad diastolen properantes, etiam leuem moram trahunt. Vt auriculæ in diastoli ob sanguinis spiritusq; repletionem rubescunt atq; extenduntur, sic in systole candescunt, flaccidæ rugosæq; factæ considunt, atq; vi cordis in cordis basim nonnihil rapiuntur. Cordis verò diastole hoc fit modo, basis corrugata constringitur deorsumq; versus conum rapitur, ac quod de latitudine amittit, in rotunditate recuperat: latera cordis vnde quaq; distenduntur, conus sursum versus basim trahitur, leuiter ferit è regione pectus. In hac actione nulla non pars vel fibra laborare & corrugari videtur, rapta basi deorsum, tendente mucrone sursum ad cordis centrum, ventriculi expanduntur redditurq; cor breuius et rotundius, absoluta diastole, parum remoratur, priusquam ad systolim sese componit, facitq; hoc tempus, quod Galenus vocat medium tempus inter diastolen & systolen, siue quietem vocat, & pia memoria primus præceptor meus Regnerus Prædianus qui fuit vir summa integritate, innocentia, ac eximia eruditione eloquentiaq; *Ordo*

De quiete cordis.

De systole cordis.

æquum tanquam intermissionem dices, appellabat. Post hanc vix, comprehensibilem quietem

quietem rursus subsidit, & tenuius, latius, longius, flaccidius ac pallidius redditur facitq; systolen. Hæ cordis compositiones in diastole & systole me haud dubiè traherent in sententiam Realdi columbi, qui putat in nostra diastole sanguinis spirituumq; fieri expulsiōem, in systole horum exceptionem & minimè attractionem (spontè enim vult flaccescere corde, sanguinem & spiritum in ventriculos cordis illabi) nisi auricularum motus, cordis motibus contrarius esset. Arteriæ videntur eodem tempore, quo cor, diastolen ac systolen facere, deinde simili modo cum corde in diastole contrahi, & in contractione breuiari, dilatari, ac subsalire. His ita animaduersis, totum cor excidi, & cum diu eius pulsationem maxima cum admiratione contemplatus eram, longa facta incisione, ventriculum sinistrum, vt cognoscerem, num etiam vulnerato hoc sinu, vel ventriculo, cordis cessaret pulsatio, aperui. at non statim, sed paulò pòst, dextro adhuc perseverante, pulsare desijt: sic & dexter percussus. aperto vtroq; ventriculo, cordis medianum & latera palpitando perseverauère, præsertim septum carneum. vltimum pulsans erat cordis basis, pulsatio in felis, viperæ, & lacertæ cordibus plus minus quartam horæ partem perdurauit.

Deinde in eodem catulo sex vel septem dierum, reliquas intuitus sum partes, *De catulo felis.* atq; inueni pulmones exanguis, & candidos valde, sanguinem enim necdum loco nutrimenti assumpserant. In ventriculo continebatur viridis spuma ex bili elata, opinor cum toto quadriduo nihil cibi ingesserat, ventriculum biliosos humores attraxisse, intestina superiora vacua, præ alimenti desiderio ab inferioribus portiones satis longas in sese traxerant. Oculos propter palpebrarum coalitum habebat oclusos, disunctis verò palpebris visui sese obtuli cornea multò, quàm in adultis candidior & obscurior, porro ob aquei humoris defectum erant plani, & necdum in rotunditatem elati. humor crystallinus in his catulis præ sua humiditate diffluit & vix formam suam exprimit, oculorum tunicae satis sunt conspicuæ. In adultorum felium oculis plus humoris aquei, atq; in canum oculis inueni, & vucam tunicam intente nigram. Aurium cavitati primæ mucor quidam inhærebat, gustatus & olfactus instrumenta, vt quibus prius eguit animal, perfecta reperta sunt.

Porro in lacerta præter cor vidi pulmones bipartitos ranarum pulmonibus non dissimiles, nimirum raros, spongiosos, fæminarum vittis cum extensi erant referentes, horum beneficio ranæ pulmones spiritu replentes, vno anhelitu siue spiritu diutissime coaxant, luscinia aliæq; aues diutius cantant, tales sunt omnium ouiparorum, vt Aristoteles 3, de partib; animalib; lib; cap; 6, demonstrat, inquit enim, Quæ ouipara sunt, exigui & sicci, sed aptum ampliari ac extumescere, cum inflantur, nimirum consequuntur pulmonem: qualis eorum est, quæ ex terrestribus quadrupedes ouiparæ sunt, vt lacertarum & testudinum, & cæterorum generis eiusdem sunt. Volucrum etiam natura, quas aues appellamus, eodem pertinet. omnium enim earum pulmo fungosus, & spumæ similis est. Spuma enim facta diffusaq; ex amplo tumore in exiguum residet, & pulmo earum, exiguus membranæq; similis est: quamobrem hæc omnia parum sitiunt, & parum bibunt: diu etiam aquam demersa tolerant. Satis enim ab ipso pulmonis motu spiritali inaniq; refrigerantur diutius, vt quæ parum caloris habeant. In præfenti lacerta pulmones fuere satis magni, atq; magis in ventre, quàm in thorace collocati, siquidem hic diaphragma non inueni. lateribus hepatis in longum vtrinq; exporrecti, pulmones adhærebant, tumidi atq; inflati erant, cum comprimebantur, rursus intumescere. In inferiori ventre reperi ventriculum satis longum & pro ratione corporis satis crassum in longitudine exporrectum, venter erat vermibus, millepedibus & scarabeis plenus, intestina longiora atq; piscium, magisq; inuoluta. In ilijs, vbi renum est regio, vtrinq; vnum corpus testibus tum figura, tum colore simile, cui adherere visa sunt vasa feminalia, quæ rursus sub recto intestino congregientes constituiebant corpus glandulosum, testes erant pleni semine, lingua illi fuit bifidula & osium hyoidis vbi in

RR

vicem

vicem concurrunt & vnum constituunt, extremitati adhæret, Carent aure, vt omnes ferre aues, quare membrana myrinx statim apparet, atq; immediatè aëri, vt forsan facilius audirent, exposita est. In aure stapes & incus ossa dissimilia erant ab aliorum animalium incude & stapede. A prima auris cavitare tendebat meatus in palatum satis conspicuus.

De viperæ anatomia & serpentium veneni sectione.

In viperæ sectione primò attigi caput, nimirum maxillæ superioris dentes, in quibus opinatus sum veneni vim occultatam esse, & vidi ab vtracq; parte secundum longitudinem, dentium curtorum ordinem exporrectum manducationi inservientem. præter hunc ordinem vidi aliquot dentes incuruatos acutissimosq; vesiculæ vtrinq; à lateribus seriei dentium externis, sub oculis collocatæ, quæ sub viride continebat virus, inclusos, erant inter eos dentes duo insignes exteriores et incuruati, sub his aliq; aliquot positi, & omnes musculo paruo alligati, equidè opinor hos dentes peculiari vsui inservire, nimirum vt, cum viperæ serpentesq; venenati (habent enim omnes tales vesiculas ipsiq; dentes inclusos) aliquod animal suo veneno offendere voluit, attracto musculo proprio, cui hi dentes alligati sunt, dentes exerantur, et vtracq; maxilla mutuo adducta, vesiculæ dentium acumine pertundantur, eaq; actione simul id, quod ore apprehensum est, vulnere, & ita veneno penetrandi via aperitur. Hunc dentium vsum comprobant omnes, qui à venenatis animalibus læduntur, nam omnes vulnerantur. habes & testimonium apud Scaligerum, qui inquit: viperæ habent acutos duos dentes mobiles, qui per musculos mouentur. videtur & scorpio eadem ratione suum exitiale virus effundere, sub caudæ enim aculeo, quo ferit, vesica veneno plena latitat. Asperæ arteriæ origo (vt Aristoteles inquit) ita iuxta os ipsum posita est, vt esse sub lingua videatur, & videtur linguæ præminere, quoniam lingua intus reuocatur. Equidem vidi arteriæ asperæ caput collocatum esse ad menti extremitatem, ea figura, qua auium larynx prædita. hinc fit, quòd loco vocis, quæ fit allisione aëris vehementer expirati ad laryngis latera, oris coelo non parum adiuuante, serpentes sibila edant. Larynges serpentum, vt & (nifalor) auium, epiglottide carent, at loco eius motu conclusionis & dilatationis donantur. Arteria aspera per collum, quod quatuor digitos longum erat, gulæ instrata descendit ad ventrem inferiorem, & ad hepatis medium vsq; vbi definebat: quomodo verò in pulmonem ingressa, & per eum distributa sit, visu comprehendere nequiuim. Pulmo collo statim suberat spongiosus, rarus, rubicundus, minimè tamen ita rarus, vt lacertæ pulmo conspectus, in longum producebatur. Semper vnicus, minimè vt lacertarum pulmo, bifidus, dorso inharebat. Porro vidi linguam nigram, & bifidam, minimè (vt Aristoteles vult) asperæ arteriæ instratam, sed potius ei subiectam. In corde animaduerti eadem, quæ de felis & lacertæ corde tradita sunt: auriculæ cordis in cordis diastole tanta vi rapiebantur intus, vt & caua vena, cui dextra auricula annexa est, contrahi visa sit, ex hac operatione manifestè liquet, in cordis diastole ex arteria venosa spiritum, & ex vena caua sanguinem magna vi trahi. huius viperæ cor, vt reliquorum viuipetorum capsula sua non fuit destituta, eratq; illi forma conoidis, & minimè forma renibus similis, qualem Aristoteles serpentibus terrestribus in genere assignat. scribit Aristoteles de corde serpentum secundo libro de natura animal: cap: vltimo hoc modo: Cor arteriæ postremæ adhæret exiguum, sed longum, & renum speciem referens, quamobrem videri interdum potest minus mucronem suum dirigere ad pectus. Pulmo deinde annectitur simplex, fibrosus, fistulosus, prælongus, longeq; à corde sepositus. De reliquis partibus ita, ventriculū velut intestinum laxius, habent, canino similem, tum intestinum longum, tenue, & ad exitum vsq; vniforme, iecur item longum, & simplex. Sed lien exiguus, rotundus, vt lacertis, alio in loco, viperæ lienem habent paruum, vt cæteræ, quæ velica carent. In genere de visceribus ita inquit: serpentes propter corporis formam, quæ longa est, & angusta, speciem quoq; viscerum habent prolixam, & cæteris animalibus dissimilem, vt quam ad sui corporis opificium quasi formulam effigiatam sortiantur. Hactenus Aristoteles.

Nostræ

Nostre vipere ventriculus visus est oesophagus dilatatus, ex tribus tunicis compositus, nimirum interna membranosa, longis rugis & fibris, Secunda carnosae, fibris transuersis donata, & tertia à peritoneo producta. Longitudo excedebat 4. digitos, terminabatur in intestinum angustum, quod mox aliquanto latius factum, semper pinguedine inuolutum, recta deorsum perrexit, & postquam ad hepatis finem peruenerat, acquiescit vesicam felleam satis magnam, quae manifestò (vt in piscibus lienem facere cernimus) intestino & non hepati adhaerere visa fuit. Lienem inuenire nequiuimus. Iecur 6. digitos longum fuit & ventriculi intestinorumque lateribus magis tamen dextro lateri annexum, extremitati vena porta inferebatur. A lateribus, intestinorum utrinque inferne sursum vterus bicornis & longus ascendit, & cum ovis plenus est, monilis foeminarum formam refert.

Testudo nemoralis, beneficio cutis durae, crassae, & squamosae, orae siue ambtui teste putaminisue annatae, quam firmissimè putamini & superiori & inferiori, capite, cauda & cruribus liberis, agglutinatur. alijs in locis caro ita validè testae annectitur, vt absque carnis dilaceratione vel auelli, vel abscindi nequeat. inter separandum occurrunt venae magnae, contententes ad testam, quam excavaunt leuiter, vt sedem firmam isthuc consequantur. Vertebrae omnes à colli fine, ad caudae principium usque mediae testae, ad vertebrarum exceptionem, leuiter secundum longitudinem protuberanti, connascuntur: hinc fit, quod testudo immobile habeat totum dorsum. Pulmonem habuit, vt rana inflata, spongiosam, & vt in auiibus videmus arteriae asperae adnatam, in viua testudine compressus pulmo, rursus efflabatur. Aristoteles inquit; testudo terrestris pulmonem habet exiguum & siccum, sed aptum ampliari ac extumescere, cum inflatur, sunt, qui testudinem in genere *de quibus* collocent, Equidem animaduerti simplicem vnumque ventrem, intestina vero breuia & simplicia, minimè intorta. sub cauda habet quid linguae simile, in quem usum ignoro, venatores existimant penem esse, & cum in medicum usum valde expetunt, vnde statim capta testudine caput summa vi comprimunt, tum enim exierit penem sub cauda collocatum, quem venatores abscindunt. Principio huius linguae, ceu pudendi, annexum erat quid vesicae instar, vacuum, cuius exitum deprehendere nequiuimus. Lateribus adhaerebat corpus quoddam varicosum, epididymum & figura, & varicosis ductibus referens. His epididymis annati sunt testes, intus in lumbis latentes, satis magni, colore flauo, nullos inueni renes, sed ad duodenum intestinum reperi glandulam quandam rotundam et rubicundam, reni non admodum dissimilem, at quia propriam suam minimè habuit sedem, renem esse non credo. Aquaticas ac terrestres testudines longitudine & acumine caudae dicunt à se mutuò discerni, aquatica enim acutiorem longioremque, terrestres breuiorem & obtusiolem caudam consequuntur, porro in hoc etiam differunt, quod in terrestrium caudis reperiatur quid auium vnguibus simile, Foemellae dignoscuntur à maribus testae inferioris prominentia & rotunditate, atque caudae tenuitate, nam in foeminis testae inferior, qua tegitur abdomen, longè magis prominet, atque rotundior est, quàm in masculis: deinde longiores tenuioresque conspiciuntur earum caudae.

In animalibus cognitis, quae mihi admiratione digna occurrere, non exiguum fuit operatio, quae in echino siue herinaceo terrestri conspicitur, dum se totum (quod praeter herinaceo terrestri) aduersus externarum rerum iniuriam cute spinosa includit, atque in rotundum orbem sese conuoluit, quapropter huius operationis causae inuestigandae gratia echinum secui, in quo inueni musculum latum, crassum, carnosum laxè dorso adhaerentem, cuti verò ita firmè connatum, vt absque laesione à se mutuò separari nequierint. non longius sese, atque cutis spinosa pars, extendit: continet enim spinarum, quae ex hoc musculo, sicuti plantae ex terra, enascuntur, radices. Musculi huius munus est pro animalis voluntate dorsi cutim expandere, contrahere, & simul spinas attollere siue erigere, & dimittere. Ad haec praestanda plures diuersaeque actiones, per

consequens plura diuersaq; desiderantur instrumenta: nimirum musculi, quorum alij hunc cutis muscolum antrorsum versus caput, alij retrorsum caudam versus, alij à lateribus vtrinq; ad abdomen, alij in orbem quoquo versus trahunt, & ita reuocato capite deorsum & cauda, lateribusq; contractis, musculo sphincteri siue circulari quoquo versus in orbem constricto, animal quàm arctissime coarctatur, conglobatur, at totum cutem spinosa inuestitur. Quo autem modo, nunc ex musculorum explicatione intelliges. *Latus musculus*, cuius primò memini, cutis spinosæ motui inseruiens, dum quiescit, impense crassus existit, & ex laxis tenacibusq; fibris conflatur: expandi enim, vt totum vndiq; integat corpus, debuit, cum verò in sua est operatione, tenuior existit, fibræq; tenuiores & magis tensæ inueniuntur. Hic musculus vt duplicem consequitur vsum, sic etiam ex duplici fibrarum specie conflatur, altera enim eius pars componitur ex fibris longis, & dorsum quasi totum occupat. altera duorum digitorum latitudinem adæquat, atq; priorem partē, instar Zone eidem annexa, circularibus fibris, quales in sphincteri reperiuntur, prorsus ambit. Capiti adducitur duobus musculis, qui ab extremitate rostri prodeuntes, tenues, et deinde sensim magis dilatati, transcendunt caput, & sub musculo parte circulari, aliquousq; progressi, lato carnososq; fine, fibris huius musculi rectis implantantur, similes duo musculi à cauda valida, & breui exoriuntur, qui simili, quorum primi, fibris rectis inseruntur modo. A lateribus sunt tenues lati q; musculi, singulis crurum superioribus partibus singuli annati, inde sursum repentes, lato fine, circularibus fibris coalescunt. Sunt itaq; hi musculi, lato excepto, numero octo, qui dum echinus sese, vt familiare est omnibus quadrupedibus lato pectore, & clauiculis præditis, qualia sunt simiæ, vrsi, mustelæ, echini, capite inter anteriora crura, cauda inter posteriora reconditis, ac omnibus cruribus contractis, conglomerat, cum capite, cauda, cruribus, quibus annexi sunt musculi, trahuntur, tracti latum musculi simul secū ducunt. Quo factio, lati musculi circularis pars, siue sphincter contrahitur, atq; vt nos crumenas, vel saccos constringimus, eodem quasi modo echini cutim coarctat, eaq; animal totum includit. Hoc tempore miro ac spectabili naturæ artificio omnes spinguntur, & erectæ vbiq; consistunt, donec relaxentur omnes enumerati musculi. Ad partes spirituales & naturales quod attinet, inueni echinos porcinos porcis similes tum intus, tum foras: alios caninos, quibus viscera interiora canum visceribus fuere similia, at in partibus genitalibus, quæ non tantum in diuersi generis brutis, verum etiam in hominibus non leuem sortiuntur inter se diuersitatem, magnum inueni, quo ab alijs differunt, discrimen. Testes epididymiq; echinorum masculorum, tum situ, tum figura, tum connexione ita, quemadmodum hæ partes in testudinibus, sese habent. Vbi deferentia vasa terminantur inter rectum intestinum et vesicam vrinariam, eoue in loco, in quo in nobis varicosi adfites collocati sunt, reperiuntur glandulæ carnosæ tres, satis magnæ, & laxis ligamentis inuicem coherentes, nulla prædita cavitare. Præter has glandulas reperiuntur vesiculæ duæ, semine elaboratissimo turgidæ, à lateribus vrinarij meatus sitæ. Rursus in regione testium vidi duas glandulas, prioribus minores, sed candidiores semineq; turgidiores, quæ per manifestum meatum, semen in vrinarium meatum profundunt. Similes eodem in loco lepores, cuniculi, & eorum animalium, quæ numerosos producunt fœtus, quam plurima, consequuntur vesiculas, scroto inclusas, in quibus num lac, num sperma contineatur, multoties dubitavi. Glirium domesticorum bursa, testium loco, epididymos satis magnos habet, sunt enim horum, vt illorum testes intus reconditi. Vt & hoc adijciam, glires fœminæ loco vberum adipiscuntur duas vesicas lacte candidissimo plenas, quæ inter cutem & musculos abdominis collocatæ sunt, atq; compressæ, per foramen vtriq; vesicæ commune, lac reddunt. Nunc ad echinum redeo. penis carebat glandulofo parastate, huius vicem forsan hæ vesiculæ gerunt.

De uespertilio
nis Anatomia.

Anatomicis his historijs adijcere lubuit vespertilionis anatomiam, vt inde vnusquisq; cernat D. O. M. cæli terræq; conditori nihil non impossibile esse, & sua incomprehensibili iustitia atq; benignitate nulli non animali quantumuis nostro iudicio abiectissimo

iectissimo inutilissimoq; , deesse : ac deniq; nihil in tanta tamq; imensa rerum pro-
 creatarum multitudine varietateq; inueniri iners, ociosum, temerè vel fortuito effectū,
 iudicet, Munificus & omnipotens ille Deus facit ex terrestri quadrupediq; animali vo-
 latile, huic concedit præter volatiliū naturam et consuetudinem, loco pennarum, mem-
 branas ad volandum. Vnde si hæc similiaq; attentè fixaq; contemplatione expendamus, obstupefacti cum insigni indefessoq; Dei operum admiratore Dauide exclamare
 compellemur : quàm magnifica sunt opera tua Domine, omnia sapienter perfecisti, im-
 pleta est terra possessione rerum tuarum: porro rogemur dicere cum Cicerone Ethnico,
 cui perexigua tantū contigit rerum diuinarum cognitio, quicquid ipsa natura genu-
 it, non modo animal, sed etiam quod ortum è terra stirpibus nititur, in suo quodq; ge-
 nere perfectum esse. Quo autem artificio præsens hoc nostrum animal volet, pro inges-
 nij mei angustia explicare nunc conabor. Aristoteles inquit: vespertilio volucrum, &
 pedestrium, & neutrorū est, pedes enim vt volucer habet, sed vt quadrupes non habet,
 cauda etiam tam quadrupedis, quàm volucris caret, nam quia volucer est, cauda qua-
 drupedis vacat, quia pedester, non volucris: quòd ei necessariò accidit, habeat enim cu-
 teas pennas, nullum enim volatile caudam habet, nisi penna scissa volatile sit. & c. est
 sanè mediè cuiusdam inter auem, & murem speciei, vt mus alatus dici possit, Plinius hu-
 ic animali in cibatu culices gratissimi. vnde opinor contingere, quod temperata aëris
 constitutione, eo tempore, quo culices, quippe sereno cœlo, in crepusculo, & eo in
 loco, quo & ijdem culices, nempe iuxta fenestras atque parietes, maximè vespertilio-
 nes volitent. Ad volandum haud dubiè pennæ membranæ longè sunt aptiores, præ-
 sens hoc animal pennis destituitur, aut quòd pennæ ei forent aliqua in re inutiles, aut
 quia materia ad pennarum generationem destituitur, aut si verum est, quod Plini-
 us inquit, quod geminos amplexa infantes volitet portetq;. Idcirco natura illi con-
 celsit materiam aliam, qua in aëre sese sustentare, dum volat, possit, nimirum mem-
 branofam, leuissimam, tenuissimamq;, ad extensionem æquè, atq; ad contractionem
 paratam: deniq; ita latam, vt vno tempore plurimum aëris percutere, ac ex consequenti
 post solis occasum, cum in partem profecta est, diutius in volatu perseverare queat.
 Membrana itaq; hæc est pro ratione animalis latissima, tenuitate araneorum telis non
 dissimilis, atq; omnes corporis partes, capite excepto, ambit. At cum tenuior inuolūti-
 orq; sit, quàm vt absq; adminiculo expandi aeremq; percutere queat, natura hanc mem-
 branofam alam, cruribus & anterioribus, & posterioribus, caudæ at tenuibus ofsiculis
 tanquàm fulcris annexit, sic his extensis sustentaculis, ala hæc membranosa simul expan-
 ditur: contractis, non aliter atq; in nautarum velis, nauticis perticis alligatis cernimus,
 etiam contrahuntur. In singulis alis (voco nunc alas, longas latasq; membranæ produ-
 ctiones capiti proximas) sunt quatuor ofsicula, tenuia valde, ofsium alarum instar, in-
 uicem tribus articulationibus coarticulata, quæ vt alæ reuocatae pennas suas, quæ ala-
 rum ofsibus beneficio membranæ adhærent, colligunt, extensæ pennas etiam exten-
 dunt, atq; dilatant, sic & cuticularem alam duobus ad hæc opera inferuentibus mulcu-
 lis contrahunt, & expandunt, vt dictum est. præter hæc ofsicula iuxta anteriora crura,
 prorumpit ex ventre ofsiculum parū & breue, idem munus pro sua breuitate subiens.
 Posteriores pedes cum caudæ longitudinem adæquare nequière, donantur ofseis ap-
 pendicibus, sic & cauda. Pedes habet muribus similes, sed breuiiores, & eorum poste-
 riores singuli quinos habent digitos, donatur clauiculis, dentibusq; serratilibus, qui su-
 pernis infernisq; spatijs mutuò excipiuntur. superiori maxillæ infixa sunt sex dentium
 paria, nimirum caninorum tria, & molarium tria paria. Inferiori octo paria inhaerent.
 duplices in hoc animali conspiciuntur aures, reliquæ partes tam externæ, quàm internæ
 murium partibus sunt similes, quare in masculis penis, vesica & testes conspi-
 ciuntur: in foemellis verò vbera, & vterus bicornis. Bellonius inquit:
 oua in hoc animali intus generari, deinde excludi par-
 tus viuos, nulla membrana in-
 uolutos,

OBSERVA: ANATOM:
DE ANATOMIA AVIVM.

DE auium partibus traditurus à capite auspicabor, & ad infimos pedes descendam. Auium siue volatiliū cerebra integra, ac nullis distincta futuris, teguntur caluaria, parum enim habent cerebri, futurarum loco cranium multis contigit spongiosum admodum, & in multis, vt noctuis, accipitribus & similibus, dimidiū digiti crassitiem adæquat, Intus in quibusdam locis leuiter protuberat, vt cerebrum dextrum à sinistro, cerebrum à cerebello aliquouſq; diſiungeret, siue separaret, Dura menynx siue membrana tenuis est, sed robusta, & sinibus priuata, tenuis membrana multis venis arterijsq; ſcatur, & nullibi cerebrum ingreditur. cerebrum est æquale, minimè anfractuofum, vt quadrupedum & nostra sunt cerebra. Cerebellum auius datum est pro corporis magnitudine satis magnum, cui adhæret scoloidis & vermiformis processus crassissimus: cerebri substantia valdè est humida & mollis. Ventriculorum quatuor vidi vestigia in cerebro, at nullum plexum: vidi & neruum opticum omnium maximum, reliquos nervos exiles: loco olfactus instrumentorum, nervos tenues. Inter omnia animalia, & inter hæc noctuæ omnium maximos consequuntur oculos, eosq; fermè omninò immobiles. Oculorum posterior pars maior est anteriori, estq; plana, minimè vt anterior, rotunda.

De auium oculis.

Oculorum in auius tunica humoresq; eò ab alijs differunt, quòd dura in auius media ex parte sit cornea & ossea, nimirum ex corneis ossis siue laminis sibi mutuò per membranam colligatis, conflata; deinde quòd humor crySTALLINUS multò sit maior, atq; in alijs conspicitur animalibus, in noctuis crySTALLINUS humor ita magnus & amplius est, vt aspero suo circulo quasi vucam tunicam contingat, innatat in vitreo humore abundanti. Plurimæ aues palpebram inferiorem superiori maiorem, eamq; mobilem consequuntur: noctuæ contrario modo superiores obtinent magnas, & mobiles, inferiores immobiles, et minores. præter superiorem palpebram, qua tota oculum tegit, donantur membrana, qua nictitant & instar palpebræ superioris oculum contegunt,

De auius auditusq; instrumentis.

Auium aures auditusq; instrumenta toto cœlo ab aliorum animalium auribus & partibus auditui inserviientibus discrepant, quædam auribus donantur, quædam non, quæ auribus priuata sunt, maiori ex parte consequuntur primò membranam cutaneā, laxam, et non profundè intus penetrantem, talis reperitur in paruis auius, quæ cantant, vt pote in ficedulis vel lucinijs, carduelibus, merulis, sturnis, & similibus. Sub hac membrana cutanea, quæ nullibi perforata est, continetur membrana myrinx tenuissima, foramini auditus prætensa, membranæ, siue huic tunicae intus adhæret vnū tantum ossiculum valdè paruum, nostro malleo non dissimile. Aues auritæ, vt sunt gallinaceorū species, noctuæ auritæ, et id genus aliæ, habent aures infernè sursum tendentes, at rursus foramina aperta obtinere videntur. In noctua aurita deprehendi statim ad canthū oculi maiore, cavitatem insigniter magnā, intus aliquot tuberibus lenibus exasperatā, atq; membrana concomitante foramen profundū, obductam, hinc menynghem inuenire nequiu.

De auium linguas.

Linguarum auium maxima est varietas, aliæ enim sunt carnosæ, crassæ, & obtusæ: aliæ excarnes, aliæ acutæ, aliæ longæ, aliæ latæ, aliæ angustæ, aliæ hoc illiue modo formatae. Psittaci omnes crassissimam carnosamq; consequuntur linguam, deinde carniuoræ aues, quæ duobus à lateribus donantur processibus carnosus introrsum spectantibus, quorum beneficio carniū cruda frustra ad gulæ orificium protrudunt. Ferè omnium auium linguæ ossibus donantur, aquaticarum maioribus latioribusq;, aliarum minoribus angustioribusq;. Omnibus his linguarum ossibus hyoidia ossa annascuntur.

De picorum lingua.

Postquàm Picorum ferè omnium linguæ stupendo atq; raro artificio sunt à Deo formatae, earum structuram hinc prolixius explicabo. Picorum linguæ cum exertæ sunt, facile digiti & dimidiū longitudinem excedunt, cum intus retractæ fuerint, vix dimidiū digiti

digiti longitudinem attingunt, conflatur ex tribus ossiculis tenuibus, flexibilibus, & teretibus, inuicem colligatis, & aliquot musculis, Horum ossiculorum vnum medium, & cæteris brevius est, linguae extremitati annexum. duo alia sunt lateralia, musculis gracilibus teretibusq; inuestita, atq; colligata, medio ossiculo & robur, & extensionis, & retractionis adminicula præbent. Extremitates atq; latera ossiculorum eorundem musculo vtrinq; à capitis vertice, non longe à rostro oriundo, alligantur. munus huius musculi est, hæc ossa extensa retrahere, vel simul eadem semper inferiori maxillæ attensa reflectendo ad principium, utpote ad rostrum superius, ducere. Sunt præter hos alij duo musculi, ab inferiori rostri, quod inferiorem refert maxillam, extremo, siue acumine orti, eodem modo, quo primi ossiculis lingua adnati, à vertice ossicula retrahunt, & linguae exertionem causantur. Vt in superiori actione ossicula hæc ductum rostri inferioris comitantia, à se mutuo abscedunt, ac rursus ad rostrum superius vniuntur: sic in hac vniuntur, atq; medio ossiculo linguae annexo adiunguntur, atq; tenuē, gracilem, et à lateribus infinitis hamulis acutissimis exasperatam efformant linguam, utilis enim picis ad vermiculos, formicas, aliaq; insecta venanda, talis lingua foret. Siquidem picis innata sua sagacitate, cum deprehendit alibi in arboribus vel carie, vel alia de causa cauatis, vermes insectaq; delitescere: ad illas volitat, seseq; digitis ungulisq; posterioribus robustissimis, & caudæ pennis rigidissimis sustentat, donec robusto, valido, ac peracuto rostro arborem pertundat, arbore pertusa, foramini rostri immittit, ac quod animalcula stridore exciet percussatq; magnam in arboris cauo emittit vocem, insecta vociferatione hac concitata huc illucue repunt, atq; currunt: picus verò linguam suam exerit, atq; aculeis hamisue animalcula infigit, infixam attrahit, & deuorat.

Auium asperæ arteriæ maiori ex parte bronchia consequuntur ad thoracem ferè *De auium asperæ arteriæ, pulmonibus, thoracis, & spirituum libus instrumentis.* vsq; rotunda, & nullibi membrana separata, paulò ante thoracem fiunt in quibusdam latiores, duplicesq; atq; bronchia formam. Cnoscere literè acquirunt, reddunturq; tenuiora ac molliora, talia permanent ad finem vsq;. In pectoris cauitate asperæ arteriæ scinduntur in duos ramos, qui vtrinq; à lateribus abscedentes, ad mediam thoracis cauitatē, & isthic in pulmonem medium inferuntur.

Pulmones auium adeo firmè ac validè vertebrarum thoracis lateribus, vbi costæ vertebris coarticulantur, annati sunt, ut quomodo distendi contrahiq; queant, videre non possim, ad hoc accedit substantia eorum spongiosa, rara, vbiq; peruia, et minime tunica, ut quadrupedum pulmones, inuestita: sed membrana tenuis & perlucida, à vertebrarum thoracis corporibus vtrinq; ad costas tendit, ijsq; annascitur, & pulmones proprio spatio à cauitate thoracis separato, includit. In auiibus aquaticis, ut laro, olore, anseribus, anatibus, mergis, & similibus, pulmones & rariores, & maiores, & magis spongiosi, atq; in reliquis auiibus, inueniuntur: pectoris etiam cauitas amplior, osq; pectoris, quod in nobis sternum respondet, & maius & latius ijs concessum est, imò pulmones auium distenti ne tertiam thoracis capacitatis partem explere possint, reliquæ partes spirituales, utpote pleura, mediastinum, pericardium, diaphragma etiam in auium thoracibus, quamuis quoquomodo dissimiles sint, reperiuntur. pericardium in auiibus est tenuissimū siccissimūq;, omni carens, ut auium pectora, pinguedine, et aqua, qua corda quadrupedum irrigantur: diaphragma omnino neruosum, & carne priuatum est, Magna arteria paulò supra cordis basim in quatuor secari ramos videtur, quorum duo ad alas contendunt, tertius deorsum reflectitur, quartus coronalem arteriam mea sententia constituit, auriculæ cordium valde candent. Thorax auium ex simplicissimis vertebris, processibus, atq; cartilaginosis vinculis, quorum beneficio quadrupedes dorsum vario modo commouent, priuatis componitur, quare dorsum spinam habent aues immobilē. Dorsi rigiditatem, & simul oculorum motuum difficultatem, natura in auiibus colli tum longitudine, tum contorquendi huc illucue omnemq; in partem facilitate refarciuit, idcirco in auium colli vertebris, earundemq; coarticulationibus, ac processibus, magna varietas diuersitasq; apparet.

In multis auiibus ingluuius inueni, præcipuè in carpophagis terrestribus, quales *De auium stomachis, ingluuiis.* sunt gal-

RR 4

sunt gal-

uicibus stomachis
ac nutritiis
paribus.

sunt gallinaceorum species, columbi, palumbi, perdices, & similes. hæc aves rursus donantur ventriculis carnosus & crassis. Aquaticæ multæ, & inter eas in primis carpouoræ priuantur ingluuie, & tamen carnosos crassosq; obtinent ventriculos. Sarcophagæ, quales sunt accipitres, noctuæ, milui, tinnunculi: sic & pisciuoræ, utpote ciconiæ, ardeæ, grues, lari, insignis voracitatis causa, stomachum laxissimum ingluuiei loco iuxta ventriculum omnium latissimum, crassissimumq; acquirunt. intrinsecus verò iuxta ventriculi orificium gula est villosa callosaq; hæc sese pro diuersitate animalium sese variant, ut ex aliquot exemplis subsequenibus intelliges.

De mergo paruo.

In mergo paruo reperi ventriculum gallinarum ventriculis similem, nullam ingluuiem, sed eius loco gulam ad ventriculum crassiorem latioremq; pedes illi erant magis posteriores, atq; in cæteris aquaticis, hinc sese profundius in aquam immittere queunt, pedes à lateribus proijciunt, quare non currunt, sed partim volant, partim currunt super aquas: raro sese aëri omnino cōmittunt, multo rarius terræ, nam nec stare, nec incedere possunt: cum conantur, ob pondus anterioris partis, sese statim in pectus proijciunt.

De mergo magno.

In mergo magno ventriculus humanum quasi refert, pylorus ex media & superiori ventriculi regione exoritur, donatur hic ventriculus tunica duplici, scilicet externa & interna. Externa est carnosæ ac crassæ, carnosior crassiorq; iuxta orificium superius, ob carnosas glandulosasq; carunculas, quibus crassities augetur, & internæ quàm firmissimè alligatur. donatur omnis generis fibris. Interna tunica est prorsus nervosa, in fundo crassior, inæqualis atq; tuberosa, unde Aristoteles hanc partem callosam vocat. Asperitas hæc inuenitur à lateribus fundi sibi mutuo oppositis, ita firmissimè amplectitur cibum, in medio enim & alijs in locis est levis. Statim sub diaphragmate occurrunt glandulæ, quæ nunc renes, nunc testes appellari debeant, ignoro, adhærent diuisioni venæ cavae, nimirum ubi in duos ramos crura petentes scissa est: forsan munus glandularum venarum rupturam prohibentium obeunt. His glandulis annascitur substantia quædam ex multis satisq; magnis glandulis subnigris, congrumato sanguini substantia sua non dissimilibus, inter sese colligatis, composita, quæ lumborum, sacrorum, & iliorum ossium (hæc ossa enim vnum idq; immobile, & maximum efformant os) cavitates implent, & venæ caue ramis hoc in loco collocatis substernuntur, in quem usum, me latet, lecur illi, ut omnibus aquaticis, erat maius, atq; alijs conceditur auibus: auium hepata in duos sunt scissa inæquales lobos, ventriculum amplexantes, quorum dexter maior & longior sinistro est. Vesica fellea, ut in quadrupedibus, hepati adhæret, & per meatum longum in intestina, longe à pyloro bilim, exonerat. Lienem in auibus deprehendere nequiuimus. porro huius mergi vterus terminabatur ad diaphragma, ubi nimirum renales glandulæ collocatæ sunt, eodemq; in loco cumulus paruorum ouorum hæsit. Huius auis intestina appendicibus, quibus anseres, anates, parui mergi, noctuæ, greges aves donatæ sunt, carent.

De grege duæ.

Gula gregi iuxta ventriculum est latior, crassior, et carnosior, ventriculus anserum anatūq; ventriculis similis, ventriculo ut gallinaceis, anatibus, et anseribus, tres concessæ sunt tunicæ, quarum prima & interna est dura, aspera & rugosa & quasi crusta, quæ facile aufertur. Secunda siue media, est nervosa, et vera tunica, & quàm validissimè carni ventriculi adhæret. Tertia tunica nomen non meretur, est enim potius caro quædam crassa, ex omni genere fibrarum longè aliter, atq; in musculis reperitur, confusa atq; composita, iuxta superius ventriculi orificium exoritur pylorus. Reperi in regione inguinum testes duos satis magnos, intus vacuos, semineq; elaboratissimo plenissimos (instabat tunc coeundi tempus) nullos verò vidi epididymos. Omentum, ut in omnibus ferè aquaticis auibus, pinguisimum erat, & à ventriculo dependebat, integebatq; post & ante omnia intestina. pinguedo illarum auium liquida & valde tenuis est, quare admodum emollit penetratq;.

Larus

Larus auis consequitur latissimum stomachum, integros enim transglutit pisces. *De laro duo.*
 ventriculus pro ratione cesophagi satis paruus ei est, similis vnde quæq; gregis vetriculo.
 pisces in fundo ventris contenti, sicuti in luci piscis aliorumq; piscium ventriculis mul-
 tores vidi, concoctionis rudimentum consequuntur, tantò maius, quantò fundo vicini-
 ora sunt, concocta deprehenduntur cibaria. intestina minus, atq; in alijs, anfractuosa
 longaq; sunt, carentq; processibus, ac rursus appendicum, vel processu loco post duo-
 denum intestinum, circumuolutionem cochleæ instar, acquirunt. Ne mei instituti ter-
 minum plus nimio transeam, neue parerga ergis sint maiora, hic sistam, atq; ampliorem
 exquisitioremq; animalium partium naturæ inquisitionem illis, qui maiori abundant
 otio (latissimum enim speculandi campum hoc studium, vt & Aristoteles his verbis, ni-
 hil in natura rerum tam minutum, tamq; vile, aut abiectum, quod non aliquid admira-
 tionis hominibus adferat, testatur, huic Philosophiæ parti addictis præbet) necessarijs
 ad hoc negotium rebus instructi sunt, atq; Regum principumq; patrocinio, & admini-
 culis affluunt, relinquam. mihi sufficiet limitem ad perfectiorem Anatomiae cognio-
 nem adipiscendam rudioribus patefecisse, atq; viam, qua accuratius naturam animalium
 ex Anatomia addiscere quis queat, pro mea tenuitate demonstrasse.

Hoc libro ferè ad finem perducto, Medici tum præclarissimi, tum fide dignissimi
 mihi significarunt, non vnum vermem, sed aliquot in hominis lenticulis extincti, vel op-
 pressi cerebro inuentos, qui num in cerebri substantia, num in duræ matris sinibus la-
 tuerint, non fat scio. Porro affirmarunt sese in cerebro ceruino vermiculorum, instar
 feminum cucurbitæ latorum, qui in aqua mortui, in vino viui visi sunt, cumulum vidisse.
 Similes & ego Monspeffuli, cum in diebus canicularibus cum eruditissimo clarissimoq;

Philosopho ac Medico, nunc in schola Monspelienfi Medicinæ professore ex-
 cellentissimo Iuberto ad prædium suburbanum D. Rondeletij

spatiatum ierani, in caua vena ouis deprehendi ver-

mes, Hæc veritatis studio adijce-
 re lubuit.

DEO AETERNO HONOR.

F. I. N. I. S.


Norimbergæ.
 In Officina Theodorici
 Gerlazenii.


EVIDENTIORA ERRATA PER INCVRI-
AM ADMISSA, SIC EMENDABIS.


Primus numerus paginam, secundus lineam indicat
Litera P pro, litera L lege significat.


IN secunda pagina prime epistole 10. P. spurcitiei L. spurcitiei. In elencho 17. P. Chirurgarumq; L. Chir-
urgicarumq;. In introducti: 1. 12. P. perductus L. perductis. 1. 21. P. hastem L. hastam. 3. 1. P. fixitit L. extit-
tit. In tabulis 3. 14. P. superinducantur L. superinducuntur. 9. ultima linea P. χαρσσοραφια L. γασσορα-
φια. 10. P. matris L. matricis. 21. P. perfectam L. presctam. 22. 6. P. alijs L. alie. 24. P. gibla L. gibba. P. care
L. caro. 25. 4. P. σπερματινῶν L. σπερματινῶν. 27. 15. P. multis rebus L. mulieribus. 34. 28. P. colere L. colo-
re. 35. 24. P. iter L. inter. 38. 21. P. fubarum L. fabarum. 41. P. sumetas L. sumptas. 41. P. σπερματινῶν L. σπερμα-
τινῶν. 42. 1. P. 41. L. 14. 45. P. αργυρ L. σί αργυρ. 51. crucis. L. cruris. 54. 14. P. inferuēti L. inferuentia. 55. 8.
P. paulatim L. palatum. 65. 10. P. multū L. multo. 77. in fine P. crystallini L. crystallino. 103. 5. P. peruiū L. pera-
uia. 106. 43. P. nutritis L. meritis. 110. 44. P. cuspide L. cuspide. 117. 14. P. interit L. interitum. 117. 24. P. ex-
tensam L. extensa. 117. 31. P. iuueni L. iuueni. 118. 40. P. solidarium L. solidarium. 124. 24. P. reperi L. reperi.

Distinctionis mendas quilibet facile intelliget, & corriget.













I. FIG.





V.C.D.




















Aspice, quàm sis foedus, homo, qui sidera tangis
 Vertice, nec cristas desinis crigere.
 Nam mors ipsa tuis, ut cernis, in ossibus hæret.
 Quæ merito reprimat dira tuos animos.

fig. quærvca







VCD

